

# БОРЕАЛЬНЫЕ ЛЕСА ЕВРАЗИИ (ТАЙГА)

Выполнила : Струева Ольга Васильевна

# Географическое распространение

- ▣ Простирается от Скандинавского полуострова на западе до полуострова Камчатка и острова Сахалин на востоке

# Гигротермический режим

- ▣ - общая продолжительность периода вегетации сокращается
- ▣ -увеличивается увлажненность
- ▣ -уменьшается теплообеспеченность

Что приводит к формированию промывного режима почвенной толщи , а кислая реакция растворов приводит к интенсивному вымыванию карбонатов и развитию процессов подзолообразования.

# Растительный мир

обычно представлены тёмнохвойными и  
тёмнохвойно-мелколиственными  
лесами с доминированием елей.



# Сибирская лиственница



# Сибирская пихта



# Сибирский кедр



# Корейский кедр





# Аянская ель



# Белокорая пихта



# Каменная берёза



# Кедровые стланики



# Серая ольха



# Чозения



# Душистый тополь



# Животный мир

Малая мощность гумусового горизонта , кислая среда , накопление грубого перегноя и подстилки – всё это не слишком благоприятные факторы для формирования богатого и разнообразного комплекса дождевых червей , свойственного широколиственным лесам. Здесь преобладают немногие виды , обитающие главным образом в подстилке и в самом верхнем горизонте собственно почвы.



# Панцирные клещи



# НОГОХВОСТКИ



# Сибирский шелкопряд



# Усачи



# Златки



# Проволочники



# Муравьи-древоточцы

