

БОРЕАЛЬНЫЕ ЛЕСА ЕВРАЗИИ (ТАЙГА)

Выполнила : Струева Ольга Васильевна

Географическое распространение

- ▣ Простирается от Скандинавского полуострова на западе до полуострова Камчатка и острова Сахалин на востоке

Гигротермический режим

- ▣ - общая продолжительность периода вегетации сокращается
- ▣ -увеличивается увлажненность
- ▣ -уменьшается теплообеспеченность

Что приводит к формированию промывного режима почвенной толщи , а кислая реакция растворов приводит к интенсивному вымыванию карбонатов и развитию процессов подзолообразования.

Растительный мир

обычно представлены тёмнохвойными и
тёмнохвойно-мелколиственными
лесами с доминированием елей.



Сибирская лиственница



Сибирская пихта



Сибирский кедр



Корейский кедр



Аянская ель



Белокорая пихта



Каменная берёза



Кедровые стланики



Серая ольха



Чозения



Душистый тополь



Животный мир

Малая мощность гумусового горизонта , кислая среда , накопление грубого перегноя и подстилки – всё это не слишком благоприятные факторы для формирования богатого и разнообразного комплекса дождевых червей , свойственного широколиственным лесам. Здесь преобладают немногие виды , обитающие главным образом в подстилке и в самом верхнем горизонте собственно почвы.

Панцирные клещи



НОГОХВОСТКИ



Сибирский шелкопряд



Усачи



© 2008 А. К. Калитин

Златки



Проволочники



Муравьи-древоточцы



© 2005 Sergey Yu. Kuznetsov