БОРЕАЛЬНЫЕ ЛЕСА ЕВРАЗИИ (ТАЙГА)

Выполнила : Струева Ольга Васильевна

Географическое распространение

- Простирается от Скандинавского полуострова на западе до полуострова Камчатка и острова Сахалин на востоке

Гигротермический режим

- - общая продолжительность периода вегетации сокращается
- -увеличивается увлажненность
- -уменьшается теплообеспеченность

Что приводит к формированию промывного режима почвенной толщи , а кислая реакция растворов приводит к интенсивному вымыванию карбонатов и развитию процессов подзолообразования.

Растительный мир

обычно представлены тёмнохвойными и темнохвойно-мелколиственными лесами с доминированием елей.

Сибирская лиственница

Сибирская пихта

Сибирский кедр

Корейский кедр

Аянская ель

Белокорая пихта

Каменная берёза

Кедровые стланики

Серая ольха

Чозения

Душистый тополь

Животный мир

Малая мощность гумусового горизонта , кислая среда , накопление грубого перегноя и подстилки – всё это не слишком благоприятные факторы для формирования богатого и разнообразного комплекса дождевых червей ,свойственного широколиственным лесам. Здесь преобладают немногие виды , обитающие главным образом в подстилке и в самом верхнем горизонте собственно почвы.

Панцирные клещи

Ногохвостки

Сибирский шелкопряд

Усачи

Златки

Проволочники

Муравьи-древоточцы