

Емі және болжамы

Режим II , емдәм 7

1. Виздокса 15 мг т/і тамшылатып
2. Аллопуринол 100 мг по 1т x 3 р/к
3. Бонифас 300мг т/і тамшылатып
4. Дексиметазон 1 мг x 1 р/к
5. Преднизолон 90 мг 200.0 мл физ.сұйықтық т/і тамшылатып
6. Омегаст 20 мг 1 таб 2 р/к
7. Флунол 100 мг x 1 р/к
8. Бесептрил 2г x 2р/к
9. Ондем 8 мг x 1 р/к т/і
10. Азипро 500 мг x 1 р/к
11. Кальций ұнтақ 1,5 г x 1 р/к ішке қабылдауға
12. Левофлоксацин 500 мг x 2р/к
13. Фуросемид 40мг x 1 р/к
14. Гептрал 400.0 1 т 2 р/к

Флунол 150мг 2 тамшы * 1 р/к

Цеф-3 1,0 г * 2р/к

Изомик спрей түрінде 2 р/к(жағдайына қарай)

Ацетилсалицил қыш 500мг 1т

Офлаксацин 100 мл т/ітамшылатып

Преднизолон 90мг- 200.0 мл физ.ерт тамшылатып

Болжамы:

Ауыр емес түрінде жағымдылау болады, 5 жыл ішінде тірі қалатындар саны 80% құрайды. Аурудың ауыр түрінде болжам жағымсыз, жыл ішінде тірі қалатындар 20% құрайды. Науқастың ауруының болжамы жағымсыз!

