

Пуповина (пупочный канатик)




Пуповина (пупочный канатик, лат. funiculus umbilicalis, англ. — umbilical cord) — извитое тугоэластическое трубчатое образование, соединяющее центр плодовой поверхности плаценты с пупочным кольцом плода.

Длина 60-70 см., диаметр 1,7 см., вес 40-60 гр.


Функция: участие в плацентарно-плодовом кровообращении.



Пупочный канатик **формируется из амниотической ножки**, соединяющей зародыш с амнионом и хорионом. В амниотическую ножку из энтодермы задней кишки зародыша вырастает аллантаис, несущий **фетальные сосуды**. В состав зачатка пуповины входят **остатки желточного протока и желточного мешка**.



На 3-м месяце внутриутробного развития желточный мешок перестает функционировать как орган кроветворения и кровообращения, редуцируется и остается в виде небольшого кистозного образования у основания пуповины. Аллантоис полностью исчезает на 5-м месяце внутриутробной жизни.



Зародыш и его оболочки на ранних стадиях развития (а — в — последовательные стадии): 1 — хорион; 2 — аллантоис; 3 — желточный мешок; 4 — амнион; 5 — внезародышевый целом; 6 — пупочный канатик; 7 — пупочные сосуды; 8 — полость амниона.




Пуповина состоит из **трех сосудов** (1 вена и 2 артерии), укутанных на всем протяжении **Вартоновым студнем** (эмбриональная слизистая соединительная ткань) и амниотической оболочкой.

Сосуды пуповины обычно закручены влево (против часовой стрелки) — в норме около 10-13 полных витков. Они имеют извилистый ход, поэтому пупочный канатик как бы скручен по длине.

Диаметр просвета вены и артерий равен соответственно 7-8 и 3-4 мм.





Поперечный разрез
пупочного канатика:


1 — амниотическая
оболочка;

2 — вартонов студень;

3 — пупочные артерии;

4 — пупочная вена.






Пупочные артерии отходят от внутренних подвздошных артерий. После рождения запусеваются и превращаются в рубцовые тяжи (медиальные пупочные складки, *lig. umbilicales mediales*), которые проходят по передней брюшной стенке под париетальной брюшиной в виде сторон равнобедренного треугольника по бокам мочевого пузыря до пупка. По артериям течет венозная кровь от плода к плаценте.



На ранних стадиях онтогенеза пуповина содержит 2 вены. В дальнейшем **правая облитерируется**, а **левая пупочная вена** становится более крупной, **превращаясь** в собственно **пупочную вену**, которая залегает в пуповине.

Кровь из пупочной вены сначала попадает в печень. Затем в ткани печеночной закладки, в результате слияния синусоидных капилляров, формируется сосудистый канал (венозный (Аранциев) проток), образующий прямое продолжение пупочной вены и впадающий в нижнюю полую вену.



По вене пуповины течет артериальная кровь от плаценты к плоду.

