


ОБЕЗБОЛИВАНИЕ



КОВАЛЬСКИЙ
АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

Физиология боли



Боль — это физическое или эмоциональное страдание, мучительное или неприятное ощущение, мучение. Является одним из симптомов ряда заболеваний.

ЗНАЧЕНИЕ БОЛИ



«Боль приносит пользу подобно огню, когда он согревает, а не сжигает, и подобно воде, когда она орошает, а не затопляет»

✓ Отрицательное

- Подавляет настроение
- Снижает работоспособность
- Истощает ресурсы
- Нарушает сон

✓ Положительное

- Сигнализирует об опасности, о болезни
- Активирует защитное поведение и ресурсы организма
- Учит осторожности (отрицательное подкрепление)

Виды боли

Висцеральная боль

Соматическая боль:

- поверхностная
 - ранняя (быстрая, эпикрическая)
 - поздняя (медленная, протопатическая)
- глубокая



Виды болевого синдрома





- **Острая боль** - нормальное, предсказуемая физиологическая реакция на неблагоприятные химические, термические, механические повреждающие стимулы, связанные с хирургическим вмешательством, травмой или острым заболеванием. Как правило, ограниченная во времени и реагирующая на терапию **опиоидами** среди других методов лечения, длительностью менее 30 дней
- **Хроническая боль**. Основывается на произвольном интервале времени с момента ее начала: по разным источникам от 3-х до 6 месяцев с момента развития болевого синдрома, **трудно купируемая опиоидами** и поддающаяся комплексному **лечению** с применением **адьювантных** средств
- **Подострая боль** – переходный период между острой и хронической, длительностью от 1 до 3-х месяцев

Классификация ноцицепторов, участвующих в процессе трансдукции



Типы рецепторов	Стимул	Типы волокон	Скорость передачи (м/с)	Типы рецепторов
Механический	Механический и термический	A δ - волокна	2-30 м/с (миелинизированные)	Механический
Механо-термический	Механический и термический	A δ - волокна	2 - 30 м/с (немиелинизированные)	Механо-термический
Полимодалный	Механический, термический и химический	C-волокна	0,2-2 м/с (немиелинизированные)	Полимодалный


Пути проведения боли и её механизмы




Обезболивание



- это системы мер, применяемых в хирургии с целью выключения болевых ощущений




Амбруаз Паре




Авиценна



Уэллс Гораций Хорас



Уильям
Мортон



Симпсон
Джеймс Янг

1844 - Уэллс испытал на себе закись азота


1846 - Мортон испытали действие паров эфира

1847 - Симпсон применил для наркоза хлороформ


февраль 1847 - Пирогов эфирный и хлороформный наркоз в России

1879 - Анреп открыл анестезирующие свойства кокаина

1905 - Эйнхорн предложил для местного обезболивания новокаин



Пирогов Н. И.



Анреп Борис
Васильевич



Альфред
Эйнхорн




Анестезия (греч. an- отрицание, aichthesia – ощущение)- уничтожение или прекращение всех видов чувствительности, из которых особое значение имеет потеря болевой чувствительности.

Анальгезия (греч. an- отрицание, algos – боль)- потеря только болевой чувствительности.


Вещества, вызывающие локальную анестезию (обезболивание), получили название **местно – анестезирующих** веществ.

Виды обезболивания





Местная анестезия – это временная потеря болевой чувствительности тканей в месте ее проведения вследствие блокады болевых рецепторов и проведения импульсов по чувствительным волокнам.



Местная анестезия



- терминальная
- поверхностная
- инфильтрационная
- проводниковая
- плексусная
- эпидуральная
- спинальная
- каудальная
- внутрикостная
- внутривенная под жгутом.






3

Терминальная (поверхностная) анестезия
достигается путём нанесения на кожу или слизистые
оболочки раствора анестетика


Инфильтрационная анестезия



Разновидности инфильтрационной анестезии: *a, a1, б* — прямая; *в* —
поверхностная циркулярная (ромбовидная); *г, г1, г2* — глубокая
циркулярная (пирамидальная); *д* — циркулярная одноплоскостная
анестезия на конечности; *е* — анестезия по Вишневскому



Поверхностная анестезия




- Анестезия слизистых оболочек
- 3 способа
 - Смазывание
 - Аспирация
 - Ингаляция раствора анестетика
- Растворы кокаина 1-3 %, лидокаина 1-2 %, дикаина 0,25-2 %, тримекаина 1-5 %, пиромекаина 0,5-2 %
- Показания:
 - кратковременные манипуляции в офтальмологии, ЛОР, эндоскопии, урологии и др.





Инфильтрационная анестезия

- Метод инфильтрационной анестезии по А. В. Вишневскому
- Послойная инфильтрация тканей раствором новокаина фасциальным футляром – тугий ползучий инфильтрат
- Растворы новокаина 0,25-0,5 %, лидокаина 0,25-0,5 % – до 1 л на операцию
- Большая часть раствора вытекает при разрезе, что предупреждает интоксикацию
- Показания к применению:
 - кратковременные операции на поверхности тела, когда не требуется релаксации мышц



Проводниковая анестезия



- **Методы местной анестезии, при которых анестетик подводят к нервному стволу**
 - стволовая анестезия
 - анестезия сплетений
- **Блокада нервного ствола обеспечивает обезбоживание области, иннервируемой этим нервом**
- **Выраженное обезбоживание достигается меньшим количеством анестетика, чем при инфильтрационной анестезии, но в большей концентрации (1-2 %)**
- **Основными показания**
 - Оперативные вмешательства на конечностях (ортопедия, травматология, оперативная флебология, операции на артериях и т.д.), в челюстно-лицевой области, начиная от стоматологии и кончая сложнейшими реконструктивными операциями

Плексусная анестезия



обезболивание, осуществляемое путем введения раствора анестетика в зону нервного сплетения

Анестезия плечевого сплетения по Куленкампу

- Раствор новокаина 1 % – 20-50 мл
- Анестезия наступает через 10-15 мин, длительный паралич

Паравертебральная анестезия





- Блокада нервов при выходе их из межпозвоночных отверстий
- Раствор новокаина 0,5 % – 5-10 мл

Парасакральная анестезия по Брауну

- Применяется при операциях на органах малого таза
- Раствор новокаина 0,5 % – 5-10 мл
- Общий расход – около 200 мл раствора новокаина



Чрескожная блокада чревных нервов по Капису

- Раствор новокаина 0,5 % – 30-40 мл





Эпидуральная, каудальная и спинальная анестезия




Внутрикостная анестезия




Анестезирующее вещество, введенное внутрикостно, попадает в венозную систему, откуда диффундирует в ткани.

Применяется внутрикостная анестезия при операциях на конечностях. Конечность изолируют от общего кровотока путем эластического бинта. Анестезирующее вещество вводят на верхней конечности и мышелки плеча, локтевой отросток, кости кисти, на нижней — в мышелки бедра, лодыжки, пяточную кость. При операциях на верхней конечности жгут накладывают на плечо, при операции на стопе — на нижнюю треть голени, при операциях на голени — на нижнюю треть бедра и при операциях на бедре — на верхнюю



Анестезия внутривенно под жгутом




Распространение анестезирующего вещества при его введении в мышцелок бедра (а), в пяточную кость (б). При неправильно наложенном жгуте анестезирующее вещество уходит в общий кровоток (в).

Местные анестетики

Вещества, блокирующие
восприятие или проведение
нервных импульсов



Местные анестетики



высокая токсичность и опасность
привыкания
сужение сосудов при обычной
клинической дозировке
назотрахеальная интубация.
оториноларингология



Местные анестетики



2

3

Прилокаин

клиническое действие как у лидокаина.

Но - не вызывает расширения сосудов -
можно применять без адреналина.

наименее токсичный препарат из группы
аминоамидов.

в/в введение (региональная анестезия).

токсические изменения после снятия жгута
развиваются редко (преимущественно со
стороны ЦНС)

излишне высокие дозы - может
осложниться метгемоглобинемией. -
ограничение применения в акушерской
практике.




Тетракаин (дикаин)

только для терминальной анестезии ввиду
высокой токсичности.

В 12-15 раз сильнее новокаина и в 8-10 раз
его токсичнее.

Максимальная доза - 75-100 мг.




Местные анестетики



4

Бупивакаин (маркаин, анекаин):




В 8 раз сильнее и в 3-4 раза токсичнее новокаина.

Является оптимальным МА для проведения обезболивания родов и акушерских операций в виде 0,25-0,5% раствора.

Средняя продолжительность операционного обезболивания колеблется от 3 до 10 ч

Ропивакаин (наропин)



Аналог бупивакаина, но обладает меньшим ПЭ на ССС.

Местные анестетики

2

УЛЬТРАКАИН Д-С ФОРТЕ (ULTRACAIN D-S FORTE)

Состав и форма выпуска

Раствор для инъекций: 1.7 мл в картридже по 100 шт. в упаковке.

1 мл 1 картридж

артикаина гидрохлорид	40 мг	68 мг
адреналина гидрохлорид	12 мкг	20.4 мкг

Прочие ингредиенты: натрия метабисульфит, натрия хлорид, вода для инъекций.

Раствор для инъекций: 2 мл в ампуле по 10 шт. в упаковке.

1 мл 1 амп.

артикаина гидрохлорид	40 мг	80 мг
адреналина гидрохлорид	12 мкг	24 мкг

Прочие ингредиенты: натрия метабисульфит, натрия хлорид, вода для инъекций.

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для местной анестезии в стоматологии. Входящий в его состав артикаин - местный анестетик амидного типа тиафеновой группы.

Действие препарата начинается быстро - через 1-3 мин. Продолжительность анестезии составляет не менее 75 мин. Заживление раны протекает без осложнений, что обусловлено хорошей тканевой переносимостью и минимальным сосудосуживающим действием.

Вследствие низкого содержания адреналина в препарате его влияние на сердечно-сосудистую систему выражено мало: почти не отмечается повышения АД и увеличения ЧСС.

Препарат обладает низкой токсичностью.



Артикаин (альфакаин, брилокаин, септонест, ультракаин).

- в 3-5 раз активнее и в 1,5 раза токсичнее новокаина.

Имеет оптимальное соотношение показателей активности и токсичности (самую большую широту терапевтического действия).

Кардиодепрессивный эффект у артикаина выражен слабее, чем у других амидных МА.

Стоматология

МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ



Новокаин (прокаина гидрохлорид)

- бесцветные кристаллы без запаха, легко растворимые в спирте и воде. Выпускается в ампулах и флаконах в виде водного раствора различной концентрации (от 0,25% до 10%).



Максимально

безопасная

разовая доза

новокаина **10**

мг/кг массы тела
(без адреналина) и

15 мг/кг (с
адреналином).

Максимальная доза без адреналина - 800 мг,
с адреналином 1000 мг

Применяется для всех видов проводниковой анестезии:

инфильтрационной (0,5-2% растворы, начало эффекта через 5-25 минут, длительность анестезии 15-30 минут); эпидуральной (1-2% растворы, начало эффекта, через 5-25 минут, длительность - до 1,5 часов); спинальной (10% раствор с 5% глюкозой, начало эффекта 2-5 минут, длительность - до 1,5 часов).

МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ



Тримеканн (мезокаин) - белый или белый со слабым желтоватым оттенком порошок. Легко растворим в воде и спирте. От новокаина отличается большей активностью и длительностью действия (в 2-3 раза).

Максимальная разовая доза **20 мг/кг** массы тела.



- ✓ Применяется для инфильтрационной (0,25-1% растворы) и проводниковой (1-2% растворы) анестезии.
- ✓ В отличие от новокаина, он оказывает действие в рубцово-измененных тканях.

МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ



Лидокаин (лигнокаин, ксилокаин)

- местный анестетик средней мощности и продолжительности действия. Хорошая проникающая способность и быстрое начало действия. **Эффективен при всех способах введения.**



Максимальная безопасная доза 4 мг/кг без адреналина и 7 мг/кг с адреналином.

Дозировка: 0,25-0,5% раствор для инфильтративной анестезии, 0,5% раствор - для внутривенной региональной анестезии, 1% - для блокады нервов, 1,2-2% раствор - для эпидуральной анестезии (чаще всего с адреналином 1:200000).
Аппликационная анестезия - 2-4% растворы (жидкость, спреи).

МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ



Мепивакаин (карбокаин, скандикаин) - третичный амидный местный анестетик стабилизирует клеточную мембрану и предупреждает возникновение и передачу импульса.



Максимально безопасная доза 4 мг/кг без адреналина и 7 мг/кг с адреналином.

Дозировка: 0,5-1,5% раствор для инфильтрационной анестезии; 1-1,5% раствор для блокады нервных стволов; 1-2% раствор для болюсной эпидуральной анестезии и 0,25-0,5% раствор для инфузии в эпидуральное пространство.




- Препараты **слабой** обезболивающей активности и кратковременного действия - **прокаин и хлоропрокаин.**
- Препараты **промежуточной** обезболивающей активности и средней продолжительности действия - **лидокаин, мепивакаин и прилокаин.**
- Препараты **высокой** обезболивающей активности и большой продолжительности действия - **тетракаин, бупивакаин и этидокаин.**



Сроки наступления анестезии

- **быстрый** эффект -
хлоропрокаин, лидокаин,
мепивакаин, прилокаин и
этидокаин
- **промежуточного** действия -
Бупивакаин
- **замедленно** вызывающие
обезболивание - **прокаин и**
тетракаин

Местная анестезия



- **Преимущества**

- безопасность
- простота методики (не требуется участия других лиц, наличия сложной аппаратуры)
- дешевизна

- **Недостатки**

- невозможно управлять функциями организма при обширных травматических операциях
- трудность ревизии органов брюшной полости, так как нет расслабления мускулатуры
- не всегда можно добиться полного обезболивания (операции в области рубцово измененных тканей и др.)
- у больных с неустойчивой психикой нежелательно сохранение сознания во время операции
- Непереносимость местных анестетиков

Противопоказания для применения МА



- непереносимость препарата (аллергия)
- психические заболевания
- нервное возбуждение
- отказ больного
- ранний детский возраст (менее **10** лет)
- гипотония
- наличие воспаления или рубцовых изменений



ТОКСИЧНОСТЬ

- ЦНС - головокружение, нарушения зрения и слуха, остановка дыхания или кровообращения
- Судороги
- синусовая брадикардия
- ***Аллергические реакции***



Подготовка пациента к местной анестезии

- ❖ осмотр пациента
- ❖ проверка **ad**, **t** тела, пульс
- ❖ выявление аллергических реакций
- ❖ опорожнение мочевого пузыря
- ❖ проведение премедикации

Подготовка пациента к местной анестезии



- За **20** мин до операции провести премедикацию: ввести **0,1%** раствор Атропина, **1%** раствор Промедола и **1%** раствор Димедрола по **1** мл в/м в одном шприце.
- После проведённой премедикации нужно строго соблюдать постельный режим до окончания местной анестезии.

Набор для местной анестезии



- операционный лоток
- марлевые салфетки
- 2** пинцета
- 70%** этиловый спирт
- перчатки
- шприц **5-20** мл
- иглы инъекционные или специальные



Осложнения при проведении анестезии



Местные осложнения

- Поломка иглы
- Боль при введении анестетика
- Недостаточное обезболивание
- Избыточное распространение анестетика
- Ятрогенное и самостоятельное повреждение анестезированных тканей
- Травма сосуда иглой
- Сдавление сосудов анестетиком
- Введение анестетика с вазоконстриктором в сосуд
- Повреждение медиальной или латеральной крыловидной мышцы
- Травма нерва



Общие осложнения

- Обморок
- Коллапс
- Аллергические реакции
- Асфиксия (острая дыхательная недостаточность)
- Бронхоспазм
- Гипертонический криз
- Ишемическая болезнь сердца
- Острый инфаркт миокарда
- Инсульт
- Крапивница. Отек Квинке
- Гипо- и гипергликемическая (диабетическая) кома
- Судорожный синдром

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ

- Целенаправленное выяснение анамнестических данных о повышенной индивидуальной чувствительности к препарату.
- Аллергологический анамнез
- Клиническое обследование больных для выяснения противопоказаний
- Тщательное соблюдение дозировок анестетиков и методики обследования.



НОВОКАИНОВЫЕ БЛОКАДЫ



— это подведение низкоконцентрированного раствора Новокаина в различные клетчаточные пространства для блокады проходящих здесь нервных стволов с целью достижения обезболивающего или лечебного эффекта.

(лечения трофических нарушений, при нарушениях артериального кровоснабжения, при переломе ребер, межреберной невралгии.)

Используемые анестетики

- Новокаин **0,25 % 250** мл.
- Новокаин **0,5 % 50** мл.
- Новокаин **2 % 10** мл.







Схема проведения новокаиновых блокад



Виды новокаиновых блокад

- межреберная блокада
- вагосимпатическая блокада по А. В. Вишневскому
- паранефральная блокада
- блокада семенного канатика
- блокада круглой связки матки
- Блокада по Оберсту-Лукашевичу

Межреберная новокаиновая блокада




Показания: перелом ребер; межреберная невралгия.

Последовательность действий:

- 1.** Уложить пациента в удобной позе.
- 2.** Надеть резиновые перчатки.
- 3.** Обработать **2** раза кожу межреберья стерильной марлевой салфеткой на пинцете со спиртом.
- 4.** Набрать в шприц раствор новокаина.
- 5.** Вести иглу по нижнему краю ребра, проверяя, не попала ли игла в сосуд.
- 6.** Ввести медленно новокаин.
- 7.** Вывести иглу и обработать место введения иглы спиртом.

Обезболивание наступает через **3-5** минут.

Вагосимпатическая блокада по В. Вишневскому



Показания: травма в области груди, после торакотомии.

Последовательность действий:

- 1.** Уложить пациента на спину.
- 2.** Надеть перчатки.
- 3.** Положить под лопатки валик так, чтобы голова запрокинулась.
- 4.** Повернуть голову на бок в сторону, противоположную блокаде.
- 5.** Вытянуть руку на стороне блокады вдоль туловища вниз.
- 6.** Кожу в области грудино-ключичной мышцы **2** раза обработать спиртом.

Блокаду проводит врач!


Наблюдать за пациентом. При правильном выполнении блокады наблюдается изменение лица, сужение зрачка и глазной щели на стороне блокады.

Паранефральная новокаиновая блокада



4

6




Показания: травма и заболевание почек и околопочечной клетчатки.


Последовательность действий:

1. Уложить пациента на здоровый бок.
2. Надеть резиновые перчатки.
3. Подложить валик под поясничную область.
4. Согнуть ногу на здоровой стороне в тазобедренном и коленном суставах.
5. Вытянуть ногу на больной стороне вдоль туловища.
6. Вытянуть руку на больной стороне вверх.
7. Обработать **2** раза стерильной салфеткой со спиртом на пинцете область позвоночного реберного угла.

Блокаду проводит врач!




Блокада семенного канатика новокаином




- Показания:** почечная колика, травма и заболевания половых органов мужчин
- Последовательность действий:**
1. Уложить пациента на спину.
 2. Надеть резиновые перчатки.
 3. Обработать два раза кожу в области корня мошонки стерильной салфеткой со спиртом на пинцете.
 4. Набрать в шприц **5** мл **2%** раствор новокаина.
 5. Ввести новокаин подкожно в корень мошонки.
 6. Вывести иглу и обработать место введения иглы спиртом.
 7. Снять резиновые перчатки, поместить в емкость с дезинфицирующим раствором
- Обезболивание наступает через **3-5** минут.

Блокада круглой связки матки



Паховый канал, canalis inguinalis, женщины, вид спереди




Показания: почечная колика, травма и заболевание половых органов женщины.

Последовательность действий:

1. Уложить пациента на спину.
2. Надеть резиновые перчатки.
3. Обработать два раза кожу в области паховой складки у лона стерильной салфеткой со спиртом на пинцете.
4. Набрать в шприц **5 мл 2%** раствор новокаина.
5. Ввести новокаин подкожно в область паховой складки у лона.
6. Вывести иглу и обработать место введения иглы спиртом.
7. Снять резиновые перчатки, поместить в емкость с дезинфицирующим раствором. Обезболивание наступает через **3-5 минут**.

Блокада по Оберсту- Лукашевичу



Показания: операции на пальцах.

Последовательность действий:

- 1.** Уложить пациента в удобной позе.
- 2.** Надеть резиновые перчатки.
- 3.** Обработать два раза кисть стерильной салфеткой с спиртом на пинцете.
- 4.** Наложить на основание пальца стерильный бинт.
- 5.** Набрать в шприц **2 %** раствор новокаина **5** мл.
- 6.** Вести новокаин подкожно по внутренней поверхности пальца с **ДВ**~сторон.
- 7.** Через **3-5** минут проводить операцию, не снимая стерильный бинт с основания пальца.



CBOE