


Острая и хроническая надпочечниковая недостаточность


Клиника, патогенез, заместительная
терапия при хронической надпочечниковой
недостаточности.



Клиника острой надпочечниковой недостаточности



Клинические формы острой надпочечниковой недостаточности



Клиника хронической надпочечниковой недостаточности



Клиника хронической надпочечниковой недостаточности

! Симптомы ГИПОКЛИКЕМИИ:



Дрожь



Потливость



Состояние
патологического
страха



Головокружение



Чувство голода



Сердцебиение



Ослабление
зрения



Слабость,
утомляемость



Головная боль



Раздражи-
тельность



Клиника хронической надпочечниковой недостаточности



Патогенез



Заместительная терапия при хронической надпочечниковой недостаточности.

| Препарат | Доза, режим приема |
|-------------------|--|
| Глюкокортикоид | Гидрокортизон: 10-20 мг утром, 5-10 мг днем или Преднизолон: 5 мг утром, 2,5 мг днем |
| Минералокортикоид | Флудрокортизон: 0,05—0,1 мг утром |

Используемая литература

-И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.Ф. Фадеев

Эндокринология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 432 с: ил.

-Клинические рекомендации Российской Ассоциации Эндокринологов (РАЭ) по диагностике и лечению надпочечниковой недостаточности.

Презентацию подготовили студентки педиатрического факультета 5 курса 2 группы Папихина Татьяна Дмитриевна и Гугняева Софья Геннадьевна.