



# ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО- КШЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



Цель :  
охарактеризовать  
показания,  
преимущества и  
недостатки  
различных методов  
визуальной  
диагностики,  
подчеркнуть  
необходимость их  
обоснованного  
применения и  
оценить их  
диагностическую  
значимость.



Наиболее старыми и распространенными являются рентгенологические методы. Сюда относятся *рентгеноскопия и рентгенография, томография, экскреторные методы*, т. е. введение контрастов и рентгенологическое наблюдение за выведением этих контрастов, и, наконец, *ангиография*. Самыми простыми методами являются рентгенография и рентгеноскопия. Проводятся рентгенография и рентгеноскопия пищевода, желудка с досмотром двенадцатиперстной кишки, также применяют метод пассажа контрастного вещества через 24 часа после приема для проведения рентгенографии кишечника.

В качестве контрастного вещества вводится барий, различный по консистенции (густой или жидкий) в зависимости от того, как плотно мы хотим наполнить обследуемый орган. Безконтрастное исследование делается в двух случаях: если надо определить инородное тело или в случае кишечной непроходимости. При кишечной непроходимости на обзорной рентгенограмме мы видим уровни жидкости в кишечнике.

Кардия

Дно

Субкардия

Луковица 12пк


Тело

УГОЛ


Анtrum

Синус





Патологические изменения выявляются при рентгенографии только в ситуациях, когда заболевание сопровождается достаточным изменением плотности, величины, формы и положения определенных органов, что делает их непохожими на окружающие структуры.



Некоторые органы между тем характеризуются определённой плотностью содержимого, и поэтому их легко отличить от окружающих структур. В типичных случаях в желудке и петлях кишечника обнаруживают скопления газа, а в ободочной и прямой кишках - фекалии.







Рис. 79. Рентгенограмма грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (1), врожденного короткого пищевода (2), нормального пищевода и желудка (3) и грыжи желудка (4).



Рис. 84. Рентгенограмма желудка.






Рис. 85. Рентгенологическое исследование — нормальная тонкая кишка. Равномерное распределение контрастного вещества (через 45 минут после приема бариевой взвеси).



Рис. 86. Рентгенограмма толстой кишки.







## 2. Эндоскопический метод

Боковые каналы эндоскопа позволяют выполнять: щипковую биопсию, удалять инородные тела, выполнять щеточную биопсию для взятия цитологического материала. Возможно промывание полости кишечника с помощью эндоскопа. Возможно удаление и коагулирование полипов, и также пломбировка кровоточащих сосудов с помощью специальных паст. Новые аппараты видеоэндоскопы снабжены телекамерами, которые позволяют смотреть на телеэкране и записывать на видеокассету информацию о патологическом процессе.

Существует верхняя *гастроинтестинальная эндоскопия*. Сюда относится *эзофагогастродуоденоскопия*. Применяют аппараты с прямым, косым и боковым видением.

Перед процедурой осуществляют местное обезболивание глотки лидокаином, затем производят введение эндоскопа в пищевод и желудок и затем в пилорический отдел. Увиденные патологические очаги фотографируются, из подозрительных участков берется щеточная биопсия. Риск проведения невелик, осложнения встречаются при одном введении на тысячу.



# 3. Ультразвуковое исследование

- не создает биологического риска для проводящего его оператора и пациента;
- позволяет исследовать пациента без применения анестезии и седативных средств;
- дает возможность серийных исследований пациента с минимальной затратой средств;
- позволяет оценивать перистальтическую активность желудка и кишечника, исследовать слои стенок желудка и кишечника, оценить состояние других структур, находящихся в брюшной полости ;
- облегчает получение проб патологического материала для цитологического исследования, снижая до минимума инвазивность биопсии.

*Основными недостатками УЗИ, ограничивающими его применение для исследования органов пищеварения являются:*

- трудность исследования всех участков желудка и кишечника;
- отсутствие патогномичных ультразвуковых признаков при многих болезнях
- сложность точного определения локализации поражений в кишечнике, обусловленная отсутствием в нем референтных (маркерных) точек;
- наличие в органах пищеварения газов, что ограничивает возможность визуализации внутренних органов, и служит причиной артефактов, которые не позволяют точно оценить состояние стенок кишечника, расположенных дистальнее излучателя;
- трудности, связанные с обнаружением и оценкой состояния поджелудочной железы.



B	Frq	8.0 MHz
Gn	82	
E/A	1/3	
Map	C/D	
D	5.0 cm	
DR	72	
FR	43 Hz	
AO	100 %	

1 1 0.77 cm


## 4. Компьютерная томография

Метод построен на выявлении абсорбции гамма-лучей в различных тканях. С помощью этого метода получают последовательные поперечные изображения сечения обследуемого органа. Компьютерную томографию можно применять как с контрастированием, так и без него.

Компьютерная томография брюшной полости особенно информативна для выявления кист, абсцессов паренхиматозных органов, гематом, гемангиом, так как очень хорошо определяет плотность тканей. В отличие от УЗИ, на проведение компьютерной томографии не влияет кишечный газ, но негативным фактором может быть истощение больного. Отсутствие жировой прослойки может ухудшить визуализацию.

Существует обязательное правило: методом выбора является УЗИ, а не компьютерная томография, там, где это возможно.





10cm



# 5. Магнитно резонансная томография

Позволяет произвести пространственное сканирование тканей идентичное УЗИ и компьютерной томографии. Основан метод на различиях магнитных свойств разных тканей. Срезы выполняются продольные. Метод особо ценен для изучения кровотока органов брюшной полости.



**Современная лучевая  
диагностика опухолей толстой  
кишки**

**Л.М. Портной, Г.А. Сташук**

**Рис. 6. Больной К., 45 лет.  
Диагноз: рак сигмовидной  
кишки.**

**б – препарат  
резецированной части  
кишки: бугристое  
многоузловое  
образование.**

# Список литературы

1. Дмитриева Л.И., Шмелев Е.И., Степанян И.Е. и др. Принципы лучевой диагностики 1999; 4: 11-16.
2. Котляров П.М., Гамова, Нуднов Н.В., Кошелева Н.В. и др. Магнитно-резонансная томография в визуализации органов, средостения и при некоторых патологических состояниях., 1999; 4: 26-30.
3. Котляров П.М. Лучевая диагностика . *Materia medica*, 1995;4: 19-26.
4. Розенштраух Л.С., Рыбакова Н.И., Виннер М.Г. Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения М