



ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ



ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛ СМИРНОВ МИХАИЛ І ІВ





ВИЧ – ЭТО СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА, Т.Е. ВИРУСА, ПОРАЖАЮЩЕГО ИММУННУЮ СИСТЕМУ.

ВИЧ ЖИВЕТ И РАЗМНОЖАЕТСЯ ТОЛЬКО В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА.



ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ) ПОРАЖАЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО У НЕЕ ТЕРЯЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ ОРГАНИЗМ ОТ БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ.

РАЗМНОЖАЯСЬ, ВИЧ ПОРАЖАЕТ КЛЕТКИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ - CD4+-Т-ЛИМФОЦИТЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМНОЖЕНИЯ ВИЧ КОЛИЧЕСТВО CD4+-Т-ЛИМФОЦИТОВ ПОСТЕПЕННО УМЕНЬШАЕТСЯ. ЧЕЛОВЕК, ИНФИЦИРОВАННЫЙ ВИЧ, СО ВРЕМЕНЕМ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ВОСПРИИМЧИВЫМ ДАЖЕ К ИНФЕКЦИЯМ, КОТОРЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ.



ИММУННАЯ СИСТЕМА — ОДНА ИЗ
ВАЖНЕЙШИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА.
ОНА ЗАЩИЩАЕТ ОТ РАЗЛИЧНЫХ
ИНФЕКЦИЙ И ОПУХОЛЕЙ. КЛЕТКИ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
ВЫРАБАТЫВАЮТ ОСОБЫЕ БЕЛКИ —
АНТИТЕЛА, КОТОРЫЕ
РАСПОЗНАЮТ ПОПАВШИЕ В
ОРГАНИЗМ ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ И
УНИЧТОЖАЮТ ИХ.



ВИЧ

ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
МОЖНО ТОЛЬКО ОТ
ИНФИЦИРОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА.
ЧТОБЫ ПРОИЗОШЛО ЗАРАЖЕНИЕ,
ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ВИРУСНЫХ ЧАСТИЦ ДОЛЖНЫ
ПОПАСТЬ ИЗ ОРГАНИЗМА
ИНФИЦИРОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА В
КРОВОТОК ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА.



Поэтому ВИЧ может попасть в организм человека только тремя путями:

- ЧЕРЕЗ КРОВЬ, НАПРИМЕР:

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСТЕРИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ ТАТУИРОВОК, ПИРСИНГА, МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА;

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЧУЖИМИ БРИТВЕННЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, ЗУБНЫМИ ЩЕТКАМИ;

ЧЕРЕЗ ПЕРЕЛИВАНИЕ НЕПРОВЕРЕННОЙ ДОНОРСКОЙ КРОВИ ИЛИ ПЕРЕСАДКУ ОРГАНОВ (В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ТАКОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИ СВЕДЕНА К НУЛЮ)

-ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ (АНАЛЬНОМ ИЛИ ВАГИНАЛЬНОМ) СЕКСЕ

- ОТ ИНФИЦИРОВАННОЙ МАТЕРИ К ЕЕ РЕБЕНКУ ВНУТРИУТРОБНО, ПРИ РОДАХ ИЛИ ПРИ ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ.




ГДЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ВИЧ?

ВИЧ ПРИСУТСТВУЕТ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ОРГАНИЗМА, ТАКИХ КАК КРОВЬ, СПЕРМА, ВЛАГАЛИЩНОЕ ОТДЕЛЯЕМОЕ И ГРУДНОЕ МОЛОКО.

БЕЗОПАСНО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ С ЧЕЛОВЕКОМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ?

СЕКС С ЧЕЛОВЕКОМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ, БЕЗОПАСЕН, ЕСЛИ ВИРУС У ТАКОГО ЛИЦА ПОЛНОСТЬЮ ПОДАВЛЕН ПОСРЕДСТВОМ ЛЕЧЕНИЯ. ТАКЖЕ СЕКС БЕЗОПАСЕН ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕЗЕРВАТИВА ИЛИ ПРИМЕНЕНИИ ДОКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ, КАК РЕКОМЕНДОВАНО ЛИЦОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ.




СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД) – КЛЮЧЕВАЯ СТАДИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, КОТОРАЯ РАЗВИВАЕТСЯ У ЧЕЛОВЕКА НА ФОНЕ ВЫРАЖЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА, ВЫЗВАННОГО ДЛИТЕЛЬНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ.

ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ МОЖЕТ КАЖДЫЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛА, ВОЗРАСТА, НАЦИОНАЛЬНОСТИ, СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КАКОЙ-ЛИБО



Возраст инфицированных



НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ, ЧТО ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- ЧЕРЕЗ РУКОПОЖАТИЯ, ОБЪЯТИЯ, ЛАСКИ, ПОЦЕЛУИ (ЕСЛИ НА КОЖЕ ИЛИ ВО РТУ НЕТ ОТКРЫТЫХ РАНОК);

- ПРИ КАШЛЕ, ЧИХАНИИ, ДЫХАНИИ, ЧЕРЕЗ СЛЮНУ, СЛЕЗЫ ИЛИ ПОТ; ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕЙ ПОСУДЫ, ПОЛОТЕНЕЦ, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ; ПОЕЗДКАХ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ;

- МОЖНО КАСАТЬСЯ ОДНИХ И ТЕХ ПРЕДМЕТОВ (ПОРУЧНИ, ДВЕРНЫЕ РУЧКИ, ТЕЛЕФОНЫ, ДЕНЬГИ И ПРОЧ.);

- ПРИ ПОСЕЩЕНИИ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛИКЛИНИК, СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ, ДИСКОТЕК, ТУАЛЕТОВ, БАССЕЙНОВ, САУН, В ДУШЕ, НА ПЛЯЖЕ И В ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ; ПРИ УКУСАХ НАСЕКОМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КРОВОСОСУЩИХ.



СИМПТОМЫ ВИЧ ВАРЬИРУЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ИНФЕКЦИИ. МНОГИЕ ЛЮДИ УЗНАЮТ О СВОЕМ СТАТУСЕ ЛИШЬ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИХ СТАДИЯХ. НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРВЫХ НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ У ЛЮДЕЙ МОЖЕТ НЕ ПОЯВЛЯТЬСЯ НИКАКИХ СИМПТОМОВ ИЛИ РАЗВИТЬСЯ ГРИППОПОДОБНОЕ СОСТОЯНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛИХОРАДКУ, ГОЛОВНУЮ БОЛЬ, СЫПЬ ИЛИ БОЛЬ В ГОРЛЕ.



ПО МЕРЕ ТОГО КАК ИНФЕКЦИЯ ПОСТЕПЕННО ОСЛАБЛЯЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ, У ЛЮДЕЙ МОГУТ РАЗВИВАТЬСЯ ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ, ТАКИЕ КАК УВЕЛИЧЕННЫЕ ЛИМФОУЗЛЫ, ПОТЕРЯ ВЕСА, ЛИХОРАДКА, ДИАРЕЯ И КАШЕЛЬ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ У НИХ МОГУТ РАЗВИТЬСЯ ТАКИЕ ТЯЖЕЛЫЕ БОЛЕЗНИ, КАК ТУБЕРКУЛЕЗ, КРИПТОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ, ТАКИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КАК ЛИМФОМЫ И САРКОМА КАПОШИ, И ДРУГИЕ.

Признаки и симптомы

Как можно предотвратить передачу ВИЧ?



#СТОПВИЧСПИД



НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ – ИЗБЕГАТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ВИДОВ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕДУТСЯ ИНТЕНСИВНЫЕ ПОИСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВИЧ. ОДНАКО ПОКА ЧТО, ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ СЧИТАЕТСЯ НЕИЗЛЕЧИМЫМ. ЕДИНСТВЕННЫМ ДЕЙСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКА.





Тестирование и
консультирование

БЕСПЛАТНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ ДОСТУПНО ВСЕМ. ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ ПРОВОДИТСЯ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОНОРОВ И РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ. ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ АНОНИМНЫМ.




ВИЧ - инфекция и СПИД: знать и не бояться!

Что из себя представляет синдром приобретенного иммунодефицита, и как оградить себя от этой болезни.

ВИЧ

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. Это вирус, который атакует и разрушает иммунную систему человека - систему естественной защиты от инфекций.



СПИД

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита - является конечной стадией ВИЧ-инфекции, когда симптомы заболевания становятся явными.