

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ПРИ УТОПЛЕНИИ

Сегежа 2020

ЧЕЛОВЕК ТОНЕТ!!!

Как извлечь пострадавшего из воды?

При спасении утопающего следует точно оценить свои силы и возможности, без ложного геройства.



Если тонущий схватил вас за руку или за шею, следует нырнуть - он инстинктивно разожиет руки

"МОКРОЕ" УТОПЛЕНИЕ

Возникает, когда в легкие и дыхательные пути попадает большое количество воды.

Признаки «мокрого» утопления— синюшный цвет лица и кожи, изо рта может выделяться вода или пена.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- 1. Удалить воду из дыхательных путей пострадавшего
- При необходимости нужно очистить полость рта от ила, рвотных масс и пр.
- 3. Если отсутствует кашель, рвота, нет дыхания и сердцебиения немедленно приступать к сердечно-легочной реанимации.



"СУХОЕ" УТОПЛЕНИЕ

Возникает, когда вода попадает в гортань и вызывает рефлекторный спазм, который приводит к удушью. Пострадавший сразу теряет сознание и опускается на дно.

Признаки «сухого» утопления— отсутствие синюшности кожных покровов, или ее умеренная выраженность.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПРИ ТАКОМ ТИПЕ УТОПЛЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ У ПОСТРАДАВШЕГО ДЫХАНИЯ И ПУЛЬСА, НЕОБХОДИМО СРАЗУ ПРИСТУПАТЬ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ!

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ (СПР)

Неотложная медицинская процедура, направленная на восстановление жизнедеятельности организма, и выведение его из состояния клинической смерти.

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:


- 1. Компрессии грудной клетки (непрямой массаж сердца)
- 2. Искусственная вентиляция легких (искусственное дыхание)

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ: ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ – ДЫХАНИЯ И ПУЛЬСА

KOMPECCIVI FPYZHOЙ KIETKI (HETPANOЙ MACCAK CEPZLA)

- Основание ладони помещаются на середину грудной клетки пострадавшего.
- Кисти рук берутся в замок.
- Руки выпрямлены.

Компрессии грудной клетки осуществляются на твердой ровной поверхности на глубину 5-6 см, с частотой 100 в минуту.



MONOCTBEHLAR BEHTVIRALVIR JERWA VVON COTBEHLOE ABNALVE

После проведения КОМПРЕССИЙ, необходимо осуществлять вдохи искусственной вентиляции легких:

- Зажмите нос пострадавшего двумя пальцами.
- С силой выполните выдох в его дыхательные пути в течение 1 секунды.
- Ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха авляется подъем грудной клетки.



Далее следует продолжить реанимационные мероприятия, чередуя 30 компрессий грудной клетки с 2-мя вдохами искусственной вентиляции легких.

Реанимационные мероприятия продолжать до появления признаков жизни — дыхания и пульса, или до приезда скорой помощи.

Пострадавшего следует госпитализировать, даже если он в сознании и хорошо себя чувствует

TETEOHI CHACIETHUR CTYKE

- C 20000CK020 Medepoha

101 - с мобильного

