



## Инфаркт пен инсультта БМК



Әшімбаева Айзат, МІ-201


# Миокард инфарктысы және инсульт

- **Миокард инфарктысы** – жүрек бұлшық етінің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуынан онда өлі еттену (некроз) ошағының пайда болуы.
- **Инсульт** (лат. *insultus* - соққы, қыспа талу, инсульт) - ми ұлпасының зақымдалуын, оның қызметінің, мидағы қан айналысының кенеттен бұзылуы; осының салдарынан миға қан құйылады, немесе ми тамырлары бітеліп қалады (тромбоз).



# Себептері:





- 1 — сол жақтағы бұғана асты артериясы;
- 2 — оң жақтағы бұғана асты артериясы;
- 3 — қалқанша мойын бағаны;
- 4 — сол жақтағы жалпы ұйқы артериясы;
- 5 — йық – бас сабауы;
- 6 — қолқа доғасы;
- 7 — жоғарғы қуыс венасы;
- 8 — өкпе сабауы;
- 9 — жүрек аралық қалта;
- 10 — сол құлақ;
- 11 — оң құлақ;
- 12 — артериалды конус;
- 13 — оң өкпе;
- 14 — сол өкпе;
- 15 — оң қарынша;
- 16 — сол қарынша;
- 17 — жүрек ұшы;
- 18 — плевра;
- 19 — кекет

## Жүректің орналасуы

# Пульсты қалай анықтайды?



**Пульс** – тамыры соғуы, жүректің систола және диастола жұмыстары, яғни жүрек соғуынан қан тамырлары кенересінің кеңеюі және таралуы, жүрек соғуынан қан тамырларының бүлкілдеуі

**Тахикардия** – жүректің қатты соғуы

**Брадикардия** – жүректің ақырын соғуы

# Инфаркт белгілері:



Ауырған адам күрт әлсірейді, өлімнен қорқу сезімі, сондай-ақ, демікпе және жүрек қызметінің басқа да бұзылу көріністері байқалады.

Науқастың тынысы тарылып ауа жетіспейді, лоқсиды, әлсірейді және құсуы да мүмкін.


Сол қолға және иыққа берілетін төс аумағында ауруы.

1 тәулікте – **тахикардия**, жүрек ырғағының бұзылуы.

20-40% адамдарда шок және өкпе ісінуі кездеседі.

2 тәуліктің соңында – **температурасы 37-38 градусқа жетеді.**

# Инфарктағы БМК:



- 103 телефоны бойынша жедел жәрдем шақыру
- Дәрігер келгенше науқасты қозғалтпай, тыныштандырып, жатқызып қою керек. Жүректің ауырғанын баспаса да нитроглицеринді бірнеше рет ішкізу керек.
- Ауырсынуды жеңілдету үшін кеудеге қыша қағаз қою, аяққа жылытқыш (грелка) басу, қолды жылыту әрекеттерін жасау керек.

# Инсульт белгілері:



- Көп ретте ауру адам кенеттен құлан қалады, есінен танады; оларда аяқ пен қолдың парезы (сал болуы) әдетте дененің бір жағынан басталады, тілі күрмеледі, алғашқы сағаттарда тыныс алуы бұзылып, денесі тырысады, құсады.






# Инсульттағы БМК:

- Жедел жәрдем шақыру
- Жедел жәрдем келгенше адамды абсолютті тыныштықта қалтыру
- Адамды жартылай отырғызу немесе жатқызу
- Андипал 1 дәрісін беру, немесе валериан тұнбасын 10-15 тамшысын беру
- Тахикардии кезінде корвалолдың 8-10 тамшысы
- Адамға оттегінің көп мөлшерде келуін қамтамасыз ету

# Инфаркт және инсульт бойынша соңғы 3 жыл ішіндегі адам өлімінің көрсеткіші:



Назарларыңызға  
рахмет!