

Пузырные дерматозы

- Эта группа заболеваний кожи, различных по патогенезу, клинике, лечению и прогнозу, объединяется первичным элементом в виде пузыря. Наряду с дерматозами, относительно часто встречающимися в практике дерматолога (герпетиформный дерматит Дюринга, обыкновенная, или вульгарная, пузырчатка). Пузыри при этих дерматозах обычно являются мономорфным признаком, реже сочетаются с другими первичными элементами (дерматит Дюринга).

Пузырчатка

- хроническое аутоиммунное заболевание кожи, проявляющееся образованием интраэпидермальных пузырей вследствие акантолиза.
- Акантолиз - дегенеративное изменение шиповатого слоя эпидермиса, проявляющееся разрушением межклеточных мостиков, потерей клетками большей части цитоплазмы и морфологическими изменениями ядер; приводит к образованию пузырей.

- Вульгарная базального
 - Вегетирующая
 - Эритематозная (себорейная)
 - Листовидная слоя
 - Бразильская (разновидность листовидной)
- акантолиз
- слоя
- акантолиз
- зернистого
-
- ```
graph LR; A[Вульгарная базального] --- B[акантолиз]; C[Вегетирующая] --- D[слоя]; E[Эритематозная (себорейная)] --- D; F[Листовидная] --- G[зернистого]; H[Бразильская (разновидность листовидной)] --- G;
```

## Пузырчатка вульгарная

- **Этиология.**

обнаруживают циркулирующие антитела типа IgG, имеющие сродство к межклеточному веществу шиповатого слоя эпидермиса и мембранным антигенам шиповатых эпителиоцитов. Количество антител коррелирует с тяжестью болезни.

Иммунные изменения лежат в основе развития акантолиза. Активное участие в этом процессе принадлежит также клеточным цитотоксическим реакциям, нарушению баланса в калликреин-кининовой системе, участию лимфокиноподобных веществ, эйкозаноидов, эндопротеиназ и их ингибиторов.











# Пузырчатка вегетирующая





# Листовидная пузырчатка





# Себорейная пузырьчатка



Себорейная (эритематозная) пузырьчатка







## финальная стадия

пациентки с течением ГРП более 10 лет, несмотря на прием  
кортикостероидов с преднизолоном, локальную терапию дексаметазоном  
и заменителями слезы, прогрессирование заболевания привело к  
полной перфорации, потребовавшей энуклеации глазного яблока  
и значительное снижение зрения до 0,01 на втором глазу



темно: тяжелое поражение слизистой оболочки рта и пищевода

[www.organum-visual.ru](http://www.organum-visual.ru) Дроздова Е.А., РООФ-3

# Герпетиформный дерматит (болезнь Дюринга)

- Хроническое аутоиммунное заболевание, проявляющееся герпетиформной сыпью и сильнейшим зудом или жжением.
- Этиология: 1) повышенная чувствительность к глютену (белок злаков)
- 2) повышенная чувствительность к йоду
- 3) нарушения ЖКТ
- 4) неизвестной этиологии





**\* Наиболее типичное расположение дерматита Дюринга: локти, разгибательные поверхности предплечий, в 1/3 случаев элементы возникают на лице и шее, реже поражаются ягодицы, колени, крестец, затылок. Жжение и зуд бывают настолько сильными, что расчесывание нередко маскирует первичные высыпания.**



© Олег Васильевич Терлецкий, 2012



