

Аптечка Анти-СПИД и ее применение.

Аптечка «АнтиВИЧ»

Аптечка АнтиВИЧ предназначена для оказания первой помощи и профилактике распространения ВИЧ-инфекции на предприятиях быта.

В состав аптечки входят (для ЛПУ):

- 70%-й спирт – 100 мл;
- 5-й йод – 50 мл;
- Навески марганцовки по 0,5 г. – 5 шт.;
- Дистиллированная вода – 100 мл;
- Мензурки – 2 шт.;
- Ножницы;
- Бактерицидный лейкопластырь – 2 уп.;
- Лейкопластырь – 1 уп.;
- Перчатки – 1 пара;
- Стерильные салфетки – 2 уп.;
- Глазные пипетки – 2 шт.



При повреждении кожного покрова работника загрязненным жидким материалом инфицированного порядок действия таков:

Снимаем перчатки.

Давим на рану, чтобы вышла кровь.

Обрабатываем ранку 70%-м спиртом.

Моем руки с мылом под проточной водой, не забываем обработать руки йодом (в области поражения).



**Если же жидкость попала на слизистую глаза,
промываем орган зрения под проточной водой.
Повторяем процедуру, используя марганцовку, разведенную в пропорции
1:10000.**



**Материал попал в нос – носовую полость промывают водой и раствором марганцовки (0,05%).
Слизистую рта очищают водой, затем спиртом.**



При попадании жидкости на неповрежденный кожный покров, кожу необходимо протереть спиртом, помыть с использованием туалетного мыла, вновь обработать спиртом.



В случае наличия порезов и уколов на коже работника необходимо немедленно (в течение 120 минут) организовать лечение человека, попавшего под угрозу заражения.

