

АГРОФИРМА «ПОИСК»

Особенности формирования растений огурца, томата, перца в теплицах.



Прокопов Валерий Александрович
агроном-технолог Агрофирмы «Поиск», к. с.-х. н.



АГРОФИРМА ПОИСК

Задача формирования

состоит в управления процессами роста растений, перераспределения продуктов ассимиляции в органах растения, наиболее рационального использования растением внутреннего объема теплицы, создания благоприятного режима освещенности и влажности для обеспечения максимальной урожайности.




Формирование растений партенокарпического огурца в грунтовых пленочных (поликарбонатных) теплицах в весенне-летнем обороте

3

Вариант формировки растений огурца с 2-3 завязями в узле.

Гибриды Форсаж F1, Портос F1, Каролина F1, Кристина F1 и другие.

Основные моменты:




1. Ослепление первых 4-5 узлов, полное удаление зеленцов и боковых побегов.
2. С 5-9 узла удаление только боковых побегов
3. С 10-11 узла (на высоте главного стебля около 1 метра) оставлять боковые побеги и прищипывать их на один лист.
4. Удалить затеняющий лист (можно несколько) на месте переброса (20-21 узел) главного стебля через шпалеру.
5. Удаление всех боковых побегов на шпалере.
6. После двойного прокручивания стебля по шпалере прищипнуть главный стебель при достижении длины в 50 см.
7. Появившиеся боковые побеги на главном стебле после прокручивания прищипнуть на 2 листа.



Формирование растений партенокарпического огурца в грунтовых пленочных (поликарбонатных) теплицах в весенне-летнем обороте

Вариант формирования растений огурца с букетным типом завязи (4-5 и более зеленцов). Гибриды Атос F1, Бастион F1.



Основные моменты:

1. Ослепление первых 4 - 5 узлов, полное удаление зеленцов и боковых побегов.
2. С 5-17 узла удалить только боковых побегов.
3. В 18-20 узле оставить боковые побеги и прищипнуть их на один лист.
4. Удалить затеняющий лист на месте переброса (20-21 узел) главного стебля через шпалеру.
5. Удаление всех боковых побегов из пазух на шпалере.
6. После двойного прокручивания стебля по шпалере прищипнуть главный стебель.




Формирование растений индетерминантных томатов в один стебель 5 в грунтовых пленочных (поликарбонатных) теплицах в весенне-летнем обороте

Гибриды - Огонь F1, Алая каравелла F1, Маргарита блюз F1,
Океан F1, Коралловый риф F1, Кассиопея F1 и другие.

Основные моменты:

**Сформировать 6-8 кистей и
прищипнуть главный стебель**



1. Удаление всех пасынков, ведение культуры в один стебель.
2. В неделю удалять не более 1-2 листьев. Начинать следует после 35-40 дней после высадки рассады на постоянное место.
3. Убирать нижние листья нужно так чтобы при побурении первой цветочной кисти все листья до нее были удалены.
4. Сформировать растение на 6-8 кистей, прищипнуть главный стебель за 40-45 дней до окончания вегетации.
5. Прищипку проводить так чтобы над последней цветочной кистью оставалось 2-3 листа.



Формирование растений перца в грунтовых пленочных (поликарбонатных) теплицах в весенне-летнем обороте

Вариант формирования растения перца в два стебля



Основные моменты:

1. Вести культуру желательно в два, максимум три стебля.
2. Удаление появляющихся пасынков из нижних листьев.
3. Нижние листья удалять при первых сборах, для улучшения проветривания между растениями.
4. Удаление центрального (коронного цветка), образованного в первой развилке главного стебля.
5. При разветвлении скелетных стеблей прищипывать наименее развитый побег, оставляя бутон с листом.
6. Прищипка главных стеблей за 40 суток до окончания вегетации.





АГРОФИРМА ПОИСК

Благодарю за внимание!