


Анаэробы

Желанникова Елена



АНАЭРОБЫ – ОРГАНИЗМЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ ЭНЕРГИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОСТУПА КИСЛОРОДА ПУТЁМ СУБСТРАТНОГО ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ, КОНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ НЕПОЛНОГО ОКИСЛЕНИЯ СУБСТРАТА ПРИ ЭТОМ МОГУТ БЫТЬ ОКИСЛЕНЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЭНЕРГИИ В ВИДЕ АТФ В ПРИСУТСТВИИ КОНЕЧНОГО АКЦЕПТОРА ПРОТОНОВ ОРГАНИЗМАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ.



прокариотов



грибы водоросли растения

животные

фораминиферы

гельминтов

сосальщики

ленточные

черви

круглые черви

аскарида



поперечно-полосатой мускулатуры

гипоксии



луи пастер

бактерии маслянокислого брожения Анаэробное

дыхание

биохимических реакций

кислорода

нитратов

энергетического

обмена катаболизм диссимиляция

окислением углеводов

липидов

аминокис

лот

ции,
той
десят
и
в
ся к
ium).

аэробное
[3]
кислорода
[2]
парциальным давлением
кислорода
молочнокислые
маслянокислые бактерии
бактерий архей Bacteroides



тический обмен в тканях человека и животных[править | править вики-текст]

Основной источник:

анаэробное и аэробное энергообразование в тканях человека

и человека отличаются повышенной устойчивостью к гипоксии (особенно мышечная). В тканях синтез АТФ идет аэробным путём, а при напряженной мышечной деятельности, в мышцах затруднена, в состоянии гипоксии, а также при воспалительных реакциях в тканях — анаэробные механизмы регенерации АТФ. В скелетных мышцах выявлены 3 вида анаэробных и только один аэробный путь регенерации АТФ.

3 вида анаэробного пути синтеза АТФ

К анаэробным относятся:

1) фосфогенный (или алактатный) механизм — перефосфорилирование между креатинфосфатом и АДФ

2) ресинтез (иначе ресинтез) АТФ при реакции трансфосфорилирования 2 молекул АДФ (аденилатциклаза)

3) анаэробное расщепление глюкозы крови или запаса гликогена, заканчивающийся образованием молочной кислоты (иначе именуется «лактатным»).


Непосредственным следствием гликолиза является критическое снижение pH тканей — ацидоз. Эффективным транспортом кислорода гемоглобином, и формирует положительную обратную связь.

Время удержания максимальной мощности и оптимум энергообеспечения тканей. Наибольшая мощность и наименьшее время удержания:

1) фосфаткиназный механизм (3600 Дж/(кг·мин), при времени 6–12 сек)

2) лактатный (2510 Дж/(кг·мин), при времени 30–60 сек)

3) аэробный (600 Дж/(кг·мин), при времени около 600 секунд).



Механизмы ресинтеза АТФ мышцах. В рамках представлены энергетические субстраты выделены названия механизмов

Последовательность подключения механизмов анаэробного и аэробного энергообразования в некоторых тканях человеческого организма (схема Гумовского А.Н.)

