

Диагностические критерии клинического состояния,
специфические для каждого психоактивного
вещества
(МКБ-10):

СОСТОЯНИЕ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПАВ.

СИНДРОМ ОТМЕНЫ ПАВ.

Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением ПАВ
F1x.0 Острая интоксикация

А. Должны выполняться общие критерии для острой интоксикации (F1x.0)

Б. Должно иметь место дисфункциональное поведение, о чем свидетельствует по меньшей мере один признак из числа следующих:

-
-

В. Должен присутствовать минимум один из следующих признаков:

-
-

Психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением ПАВ
F1x.3 Состояние отмены ПАВ.

**А. Должны выполняться общие критерии
состояния отмены F1x.3.**

**Б. Должны присутствовать любые два или три
признака из числа следующих:**

-
-
-

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя

F10.0 Острая интоксикация

Б.

- расторможенность;
- склонность к аргументированию;
- агрессивность;
- лабильность настроения;
- нарушения внимания;
- нарушения суждений;
- нарушение личностного функционирования.

В.

- шаткость походки;
- затруднения в стоячем положении;
- смазанная речь;
- нистагм;
- сниженный уровень сознания (например, ступор или кома);
- покрасневшее лицо;
- инъектированность склер.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя F10.3 Абстинентное состояние (состояние отмены алкоголя).

Б.

- желание принять алкоголь
- тремор языка, век или вытянутых рук;
- потливость;
- тошнота или рвота;
- тахикардия или гипертензия;
- психомоторная ажитация;
- головная боль;
- бессонница;
- чувство недомогания или слабости;
- транзиторные зрительные, тактильные или слуховые галлюцинации или иллюзии;
- большие судорожные припадки.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов.

F11.0 Острая интоксикация.

Б.

- апатия и седация;
- расторможенность;
- психомоторная заторможенность;
- нарушения внимания;
- нарушения суждений;
- нарушение личностного функционирования.

В.

- сонливость;
- смазанная речь;
- сужение зрачков (*за исключением состояний аноксии от тяжелой передозировки, когда зрачки расширяются*);
- сниженный уровень сознания (например, *ступор или кома*).

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов.

F11.3 Состояние отмены опиоидов.

Б.

сильное желание принять опиоидное средство;
кровотечение из носа или чихание;
слезотечение;
мышечные боли или судороги;
абдоминальные судороги;
тошнота или рвота;
диарея;
расширение зрачков;
образование "гусиной кожи" или периодический озноб;
тахикардия или гипертензия;
зевота;
беспокойный сон.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов F12.0 Острая интоксикация.

Б.

- эйфория и расторможенность;
- тревога или агитация;
- подозрительность или параноидная идеация;
- чувство замедления времени и (*или*) переживание быстрого течения мыслей;
- нарушение суждений;
- нарушение внимания;
- расстройство скорости реакций;
- слуховые, зрительные или тактильные иллюзии;
- галлюцинации с сохранностью ориентировки;
- деперсонализация;
- дереализация;
- нарушение личностного функционирования.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов F12.0 Острая интоксикация.

В.

- усиление аппетита;
- сухость во рту;
- инъектированность склер;
- тахикардия.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов F12.3 Состояние отмены каннабиоидов.

Примечание:

Это плохо очерченный синдром, для которого в настоящее время не могут быть установлены определенные диагностические критерии.

Он развивается после продолжительного употребления каннабиса в высоких дозах. Сообщалось, что он длится от нескольких часов до 7 дней.

Его симптомы и признаки включают:

- тревогу,
- раздражительность,
- тремор вытянутых рук,
- потливость и мышечные боли.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств

F13.0 Острая интоксикация

Б.

эйфория и расторможенность;
апатия и седация;
грубость или агрессивность;
лабильность настроения;
нарушение внимания;
антероградная амнезия;
нарушение психомоторной продуктивности;
нарушение личностного функционирования.

В.

шаткость походки;
затруднения в положении стоя;
смазанная речь;
нистагм;
снижение уровня сознания (например, ступор, кома);
эритематозные высыпания на коже или волдыри.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств

F13.3 Состояние отмены седативных или гипнотических средств

Б.

- тремор языка, век или вытянутых рук;
- тошнота или рвота;
- тахикардия;
- постуральная гипотензия;
- психомоторная ажитация;
- головная боль;
- бессонница;
- чувство недомогания или слабости;
- транзиторные зрительные, слуховые или тактильные галлюцинации или иллюзии;
- параноидная идеация;
- большие судорожные припадки.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина F14.0 Острая интоксикация

Б.

- эйфория и ощущение повышенной энергичности;
 - повышение уровня бодрствования;
 - претендующие на грандиозность поступки или соответствующие идеи;
 - грубость или агрессивность;
 - склонность к аргументации;
 - лабильность настроения;
 - характеризующееся повторяющимися стереотипиями поведение,
 - слуховые, зрительные или тактильные иллюзии;
 - галлюцинации обычно с сохранностью ориентировки;
 - параноидная идеация;
 - нарушение личностного функционирования.
-

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина F14.0 Острая интоксикация

В.

- тахикардия (иногда брадикардия);
- кардиальные аритмии;
- гипертензия (иногда гипотензия);
- потливость и ознобы;
- тошнота или рвота;
- признаки потери веса;
- расширение зрачков;
- психомоторная ажитация (иногда заторможенность);
- мышечная слабость;
- боли в груди;
- судороги.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина F14.3 Состояние отмены кокаина.

Б. Имеет место дисфорическое настроение
(например, печаль или ангедония).

В.

- летаргия и усталость;
- психомоторная заторможенность или ажитация;
- сильное желание принять кокаин;
- повышенный аппетит;
- бессонница или гиперсомния;
- причудливые или неприятные сновидения.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)

F15.0 Острая интоксикация

Б.

- эйфория и чувство повышенной энергичности;
- повышение уровня бодрствования;
- претендующие на грандиозность поступки или соответствующие идеи;
- грубость или агрессивность;
- склонность к аргументации;
- лабильность настроения;
- расширение зрачков;
- слуховые, зрительные или тактильные галлюцинации;
- галлюцинации, обычно с сохранностью ориентировки;
- параноидная идеация;
- нарушение личностного функционирования.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)

F15.0 Острая интоксикация

В.

- тахикардия (иногда брадикардия);
 - кардиальные аритмии;
 - гипертензия (иногда гипотензия);
 - потливость и озноб;
 - тошнота или рвота;
 - признаки потери веса;
 - расширение зрачков;
 - психомоторная ажитация (иногда заторможенность);
 - мышечная слабость;
 - боли в груди;
 - судороги.
-

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)

F15.3 Состояние отмены других стимуляторов, включая кофеин.

Б. Имеет место дисфорическое настроение (например, печаль или ангедония).

В.

- летаргия и усталость;
- психомоторная заторможенность или усталость;
- сильное желание принять стимуляторы;
- повышенный аппетит;
- бессонница или гиперсомния;
- причудливые или неприятные сновидения.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов F16.0 Острая интоксикация

Б.

- тревога и боязливость;
- слуховые, зрительные или тактильные иллюзии или галлюцинации, возникающие в состоянии полного бодрствования;
- деперсонализация;
- дереализация;
- параноидная идеация;
- идеи значения;
- лабильность настроения;
- импульсивные поступки;
- гиперактивность;
- нарушение внимания;
- нарушение личностного функционирования.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов F16.0 Острая интоксикация

В.

- тахикардия;
- сердцебиение;
- потливость и ознобы;
- тремор;
- нечеткость зрения;
- расширение зрачков;
- нарушения координации.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака F17.0 Острая никотиновая интоксикация.

Б.

- бессонница;
- причудливые сны;
- лабильность настроения;
- дереализация;
- нарушение личностного функционирования.

В.

- тошнота или рвота;
- потливость;
- тахикардия;
- кардиальные аритмии.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака F17.3 Состояние отмены табака.

Б.

- сильное желание употребить табак (*или другие содержащие никотин средства*);
- чувство недомогания или слабость;
- тревога;
- дисфорическое настроение;
- раздражительность или беспокойство;
- бессонница;
- повышенный аппетит;
- усиленный кашель;
- изъязвления во рту;
- трудности в сосредоточении.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей F18.0 Острая интоксикация

Б.

- апатия и летаргия;
- повышенная склонность к аргументации;
- грубость или агрессивность;
- лабильность настроения;
- нарушение суждений;
- нарушение внимания и памяти;
- психомоторная заторможенность;
- нарушение личностного функционирования.

Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей F18.0 Острая интоксикация

В.

- шаткость походки;
- затруднения в положении стоя;
- смазанная речь;
- нистагм;
- снижение уровня сознания (например, ступор, кома);
- мышечная слабость;
- нечеткость зрения или диплопия.