


Презентация на тему  
« Род *Shigella* »

- Род Шигелл включает 4 вида :
- 1 *S. Dysenteriae* - 10 сероваров
- 2 *S. flexneri* – 13 сероваров
- 3 *S. boydii* – 15 сероваров
- 4 *S. sennei* – серологически однороден.

- **Дизентерия** — инфекционная болезнь человека, вызываемая бактериями рода шигелл, протекающая с преимущественным поражением дистального отдела толстой кишки, клинически характеризуется интоксикацией, болевым, спастическим и колитическим синдромами. Название данной болезни впервые дал Гиппократ.

- Морфологические и культурологические свойства Шигелл .
- Шигелл – мелкие палочки (2-3 мкм) с закругленными концами , в мазках располагаются беспорядочно , Грамм- спор не образуют, жгутиков не имеют поэтому они не подвижны . Факультативные анаэробы opt – 37 С , рН – 6,8 – 7,2 . На плотных средах образуют полупрозрачные гладкие и шероховатые колонии, на простых средах растут хорошо , чаще используют обогащающие среды для лучшего культивирования.

# Вид Shegella



Резистентность является возбудителем холеры , групп кишечных заболеваний, а так же дизетерии шигеллы могут сохранятся в воде, почве, на различных предметах в течении 10-15 суток, t 60 С бактерии убивает в течении 10-20 мин , так же могут погибать под действием 1% раствора лизола , что свидетельствует к устойчивости возбудителя дизентерии к действию дезинфектантов .

- Эпидемиология
- Источник (больной человек и бактерионоситель) → механизм заражения ( фекально-оральный) пути передачи в зависимости от возбудителя (пищевой, водный , контактно-бытовой ) дизентерия распространяется повсеместно , самые благоприятные условия для данного заболевания теплый сезон июнь-сентябрь .

- Патогенез поражение
- Быстрое размножение и инфильтрат соседних клеток , благодаря инвазивному фактору .  
Размножение шигелл в эпителиальных клетках вызывает механическое поражение клеток эпителия , что приводит к развитию дефектов слизистой оболочки и воспалительных реакций подслизистой с выходом элементов крови в просвет кишки.  
Эндотоксин который освобождается вызывает общую интоксикацию при этом усиливает перистальтику и понос . При этом кровь, которая выделяется попадает в кал . Под действием экзотоксина нарушается водно-солевой баланс и нарушение со стороны нервной системы .



## Клинические проявления

Инкубационный период дизентерии от 2 до 7 дней, протекать может бессимптомно или проходить очень тяжело ( $t$  (38-39), лихорадка, озноб, боли в желудке и понос. При острой форме у человека от 10 -25 актов дефекации в сутки, затем кол-во дефекации уменьшается и стул приобретает вид тертого картофеля. После перенесения заболевания остается кратковременный, непродолжительный иммунитет

- Профилактика
- Профилактика дизентерии сводится к соблюдению нормальных санитарных условий в быту и выполнению правил личной гигиены. Особенно тщательно следует соблюдать эти правила летом и осенью, когда отмечается естественная повышенная заболеваемость дизентерией. Всеми доступными мерами надо бороться с мухами. К профилактическим мерам также относится своевременное выявление и при необходимости лечение бациллоносителей или лиц, бывших в контакте с больными.