

ҚАЗАҚСТАН – РЕСЕЙ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Тақырыбы: Жұтқыншақтың зақымдалуы.


Орындаған: Каналбеков Ж.

609 –топ ВОП

Тексерген: Есенгалиева Р.Н.

Жоспары

- Кіріспе
- Негізгі бөлім
 - Анықтамасы
 - Классификация
 - Клиникасы
 - Диагностика
 - Емі
- Қорытынды

- 
- Жұтқыншақтың жарақаты- бұл жұтқыншақтың ішкі және сыртқы қабаттарының зақымдалуы. Зақымданулар өткір немесе қатты заттармен ұру және соғу нәтижесінде және химиялық заттармен улану кезінде пайда болады.

Классификация

- ✓ Жұтқыншақ жарақаты пайда болуына байланысты

ішкі (бөгде зат түскенде немесе ыстық сұйықтыңтың әсерінен пайда болады).

сыртқы (әскери уақытта жиі кездеседі).

- ✓ Жұтқышшақтың куюі

химиялық сұйықтықтардан (қышқылды заттар)

- ✓ Бөгде зат (балықтың немесе еттің сүйектері, қарандаш, ойыншық т.б.)

Клиникалық көрінісі

- ❖ Жұтқыншақтың сыртқы жарақаты кезінде- жұтқыншақ стенозы және дисфония көрінісі пайда болады. Көп мөлшерде қан жоғалту болуы мүмкін.
- ❖ Бөгде зат түскен жағдайда- оның көлемі мен орналасуына байланысты клиникалық көрінісі байқалады. Жұтынған кезде ауыру сезімі, тағам өтуінің қиындауы, саливацияның жоғарылауы, жөтелмен көрініс береді.
- ❖ Жұтқыншақтың күйі кезінде- жұтынған кезде қатты ауыру сезімі болады және ауыру сезімі құлаққа иррадияция береді, гиперсаливация, тыныс алудың қиындауы болады.

Асқынулары



Көп мөлшерде қан жоғалту

Травмалық шок

Механикалық асфиксия

Рефлекторлы тыныстың тоқтауы

лимфаденит

Абсцесс және флегмона

евстахиит

Диагностикасы

- ❖ Жалпы тексеру, анамнез жинау.
- ❖ фарингоскопия- жұтқыншақтың шырышты қабатында айқын гиперемия, инфильтрат, ісік және бөгде зат байқалады.
- ❖ Рентгенологиялық тексеру – зақымдалған аймақтың шекарасын, бөгде зат болған жайдайда оның орналасуын және көлемін.

Емі

- ❖ Жұтқыншақ жарақаты кезінде ең алдымен қан ағуды тоқтату және тыныс алуын қалпына келтіру. Қан ағуды тоқтату үшін ұйқы артериясын басып, байлам салу керек.
- ❖ Стационардағы ем - жарақатқа хирургиялық өңдеу жүргізіп, шокка қарсы препарат енгізіп, эндоскопия арқылы бөгде затты алады. Профилактикалық мақсатта сіреспеге қарсы вакцина енгізу тиіс.
- ❖ Көп мөлшерде мұрыннан қан кеткенде - артқы томпонада жасау керек.

❖ Тыныс алуды қалпына келтіру үшін - трахеостомия жасау керек.

❖ Науқастың жалпы жағдайына байланысты келесі медикаментозды ем жүргізіледі:

1. Қабынуға қарсы препарат

2. Антибиотикотерапия

3. Ісікке қарсы препарат

4. Дезинтоксикационды ем