

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ. ИППП.

Лекция № 5

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

1. Этиологический фактор (возбудитель заболевания) неспецифические и специфические
2. Локализация (воспалительные процессы верхнего и нижнего отделов)
3. Клиническое течение (острое, подострое, хроническое)

ФАКТОРЫ РИСКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

- **генитальные:** хронические воспалительные заболевания половых органов, бактериальный вагиноз, ИППП, урогенитальные заболевания у полового партнера.
- **Социальные:** хронические стрессовые ситуации, недостаточное питание, авитаминоз, алкоголизм, наркомания.

ФАКТОРЫ РИСКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

- ▣ **-поведенческие:** раннее начало половой жизни, различные половые партнеры, половые сношения во время менструации.
- ▣ **-экстрагенитальные факторы:** сахарный диабет, ожирение, иммунодефицитные состояния, дисбактериоз

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧАЮТ

1. воспаление в области наружных половых органов- вульвит и бартолинит.
2. воспаление влагалища- кольпит , вагинит.
3. воспаление матки- эндометрит, метроэндометрит
4. воспаление придатков матки – сальпингит, сальпингоофорит
5. воспаление клетчатки м/таза – параметрит
6. воспаление тазовой брюшины – пельвиоперитонит
7. Диффузное воспаление брюшины – перитонит

ВУЛЬВИТ

Вульвит — воспаление или раздражение вульвы (больших и малых половых губ) у женщин.



ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- Несоблюдение гигиены половых органов;
- Патологические выделения из влагалища, раздражающие внешние половые органы;
- Тесное синтетическое белье или прокладки, содержащие аллерген;
- Неправильно подобранные средства интимной гигиены;
- Глистные инвазии, инородное тело во влагалище.

СИМПТОМЫ

- Зуд и жжение в области половых органов, особенно при ходьбе или половом акте;
- Болезненная отечность больших и малых половых губ;
- Жжение при мочеиспускании.
- Выделения различного характера, зависящие от типа возбудителя.

ЛЕЧЕНИЕ ВУЛЬВИТА

. Специфических препаратов от вульвита не существует.

Назначают:

1.постельный режим


2.туалет наружных половых органов раствором перманганата калия, ромашки, шалфея.

3. при болях 5% мазь с анестезином.

4.общеукрепляющие,седативные, антигистаминные препараты

КОЛЬПИТ

Воспалительный процесс ,вызванный как специфическими так и неспецифическими возбудителями .



СИМПТОМЫ

- боль и жжение в области половых губ и влагалища;
- боль, усиливающаяся при мочеиспускании и половом акте;
- покраснение половых губ и преддверия влагалища;
- **Выделения ,различного характера:**
- зеленовато-желтые пенистые неприятно пахнущие выделения (признак трихомонадной инфекции);
- неприятно пахнущие жидкие белые или с разводами крови выделения;
- обильные белые творожистые выделения без запаха;
- белесые или сероватые выделения с рыбным запахом.

ЛЕЧЕНИЕ

Терапия, направленная на устранение предрасполагающих факторов для развития заболевания, лечение сопутствующих заболеваний с учетом клинических проявлений.

▣ **Общее лечение:**

антибактериальная терапия

физиотерапия

препараты для общего укрепления

соблюдение диеты

▣ **Местное лечение:**

спринцевание , влагалищные ванночки

противомикробные свечи и мази

мазевые аппликации

эубиотики(бифидумбактерин, лактобактерин и др.)




ЭНДОМЕТРИТ

воспаление слизистой оболочки матки
(внутренняя поверхность матки).



ПО ТЕЧЕНИЮ

ЭНДОМЕТРИТ



```
graph LR; A[ЭНДОМЕТРИТ] --- B[ОСТРЫЙ]; A --- C[ХРОНИЧЕСКИЙ]
```

ОСТРЫЙ

ХРОНИЧЕСКИЙ

СИМПТОМЫ

ОСТРЫЙ

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕЛА
(ДО ВЫСОКИХ ЗНАЧЕНИЙ)

СИЛЬНАЯ БОЛЬ ВНИЗУ ЖИВОТА

ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ
ПУТЕЙ С НЕПРИЯТНЫМ
ЗАПАХОМ

ХРОНИЧЕСКИЙ

СУБФЕБРИЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА

НОЮЩАЯ БОЛЬ ВНИЗУ ЖИВОТА

ВЫДЕЛЕНИЯ МАЖУЩИЕ,
КРОВЯНИСТЫЕ, СЕРОЗНО-
ГНОЙНЫЕ

ЛЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ:

антибактериальная,

противовоспалительная,

иммуномодулирующая,

Инфузионная

Физиотерапия

Санаторно-курортное лечение



терапия

И П П П

***Инфекции ,передающиеся половым
путем***

ИППП

- Трихомониаз
- Уреоплазмоз
- Микоплазмоз
- Гарднереллез
- Хламидиоз
- Гонорея
- Папилломавирусная инфекция
- Вирус простого герпеса

ЛЕЧЕНИЕ ТРИХОМОНИАЗА



- метронидазол, 2 гр внутрь однократно
или
метронидазол, 500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 7 сут
- Или трихопол – таблетки по схеме
- Местное:
спринцевание влагалища растворами антисептиков
Свечи во влагалище