


# Спазмофилия

Выполнила студентка педиатрического  
факультета КГМУ группы 2403 Ишмаева Д.Б.

**Спазмофилия** – заболевание детей раннего возраста, характеризующееся нарушением минерального обмена, повышенной нервно-мышечной возбудимостью, склонностью к спастическим и судорожным состояниям.







# Причины спазмофилии

Спазмофилия представляет собой специфическое расстройство кальциево-фосфорного обмена, сопровождающего течение среднетяжелого или тяжелого рахита. Патогенез спазмофилии характеризуется снижением концентрации общего и ионизированного кальция крови на фоне гиперфосфатемии и алкалоза.




# Классификация спазмофилии

- Манифестная (явная)
- Латентная (скрытая)



# Симптомы латентной спазмофилии




# Диагностика

- Диагноз спазмофилии подтверждается биохимическим анализом крови, выявляющим гипокальциемию, гиперфосфатемию и другой электролитный дисбаланс; исследованием КОС крови (алкалоз).
- Дифференциальную диагностику спазмофилии необходимо проводить с другими гипокальциемическими состояниями, судорожным синдромом, истинным гипопаратиреозом, эпилепсией, ложным крупом, коклюшем и т. д.



# Лечение

При любых проявлениях явной спазмофилии показано введение противосудорожных препаратов



[www.opt-union.ru](http://www.opt-union.ru)