

# ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА

ВЫПОЛНИЛА-КАМАЛЕЕВА КАМИЛЛА 8Г


# ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ.

**Паразитарные заболевания кожи-это группа патологий, вызванных членистоногими, гельминтами и другими паразитами. Среди них можно выделить цистицеркоз, чесотку и другие заболевания. Паразиты вызывают местное раздражение, отравляют организм человека продуктами жизнедеятельности, могут быть переносчиками инфекций.**

# ЧЕСОТКА

Чесотка – это заразное кожное заболевание, которое вызывается паразитами (клещами) или чесоточным зуднем. Это распространенная болезнь и при своевременном проведении лечения, мер профилактики и дезинфекции, выздоровление наступает в 100% случаев. Чесотка носит паразитарный характер и передается контактным путем

## Чесоточный клещ:



# СИМПТОМЫ ЧЕСОТКИ

**Основным субъективным симптомом чесотки является сильный зуд, чаще возникающий в вечернее и ночное время.**

**Инкубационный период: если человек заболевает чесоткой впервые, зуд возникает спустя 1-2 недели, при повторном заражении — через день.**

**Высыпания на коже (чесоточные ходы, папулы и везикулы) появляются ввиду деятельности клеща. Позже возникает аллергия на продукты его жизнедеятельности, в результате чего присоединяются другие симптомы: мелкие расчёсы и гемorragические (кровоянистые) корочки**

# ЦИСТИЦЕРКОЗ КОЖИ

**Цистицеркоз – болезнь, вызванная личинками (цистицерками) ленточного червя свиного цепня.**

**(поражает кожу, подкожную клетчатку, мышцы, головного и спинного мозга, глаза, внутренние органы, кости).**

**Цистицеркоз развивается в результате попадания в желудок яиц цепня свиного (загрязненные продукты, грязные руки).**



## СВИНОЙ ЦЕПЕНЬ

**В зависимости от стадии жизненного цикла, на которой происходит заражение, свиной цепень вызывает у хозяина тениоз или цистицеркоз.**

# СИМПТОМЫ ЦИСТИЦЕРКОЗА:

**При расположении личинок в подкожном жировом слое возникают опухолевидные образования, возвышающиеся над поверхностью кожи, при их пальпации можно определить полостной характер опухолей. Наиболее частая локализация: внутренние поверхности плеч, верхняя половина грудной клетки, ладони.**

**Профилактикой цистицеркозов является соблюдение мер личной профилактики.**