

ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА

ВЫПОЛНИЛА-КАМАЛЕЕВА КАМИЛЛА 8Г


ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ.

Паразитарные заболевания кожи-это группа патологий, вызванных членистоногими, гельминтами и другими паразитами. Среди них можно выделить цистицеркоз, чесотку и другие заболевания. Паразиты вызывают местное раздражение, отравляют организм человека продуктами жизнедеятельности, могут быть переносчиками инфекций.

ЧЕСОТКА

Чесотка – это заразное кожное заболевание, которое вызывается паразитами (клещами) или чесоточным зуднем . Это распространенная болезнь и при своевременном проведении лечения, мер профилактики и дезинфекции, выздоровление наступает в 100% случаев. Чесотка носит паразитарный характер и передается контактным путем

Чесоточный клещ:



СИМПТОМЫ ЧЕСОТКИ

Основным субъективным симптомом чесотки является сильный зуд, чаще возникающий в вечернее и ночное время.

Инкубационный период: если человек заболевает чесоткой впервые, зуд возникает спустя 1-2 недели, при повторном заражении — через день.

Высыпания на коже (чесоточные ходы, папулы и везикулы) появляются ввиду деятельности клеща. Позже возникает аллергия на продукты его жизнедеятельности, в результате чего присоединяются другие симптомы: мелкие расчёсы и геморрагические (кровоянистые) корочки

ЦИСТИЦЕРКОЗ КОЖИ

Цистицеркоз – болезнь, вызванная личинками (цистицерками) ленточного червя свиного цепня.

(поражает кожу, подкожную клетчатку, мышцы, головного и спинного мозга, глаза, внутренние органы, кости).

Цистицеркоз развивается в результате попадания в желудок яиц цепня свиного (загрязненные продукты, грязные руки).



СВИНОЙ ЦЕПЕНЬ

В зависимости от стадии жизненного цикла, на которой происходит заражение, свиной цепень вызывает у хозяина тениоз или цистицеркоз.

СИМПТОМЫ ЦИСТИЦЕРКОЗА:

При расположении личинок в подкожном жировом слое возникают опухолевидные образования, возвышающиеся над поверхностью кожи, при их пальпации можно определить полостной характер опухолей. Наиболее частая локализация: внутренние поверхности плеч, верхняя половина грудной клетки, ладони.

Профилактикой цистицеркозов является соблюдение мер личной профилактики.