

Репродуктивное здоровье. ЗППП.



Сексуальное здоровье - комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов сексуального существования человека, позитивно обогащающих личность, повышающих коммуникабельность человека и его способность к любви



Ответственное отношение к своему
сексуальному поведению – одна из
составляющих здорового образа жизни



Исследования показывают, что **здоровые дети** рождаются, как правило, от женщин в возрасте 25-35 лет и от мужчин в возрасте 24 -40 лет. Особо стоит еще раз подчеркнуть опасность для здоровья беспорядочной половой жизни и несоблюдения личной гигиены.



Репродуктивное здоровье –

это возможность зачать, выносить и родить здорового ребенка.

Его сохранение - задача и женщины, и мужчины. Каждая беременность должна быть желанной, а родители будущего ребенка - здоровыми.



**ЗППП
ИППП
Венерические
заболевания**

**Инфекционные
заболевания, которые
наиболее часто
передаются половым
путем**

.Сифилис, гонорея, гепатит В, С, ВИЧ, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес, венерические бородавки

**Некоторые ЗППП могут передаваться
и другими путями**

парентеральный путь (ВИЧ, гепатиты В,С)

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА В



Парентеральным называют способ передачи возбудителя от больного организма к здоровому в процессе переливания крови и ее компонентов, а также при внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекциях загрязненными шприцами и иглами.

- **Бытовое заражение** гонореей и другими видами ЗППП чаще происходит через постельные принадлежности, мочалки, губки, полотенца.



Возбудитель чесотки

Возбудитель чесотки или лобковая

вошь (фтириаз) тоже может

передаваться контактно-бытовым путём
через предметы обихода.



Сифилис

- **Возбудитель- бледная трепонема.**
- Инкубационный период от 8 до 100 дней.
Больной заразен с третьей недели инкубационного периода.
- Поражает все органы и ткани человека У сифилиса различают три клинических периода, которые последовательно сменяют друг друга:
 - первичный,
 - вторичный,
 - третичный.
- **Пути передачи:** половой, бытовой (через общие предметы), инъекционный и контактный (от матери к ребенку). Если своевременно не проводится лечение, наступает поражение внутренних органов, центральной нервной системы, нарушение зрения. *Вакцины не существует.*



СТАДИИ СИФИЛИСА



первичный сифилис




вторичный сифилис



третичный сифилис


Гонорея

- Возбудитель – микроорганизм гонококк. Может находиться в организме не вызывая никаких симптомов. *Около 2% женщин являются бессимптомными носителями гонококка*
- Передается преимущественно половым и контактным путем. Первые симптомы заболевания возникают через 2-5 дней после контакта с больным партнером. Обычно первый признак - это чувство жжения и боли в мочеиспускательном канале при мочеиспускании.
- может привести к бесплодию, поражаются мочевой пузырь и почки. У новорожденных чаще наблюдается поражение глаз, которое может приводить к слепоте.




Трихомониаз

- Возбудитель - простейшие вида *Trichomonas vaginalis*. Заражение происходит половым путем при контакте с больным или носителем инфекции.
- Инкубационный период в пределах от 2 дней до 2 месяцев. При отсутствии лечения заболевание переходит в хроническую форму.
- Трихомониаз часто приводит к бесплодию. Трихомонадная инфекция может способствовать воспалению мочевого пузыря и почек.




Хламидиоз – самое распространенное ЗППП

- Возбудитель - внутриклеточный паразит **хламидия** – неподвижной бактерий небольших размеров. Она погибает лишь при температуре кипения воды.
- *Хламидийная инфекция угрожает здоровью не только взрослых людей, но и детей, новорожденных и еще не рожденных малышей.* Хламидиозом страдают 60% женщин и 50% мужчин.
- Хламидиоз часто протекает без выраженных признаков или вообще никак не проявляется.



ВИЧ



Пути передачи ВИЧ



секс без
презерватива



от ВИЧ+
матери
к ребенку



нестерильные
шприцы



переливание
крови

ФАЗЫ ВИЧ

1. ФАЗА

**ОСТРАЯ
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ**



2. ФАЗА

**ХРОНИЧЕСКАЯ
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ**



3. ФАЗА

СПИД


БЕССИМПТОМНУЮ

Течение болезни на этой стадии можно,
в свою очередь разделить еще на две фазы:

СИМПТОМАТИЧЕСКУЮ

СПИД убивает во всем мире

25 млн человек уже погибли от ВИЧ, и 1,8 млн – в прошлом году. СПИД уносит жизни по всему миру, но особенно плохая ситуация на юге Африки. Способ его передачи варьируется от региона к региону.



Ежегодные потери

33.3 млн живут с ВИЧ
2.6 млн инфицируются
1.8 млн умирают

Дети Африки:

14 млн сирот больны СПИДом
1 из 3 причин детских смертей – СПИД.
90% детей заражаются вирусом еще в утробе матери при рождении или во время грудного вскармливания – все эти способы передачи ВИЧ можно предотвратить

○ люди с ВИЧ
 ● вновь зараженные
 ● смерти

Грустные цифры


Регион	% взрослых с ВИЧ
Африка	
Свазиленд	26%
Азия	
Таиланд	1.4%
Постсоветские государства	
Украина	1.63%
Латинская Америка	
Гайана	2.5%
Европа и Северная Америка	
Швейцария, США	0.6%
Северная Африка	
Судан	1.4%
Океания	
Папуа-Новая Гвинея	1.5%

Основные пути передачи ВИЧ:

- | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Гетеросексуальные отношения | 1. Наркомания | 1. Наркомания | 1. Гомосексуальные отношения | 1. Гомосексуальные отношения | 1. Наркомания | 1. Гетеросексуальные отношения |
| 2. Проституция | 2. Через шприц | 2. Проституция | 2. Проституция | 2. Гетеросексуальные отношения | 2. Проституция | 2. Гомосексуальные отношения |
| 3. Наркомания | 3. Проституция | 3. Гетеросексуальные отношения | 3. Наркомания | 3. Наркомания | 3. Гетеросексуальные отношения | 3. Гетеросексуальные отношения |

Смертность от СПИДА

Пик смертельных исходов больных СПИДом приходится на 2004 год.



Лечение стало доступно:

2007: **3** млн людей
 2008: **4**
 2010: **5.2**

Средняя стоимость антиретровирусной терапии:




42

процента ВИЧ-инфицированных людей в странах с низким и средним уровнем доходов имеют доступ к антиретровирусной терапии.


Деньги, выделяемые на программы, связанные с профилактикой и лечением:

Для предотвращения и лечения людей от СПИДА во всем мире в 2010 году необходимо 26 млрд долларов.



Цена одной ночи

Возможность заразиться ВИЧ при отношениях на одну ночь (как гетеросексуальных, так и при традиционном сексе)



31% людей с положительным ВИЧ-статусом из развитых стран заразились после незащищенного секса со случайным партнером

В Южной Африке эта цифра значительно больше
80%
21% ВИЧ-инфицированных людей в развитых странах не знают о своей болезни



1 ДЕКАБРЯ

**ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ**

СО СПИДОМ

Личные правила профилактики

Воздержание от случайных половых контактов

Выбор постоянного, здорового полового партнера.

Взаимная верность молодых людей

Использование средств предохранения

В случае подозрения на заражение
обращаться в лечебное учреждение