

**С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ**



**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА**

Стоматология бойынша интернатура кафедрасы

ИӨЖ


Емдік жұмыс бойынша презентация

**Орындаған: Ст14-002-02 тобының интерні Төребеков Н.Е.
Қабылдаған: м.ғ.к., доцент. Абдразаков Е.Х.**

Алматы 2020 жыл



Жоспар

- 
- ## ы:
1. Паспорттық бөлім
 2. Шағымы
 3. Ауру тарихы
 4. Өмір тарихы
 5. Субъективті және объективті
мәліметтер
 6. Диагноз
 7. Емі

Паспорттық бөлім

ТАӘ: Байдаулетова Эльвира Габитовна

Жынысы: Ә

Жасы: 41

Мамандығы: үй бикесі

Диагноз: Гиперпластикалық кандидоз

Шағымы

Ауыз қуысының құрғақтығына, ысып, күйе сезіміне, тамақ жегенде ауыруына, жалпы жағдайының нашарлап, температурасының көтерілуіне.

Өмір

Диспансерлік есепте тұрмайды, тұқым қуалайтын аурулары жоқ. Гепатит (А,В,С), туберкулез, басқа да инфекциялық ауруларды жоққа шығарады.
Аллергоанамнез теріс.

Тарихы

Ауру

Аурудың басталғанына 3-4 күндей болған. Айтуынша дәрілік заттар тұтынбаған, антибиотик, иммунодепресанттар қабылдамаған.

Объективті көрінісі

Бет-әлпеті симметриялы, тері жабыны таза, аймақтық лимфа түйіндері ұлғаймаған, ауыз ашуы еркін, мұрын-ерініек қатпарлары айқын, АҚШҚ қызарған (гиперемирленген), жергілікті температура көтерілген, пальпацияда ауырады, таңдайда, тіл жиектерінде, тіл астында ақшыл-сұр түсті қақтар байқалады, алынбайды.

0 с с с 0 0
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
0 с 0 с с 0

17, 16 тістерінде апроксимальды медиальды бетінде тісжегі бар. 14 жұлынған. 35, 36 тістердің шаунау бетінде тісжегі қуысын бар, сүңгілегенде ауырады. Перкуссия ауыру сезімсіз. 46 тісінің пароксимальды мойын бөлігінде тісжегі байқалады.

Диагноз: Гиперпластикалық кандидоз







Емі:

1. Саңырауқұлаққа қарсы препарат (біреуін ғана қабылдау ұсынылды):

а) Кетоканазол, 200мг, пероральды, күніне 1-2 таблетка (200-400мг) 2 апта, әрі қарай жазылып кеткенше 1 таблеткадан ішуге болады.

ә) Флуконазол, 50мг, пероральды, 50-100мг/күніне, 7-14 күн қабылдау керек.

2. Саңырауқұлаққа қарсы препарат (апликация):

а) Нистатин, 1%, ауыз қуысының зақымданған жерлеріне күніне 2 рет 7-14 күн бойы апликациялау керек.

3. Хлоргексидин биглюконат, 0,05%, ауызды күніне 3 рет, 14 күн бойы шайып отыруы керек.