

Все фотографии использованы с обучающей  
целью из очерков врача-комбустолога

[https://pikabu.ru/story/ocherki\\_vrachakombustiologa\\_chast\\_8\\_5351235](https://pikabu.ru/story/ocherki_vrachakombustiologa_chast_8_5351235)

**ГЛУБОКИЕ ОЖОГИ IIIВ – IV  
степень**





Наложение трепанационных отверстий




# Ревизия



## Классификация методов раннего хирургического лечения (А.А. Алексеев 1999).

1. Ранняя хирургическая некрэктомия ожоговых ран - радикальное иссечение всех пораженных тканей до развития воспаления и инфицирования (выполняется до 5-7 суток с момента травмы).
2. Раннее хирургическое **очищение** ожоговых ран - заведомо нерадикальное иссечение основного массива некроза с целью уменьшения интоксикации.
3. Отсроченная хирургическая некрэктомия - радикальное иссечение всех пораженных тканей при развившемся воспалении и инфицировании (выполняется на 5-14 сутки с момента травмы).
4. Поздняя хирургическая обработка раны (хирургическая обработка гранулирующей раны).
5. Ампутации и дезартикуляции конечностей и их сегментов.

# Полноценный лоскут / свободная неваскуляризированная кожная пластика



Полнослойный  
Кожный лоскут



# ПОВЕРХНОСТНЫЕ ОЖОГИ II – IIIA степень




# Некрэктомия

- Тангенциальная т.е. удаление некротизированных тканей послойно
- Окаймляющая, по вертикальному разрезу в пределах здоровых тканей
- Комбинированная/смешанная








Расщепленный  
кожный лоскут

# Лечение донорских ран




# Донорские ресурсы кожи



1. Участки с которых кожу не срезают.
2. Срезание возможно при дефиците кожи.
3. Донорские участки кожи.

# «Сложные лоскуты» / свободная васкуляризированной кожная пластика











SHOT ON MI 5X  
MI DUAL CAMERA



SHOT ON MI 5X  
MI DUAL CAMERA

- Выделяются четыре основных анатомо-физиологических вида последствий ожоговой травмы:
  - 
  - **1. рубцовая деформация кожных покровов;**
    -
  - **2. рубцовый дефект тканей;**
    -
  - **3. контрактура (ограничение пассивных движений ) суставов;**
    -
  - **4. послеожоговая трофическая язва.**