

* Ряд Хоботні



Підготувала
учениця 8-в класу
Ярова Діана





Хоботні (Proboscidea) — ряд з надряду Афротерійних, представники якого мають особливу морфологічну відмінність — хобот. У сучасній фауні хоботні представлені родиною Слонові, до якої відносять сучасних слонів і вимерлих декілька тисяч років тому мамонтів.

* Надряд Афротерійні

Існує гіпотеза, що "Хоботні утворення на початку ледве були помітні і служили предкам хоботних, що жили в болотах, як засіб дихати під водою. Пізніше хоботи, з їх безліччю м'язів, розвинулися в тонкі хапальні органи, що дозволяли зривати листя з дерев і траву в степах."



***Хоботні на початку**


Колись на землі мешкало 14 родин хоботних, з яких деякі мали в своєму розпорядженні чотири бивні. Сьогодні існує одна родина - Слонових, і їх життєвий простір дуже обмежений.



Родина Слонових


Один із видів ряду Хоботні є Саванного африканський слон. Поширений по всій території Африки на південь від Сахари .

Слони погано бачать (на відстань не більше 20 м) , проте у них прекрасний нюх і слух . Для комунікації використовують велику кількість візуальних сигналів і дотиків , а також широкий репертуар вокалізацій , включаючи відомі всім гучні трубні звуки . Дослідження показали , що крики слонів містять інфразвукові компоненти (14-35 Гц) , завдяки чому вони чутні на великі відстані (до 10 км) . В цілому когнітивні і перцептивні здібності африканських слонів вивчені слабкіше , ніж у азіатських .



* Саванний африканський слон

Висота лісового слона в холці в середньому становить 2,4 м . Таким чином він значно менше слонів , що живуть в савані . Також лісової слон має більш густий волосяний покрив коричневого кольору і вуха округлої форми . У цього слона більш потужні і довгі бивні , що допомагає йому продиратися через густі зарості лісу .



* Лісовий африканський слон

Індійський слон є в основному лісовим мешканцем. Він віддає перевагу світлим тропічні і субтропічні широколисті ліси з густим підліском з чагарників і особливо бамбука. Раніше, в холодну пору року слони виходили в степу, але тепер це стало можливо тільки в заповідниках, так як поза ними степ майже повсюдно перетворена в сільськогосподарські угіддя. Влітку по лісистих схилах слони піднімаються досить високо в гори, зустрічаючись в Гімалаях на кордоні вічних снігів, на висоті до 3600 м. Слони досить легко пересуваються по болотистій місцевості і піднімаються в гори.



Азіатський слон

* Викорастана література

1. <http://www.filin.vn.ua/mammalia/proboscidea.html>,
2. <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96>,
3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_animals/80/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4

* Дякую за
Увагу

