

# Практика 3

Выполнила Политаева Ольга Дмитриевна  
группа 20б-спецпсих

# 1. Психопатологическая семиотика.

## Психопатологическая синдромология.

### Определение

- **Семиотика** — учение о признаках болезней (симптомах) и характерных их сочетаниях (синдромах). Семиотику психических расстройств обычно называют общей (описательной) психопатологией.
- **Симптом** — отдельный признак болезни, выраженный субъективными жалобами пациента (объективные признаки болезни, например отклонение лабораторного показателя, лучше обозначать термином «признак»).
- **Синдром** — совокупность симптомов, объединенных общим механизмом развития (патогенезом), устойчиво наблюдающихся вместе и имеющих закономерные взаимосвязи. В отличие от синдрома, симптомокомплекс — это сумма всех симптомов, выявляемых у пациента на момент исследования, в том числе тех, которые могут быть не связаны общим патогенезом.


- Все психопатологические синдромы можно синдромы делятся на 2 большие группы:
  - 1) Позитивные (положительные, плюс-синдромы) – появляющиеся у больного, но отсутствующие у здорового явления, например тревога, галлюцинации.
  - 2) Негативные (минус, дефект) – выпадающие при болезни явления и функции, например, амнезия, деменция.

В клинической картине психических заболеваний позитивные и негативные симптомы наблюдаются в сочетании.

## 2. Первая помощь при эпилепсии

- Как распознать?

- **судорожные сокращения мышц**
- **остановка дыхания**
- **потеря сознания**




- Что делать?

- поддержать падающего человека, опустить его на пол или усадить
- фиксировать его в боковом положении
- подложить под голову мягкий плоский предмет
- не класть никаких предметов в рот и не предпринимать попыток разжать плотно сомкнутые челюсти пациента
- зафиксировать время начала приступа
- При необходимости проводить СЛР только после окончания приступа
- вызвать Скорую помощь, **если**:
  - приступ длится более 3 минут,
  - пострадавший не приходит в сознание более 10 минут,
  - приступ произошёл впервые, либо случился у ребенка, у пожилого человека или у беременной женщины,
  - во время приступа пострадавший получил травмы


## 2. Первая помощь при эпилепсии




**МЯГКОЕ ПОД ГОЛОВУ**



**РАЗВЯЖИТЕ ГАЛСТУК**



**НАКЛОНИТЕ НА БОК**




**ЗАФИКСИРУЙТЕ  
ВРЕМЯ ПРИПАДКА**



**В РОТ НИЧЕГО НЕ  
ВСТАВЛЯТЬ**



**НЕ ДАВИТЬ**



**ПОСЛЕ ПРИСТУПА ...**



**... ПРЕДЛОЖИТЬ  
ПОМОЩЬ**

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ

## ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ:



Разжимать человеку зубы, при-  
держивать язык или вставлять  
какие-либо предметы в рот.



Переносить человека с места,  
где случился приступ, если  
только оно не является опас-  
ным для жизни.



Пытаться насильственно сдер-  
живать судорожные движения.



Делать искусственное дыха-  
ние или массаж сердца.



Пытаться дать выпить воды  
или какие-либо лекарственные  
препараты.

## ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ:



Защитите голову больного  
от возможной травмы, при  
возможности подложите что-ни-  
будь мягкое под голову (сверну-  
тую одежду, полотенце и т.п.)



Освободите окружающее  
пространство от мебели,  
режущих предметов в целях  
предотвращения травматиза-  
ции больного эпилепсией.



Освободите  
от тесной одежды.



Поверните голову на бок для  
предотвращения западения  
языка и попадания слюны  
в гортань.



При возникновении рвоты  
осторожно поверните голову  
на бок для предотвращения  
аспирации рвотных масс и по-  
падания их в легкие.



После того как судорожные  
движения прекратились, по-  
верните человека на бок.



Проверьте, если дыхание  
затруднено, не блокируют ли  
заднюю часть гортани слюна,  
рвотные массы или зубные  
протезы.

- Судороги прекратятся сами по себе через несколько минут.
- После окончания приступа может возникнуть спутанность сознания, слабость или сонливость.
- Оставайтесь рядом до того момента, когда человек придет в сознание. При необходимости, помогите организовать доставку пострадавшего домой.
- Если приступ продолжается больше 5-10 минут, или приступы следуют один за другим, или человек получил травму, необходимо вызвать «скорую помощь».