

Лекарственные средства









Bayer Schering Pharma

ОСМО-Адалат®

Нифедипин 30 мг

Для приема внутрь

28 таблеток покрытых оболочкой с контролируемым высвобождением











Специальных условий хранения не требуется
Хранить в недоступных для детей местах

Арифон®

Индапамид 2,5 мг


Таблетки, покрытые пленочной оболочкой



АмброГЕКСАЛ®

Амброксол

**Капсулы пролонгированного
действия 75 мг**




10 капсул









Беклазон Эко
Беклометазон
Аэрозоль для
ингаляций
дозированный



100
мкг/доза

ПО РЕЦЕПТУ

200 доз

TEVA







Мукофальк

гранулы апельсиновые для приготовления
суспензии для приема внутрь.

Mucofalk®

активное вещество
Порошок оболочек семян
подорожника овального
(*Plantago ovata* Forssk.)



20 пакетиков по 5 г





ЗАО "Фармцентр ВИЛАР"

ТАНАЦЕХОЛ®

таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг

№ ЛС-002696

Свидетельство на товарный знак №183691

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.





ИЗАКАРДИН

Концентрат для приготовления
раствора для инфузий **1 мг/мл**

СТЕРИЛЬНО

Изосорбида динитрат
10 ампул по 10 мл

ВНУТРИВЕННО МЕДЛЕННО

Отпуск по рецепту
Применять по назначению врача

 **Фармамед.РФ**















1 таблетка содержит: торасемид 5 мг.
Активное количество торасемид 5 мг.
Вспомогательные вещества: лактоза
гидратированная 10 мг, крахмал картофельный 61,54 мг,
целлюлоза микрокристаллическая 20 мг, магния
стеарат 0,74 мг, титанила диоксид 0,10 мг.

Принимать в виде таблеток 1 раз в сутки утром.
Принимать в утренние часы, после завтрака,
при температуре не выше 30°С.
Отдых и сон не являются противопоказанием.

Бритомар 5 мг
таблетки пролонгированного действия

Бритомар 5 мг

Торасемид


таблетки пролонгированного действия

30 таблеток
Для приема внутрь









Буденит Стери-Неб
Будесонид
Суспензия для ингаляций

0,25
мг/мл

ПО РЕЦЕПТУ

60 Ампул

TEVA













































ГИСТАК®

РАНИТИДИН

Таблетки покрытые оболочкой

150 мг

20 таблеток

RANBAXY







ОКТОЛИПЕН®



30 КАПСУЛ
по 300 мг









Моночинкве[®]

Изосорбида мононитрат
Сердечно-сосудистое средство

30 таблеток · *Для приема внутрь*



BERLIN-CHEMIE
MENARINI



Конкор®

10 мг

Состав:

1 таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит:

Ядро:

Активное вещество: бисопролола гемифумарат (бисопролола фумарат (2:1)) - 10 мг.

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат, безводный – 127,5 мг; крахмал кукурузный, мелкий порошок – 14,0 мг; кремния диоксид коллоидный, безводный – 1,5 мг; целлюлоза микрокристаллическая – 10,0 мг; кросповидон – 5,5 мг; магния стеарат - 1,5 мг.

Пленочная оболочка:

Гипромеллоза 2910/15 – 2,200 мг, макрогол 400 – 0,530 мг, диметикон 100 – 0,220 мг, краситель железа оксид желтый (E 172) – 0,120 мг, краситель железа оксид красный (E 172) – 0,002 мг, титана диоксид (E 171) – 0,850 мг.

NYCOMED

50 таблеток







Парнавел
Периндоприл

4 мг
30 таблеток

ПОДГОТОВЛЕНО
РЛС 





















20 таблеток
жевательных

sanofi aventis





28 капсул
по 20 мг

Гастрозол[®]
омепразол

В одной капсуле 20 мг омепразола





Эссенциале® форте Н



100 капсул

sanofi aventis



ХОЛОСАС®

СИРОП




140 г





Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Оказывает влияние на психофизические
способности.
Для приема внутрь.
Отпускается по рецепту врача.



40
МГ

Пектрол® таблетки
пролонгированного действия

Изосорбида мононитрат

30 таблеток










Пирамил® 5 мг таблетки

РАМИПРИЛ / RAMIPRIL

 lek

28 таблеток









Лазолван[®]
Амброксол
Пастилки 15 мг
Для приема внутрь

Boehringer
Ingelheim

20 пастилок









15 г

Латикорт[®]
Гидрокортизон

крем для
наружного применения
0,1 %







Нексиум 10 мг

эзомепразол

пеллеты, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, и гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь

Нексиум®
эзомепразол


10 мг

пеллеты, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, и гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь

28 пакетов

AstraZeneca 





Соблюдать инструкцию
по применению!

ГЕПТРАЛ®

Адеметионин www.neboley.ru

Таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
400 мг


Hospira





Смекта®

смектит диоктаэдрический 3 г

Растворить
согласно инструкции
принимать внутрь

Хранить
при температуре
не выше 25°C

Хранить
в недоступном
для детей месте

58 205. 01

5

 IPSEN

















Физиотенз®
Physiotens®

0,2

Физиотенз®
14 таблеток покрытых пленочной оболочкой

моксонидин 0,2 мг

14 таблеток покрытых пленочной оболочкой

Таблетки содержат лактозы моногидрат.

Для лечения артериальной гипертензии


 **Abbott**



моксонидин 0,2 мг
14 таблеток покрытых пленочной оболочкой

Таблетки содержат лактозы моногидрат.

Для лечения артериальной гипертензии

 **Abbott**







www.mr.ru









ГАСТРАЦИД[®]

Natur Produkt[®]
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ!

**20 ТАБЛЕТОК
ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ**

подготовлено
РЛС







Легалон® 140

КАПСУЛЫ 140 мг

MADAUS

MADAUS



Состав: 1 капсула содержит: Активное вещество: расторопши пятнистой плодов экстракт сухой (36-44:1) - 173,6-186,7 мг, эквивалентно 140 мг силимарина (ЛНФ), эквивалентно 108,2 мг силимарина (БЭЖОТерм.Ф.) в расчете на силибинин. Вспомогательные вещества: полисорбат 80, повидон, кальция карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), магния стеарат. Оболочка: твердая желатиновая капсула, размер «Т», в состав которой входит: желатин, краситель: железа оксид красный (E172), титана диоксид (E171), натрия лаурилсульфат, краситель: железа оксид черный (E172).

Легалон® 70

КАПСУЛЫ 70 мг

MADAUS



Состав: 1 капсула содержит: Активное вещество: расторопши пятнистой плодов экстракт сухой (36-44:1) - 86,8-93,4 мг, эквивалентно 70 мг силимарина (ЛНФ), эквивалентно 54,1 мг силимарина (БЭЖОТерм.Ф.) в расчете на силибинин. Вспомогательные вещества: полисорбат 80, повидон, кальция карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), магния стеарат. Оболочка: твердая желатиновая капсула, размер «Т», в состав которой входит: желатин, краситель: железа оксид красный (E172), титана диоксид (E171), натрия лаурилсульфат, краситель: железа оксид черный (E172).




























Фликсотид


Флутиказон

Аэрозоль для ингаляций
дозированный

Не содержит фреонов

Флутиказона пропионат
250 мкг/доза

60 доз

 GlaxoSmithKline









