

Глава IX.
Генетика и селекция

Тема:
«Основные методы селекции
ЖИВОТНЫХ»

Задачи:

Дать характеристику основным методам
селекции животных

Методы селекции животных

Создание пород домашних животных началось вслед за их приручением и одомашниванием, которое началось, вероятно, 20-30 тыс. лет назад. Первым этапом было приручение животных. В результате *бессознательной формы искусственного отбора* происходило одомашнивание и изменение генофонда прирученных животных. Менялся их внешний вид, продуктивность, характер. Сохранялись те животные, которые могли размножаться в неволе, не проявляли агрессивности по отношению к человеку.

Методический отбор привел к созданию всего многообразия пород домашних животных от небольшого числа видов диких предков.

В селекции животных, по сравнению с селекцией растений, есть ряд особенностей. Во-первых, для животных характерно половое размножение, поэтому любая порода является сложной гетерозиготной системой. Во-вторых, у них часто поздняя половозрелость, смена поколений происходит через несколько лет. В-третьих — немногочисленное потомство.


Методы селекции животных

- ❖ Отбор и скрещивание – главные методы. Отбор по экстерьеру. Скрещивание неродственное – аутбридинг и родственное – инбридинг.

1. Внутрипородное разведение.

Отбор по экстерьеру лучших производителей, выбраковка особей, не отвечающих требованиям породы.

Метод **сохраняет и улучшает породу**. Племенные книги отражают родословную и показатели за много поколений.



Методы селекции животных



2. Межпородное скрещивание используют для создания новой породы. При этом часто используют **инбридинг** – проводят близкородственное скрещивание, родителей скрещивают с потомством, братьев с сестрами, это помогает получить большее число особей, обладающих нужными свойствами.

Инбридинг сопровождается жестким постоянным отбором, обычно получают несколько линий, затем производят скрещивание разных линий.

Методы селекции животных



Хорошим примером может служить выведенная академиком М.Ф.Ивановым порода свиней — украинская белая степная. При создании этой породы использовались свиноматки местных украинских свиней с небольшой массой и невысоким качеством мяса и сала, но хорошо приспособленных к местным условиям. Самцами-производителями были хряки белой английской породы.

Методы селекции животных



Гибридное потомство содержало 50% генов местной породы и 50% — белой английской и вновь было скрещено с английскими хряками. В потомстве осталось около 25% геном местной породы, в нескольких поколениях применялся инбридинг, были получены различные линии.

В потомстве от скрещивания этих линий отобрали родоначальников новой породы, которые по качеству мяса и массе не отличались от английской породы, по выносливости — от украинских свиней.

Методы селекции животных

3. Использование эффекта гетерозиса. Часто при межпородном скрещивании в первом поколении проявляется эффект гетерозиса, гетерозисные животные отличаются скороспелостью и повышенной мясной продуктивностью. Например, при скрещивании двух мясных пород кур получают гетерозисных бройлерных кур, при скрещивании беркширской и дюрокджерсейской пород свиней получают скороспелых свиней с большой массой и хорошим качеством мяса и сала.



Методы селекции животных



4. Испытание по потомству проводят для подбора самцов, у которых не проявляются некоторые качества (молочность и жирномолочность быков, яйценоскость петухов). Для этого производителей-самцов скрещивают с несколькими самками, оценивают продуктивность и другие качества дочерей, сравнивая их с материнскими и со среднепородными.



Методы селекции животных

5. Искусственное осеменение используют для получения потомства от лучших самцов производителей, тем более что половые клетки можно хранить при температуре жидкого азота любое время.

6. С помощью гормональной суперовуляции и трансплантации у выдающихся коров можно забирать десятки эмбрионов в год, а затем имплантировать их в других коров, эмбрионы так же хранятся при температуре жидкого азота. Это дает возможность увеличить в несколько раз число потомков от выдающихся производителей.



Методы селекции животных

7. Отдаленная гибридизация, межвидовое скрещивание, известно с древних времен. Чаще всего межвидовые гибриды стерильны, у них нарушается мейоз, что приводит к нарушению гаметогенеза. С глубокой древности человек использует гибрид кобылицы с ослом — мула, который отличается выносливостью и долгожительством.

Но иногда гаметогенез у отдаленных гибридов протекает нормально, что позволило получить новые ценные породы животных.

Примером являются архаромериносы, которые, как и архары, могут пастись высоко в горах, а, как мериносы, дают хорошую шерсть.

Получены плодовитые гибриды от скрещивания местного крупного рогатого скота с яками и зебу.

При скрещивании белуги и стерляди получен плодовитый гибрид — бестер;

хорька и норки — хонорик;

продуктивен гибрид между карпом и карасем.

Методы селекции животных

8. **Полиплоидия** крайне редко встречается у животных. Интересен факт межвидового скрещивания тутового шелкопряда с последующим удвоением хромосом, проведенный Б.Л. Астауровым, который привел к созданию нового вида животных.



Повторение

Тест 1. Позволяет сохранить и улучшить свойства породы:

1. Внутривидовое скрещивание и методический отбор.
2. Межвидовое скрещивание и методический отбор.
3. Инбридинг.
4. Гетерозис при межвидовом скрещивании.

Тест 2. Позволяет создать новую породу животных:

1. Внутривидовое скрещивание и методический отбор.
2. Межвидовое скрещивание и методический отбор.
3. Инбридинг.
4. Межвидовое скрещивание с целью получения эффекта гетерозиса.

Тест 3. Инбридинг в селекции животных используют:

1. Для сохранения свойств породы.
2. Для создания новой породы.
3. Для получения большого количества потомков с качествами выдающихся животных.
4. Для получения эффекта гетерозиса.

Повторение

Тест 4. Получить эффект гетерозиса позволяет:

1. Близкородственное скрещивание.
2. Испытание по потомству для самцов.
3. Отбор лучших производителей внутри породы.
4. Межпородное скрещивание.

Тест 5. Испытание по потомству проводят:

1. Для подбора самцов.
2. Чтобы оценить продуктивность потомства.
3. Чтобы оценить продуктивность породы.
4. Чтобы оценить продуктивность самки.

Тест 6. Для отдаленной гибридизации животных характерно:

1. Потомство всегда бесплодно.
2. Часто в потомстве проявляется эффект гетерозиса.
3. Потомство плодовито и проявляет эффект гетерозиса.
4. Наблюдается депрессия, ухудшение свойств породы.

Повторение

Тест 7. Бройлерные куры:

1. Особая мясная порода кур.
2. Яйценосная порода кур.
3. Гетерозисный гибрид.
4. Инбредная линия кур.

**Тест 8. При селекции животных используются:

1. Наследственная изменчивость.
2. Ненаследственная изменчивость.
3. Бессознательная форма искусственного отбора.
4. Методическая форма искусственного отбора.

**Тест 9. При создании новой породы:

1. Мутационная изменчивость.
2. Модификационная изменчивость.
3. Комбинативная изменчивость.
4. Соматическая изменчивость.

Тест 10. Полиплоидные животные созданы:

1. Полиплоидных животных нет.
2. Б.Л.Астауровым.
3. М.Ф.Ивановым.
4. Г.Д.Карпеченко.