

Псориатическая артропатия

Псориазическая артропатия: характерные симптомы

- **1. Асимметричность поражения суставов кистей.**
- **2. Артрит на рентгенограммах может быть без околосуставного остеопороза.**
- **3. Изолированное поражение дистальных межфаланговых суставов кистей при отсутствии изменений в других мелких суставах кистей.**
- **4. Осевое поражение 3-х суставов одного пальца.**
- **5. Поперечное поражение суставов кистей одного уровня (одностороннее или двухстороннее).**
- **6. Деструкции концевых фаланг (acroosteoliz).**

ПА: характерные симптомы (2)

- 7. Концевое сужение дистальных эпифизов фаланг пальцев рук и пястных костей.**
- 8. Чашеобразная деформация проксимальной части фаланг пальцев кистей вместе с концевым сужением дистальных эпифизов - симптом «карандаш в колпачке».**
- 9. Костные анкилозы, особенно проксимальных и дистальных межфаланговых суставов кистей.**
- 10. Множественный остеолит и деструкции эпифизов костей с разнонаправленными деформациями суставов (мутилирующий артрит).**

ПА: характерные симптомы (3)

- **1. Воспалительные изменения в крестцово-подвздошных суставах - сакроилеиты (обычно двухсторонние асимметричные или односторонние; возможно отсутствие сакроилеита).**
- **2. Изменения в позвоночнике (асимметричные синдесмофиты; паравертебральный оссификат).**