



# ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ

Занятие 10

*-Биосинтез белка и нуклеиновых  
кислот*

# Биосинтез белка -

**важнейший процесс в живой природе**

Это создание молекул белка на основе информации о последовательности аминокислот в его первичной структуре, заключенной в структуре ДНК.

Необходимые компоненты:

рибосомы,  
энергия АТФ,  
аминокислоты,  
ферменты,  
различные виды РНК

# Реакции матричного биосинтеза

Реакции матричного синтеза – особая категория химических реакций, происходящих в клетках живых организмов, когда по существующей матрице (материнской молекуле) происходит синтез дочерней молекулы по определенной закономерности. Это реакции:

**-РЕПЛИКАЦИЯ**

**- ТРАНСКРИПЦИЯ**

**- ТРАНСЛЯЦИЯ**

**-ОБРАТНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ**

На одной матрице может быть


синтезировано неограниченное количество

# Репликация ДНК



Репликация ДНК — это процесс синтеза дочерней молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, который происходит в процессе деления клетки на матрице родительской молекулы ДНК. При этом генетический материал, зашифрованный в ДНК, удваивается и делится между дочерними клетками.

# Репликация ДНК




Удвоение молекулы ДНК называют **репликацией** или **редупликацией**. Во время репликации часть молекулы «материнской» ДНК расплетается на две нити с помощью специального фермента, причем это достигается разрывом водородных связей между комплементарными азотистыми основаниями: аденином — тиминном и гуанином — цитозинном. Далее к каждому нуклеотиду разошедшихся нитей ДНК фермент ДНК-полимераза подстраивает комплементарный ему нуклеотид. Таким образом, образуются две двуцепочечные молекулы ДНК, в состав каждой из которых входят одна цепочка «материнской» молекулы и одна новосинтезированная («дочерняя») цепочка. Эти две молекулы ДНК абсолютно идентичны.

# Центральная догма (основной постулат) молекулярной биологии – матричный синтез

- Генетическая информация хранится в ДНК и передается от клетки к клетке, а реализуется благодаря **транскрипции** в РНК и **трансляции** в белок.
- Процессы **транскрипции** и **трансляции**, вместе с реакцией самоудвоения ДНК – **репликацией** относят к реакциям **матричного синтеза**, т.е. с использованием **матрицы** (лат. «матка»).
- При синтезе ДНК, иРНК и тРНК - матрица – одна из цепей ДНК.
- Для синтеза белка необходимы две реакции матричного синтеза: **транскрипция** (лат. «переписывание» – синтез иРНК на матрице ДНК) и **трансляция** (лат. «передача, перевод» - синтез полипептидных цепей белка на матрице иРНК).




- Транскрипция возможна и от РНК к ДНК с помощью фермента «ревертазы» ( у РНК – содержащих вирусов ).



- **Биосинтез белка** — сложный многостадийный процесс синтеза полипептидной цепи из аминокислотных остатков, происходящий на рибосомах клеток живых организмов с участием молекул мРНК и тРНК.


# Схема биосинтеза белка



Процесс биосинтеза белка состоит из трех стадий: **транскрипции** (синтез иРНК), **сплайсинга** («созревание» иРНК) и **трансляции** (биосинтез первичного белка). Транскрипция и сплайсинг протекают в ядре, а трансляция – в цитоплазме. В трансляции принимают участие тРНК, доставляющие аминокислоты к месту сборки белковой молекулы.




# Транскрипция (лат. переписывание)



Обратная транскрипция – процесс синтеза ДНК на матрице вирусной РНК.

Идея обратной транскрипции вначале была очень непопулярна, так как противоречила центральной догме молекулярной биологии, которая предполагала, что ДНК транскрибируется в РНК и далее транслируется в белки.<sup>[2]</sup>

Однако в 1970 году Темин<sup>[3]</sup> и Балтимор<sup>[4]</sup> независимо друг от друга открыли фермент, названный обратной транскриптазой (ревертазой), и возможность обратной транскрипции была окончательно подтверждена. В 1975 году Темину и Балтимору была присуждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины.




**ВИЧ**

**Онковирус  
ы**

**др.**


**РНК**



- проникновение вируса в клетку
- синтез ДНК на матрице РНК (ревертаза)
- перенос ДНК в ядро
- встраивание в геном
- транскрипция (РНК вируса)
- трансляция (рибосома)
- сборка вируса
- выход вируса

**Обратная**


# Трансляция



После удаления интронов иРНК становится «зрелой» и переносится в цитоплазму. Там с ней связываются рибосомы, которые одна за другой двигаются вдоль иРНК и при участии молекул тРНК синтезируют первичную цепь белка из аминокислот согласно информации, записанной в кодирующем участке иРНК. По прошествии некоторого времени иРНК разрушается под действием ферментов – **рибонуклеаз**. Первым подвергается деградации хвост **poly (A)**, который присоединяется к иРНК в процессе транскрипции и не удаляется при сплайсинге.

# Трансляция


(лат. перенесение, перевод)







## Транспортная РНК

Форма клеверного листа  
Образует 4 петли:  
акцепторную (аминокислоты)  
антикодоновую (кодон и-РНК),  
2 боковые петли






Полисома из печени содержит 12 рибосом, которые выглядят темными пятнами. А цепочка иРНК на снимке не видна.

На одной иРНК «работают» несколько рибосом. Такой комплекс называется **полисома**. После завершения синтеза иРНК распадается на нуклеотиды.

Весь цикл процессов, связанных с синтезом одной белковой молекулы, занимает в среднем 1-3 с.



- Готовая белковая молекула затем отщепляется от рибосомы и транспортируется в нужное место клетки. Для достижения своего активного состояния некоторые белки требуют дополнительной посттрансляционной модификации.



# Схема синтеза белка

