

Государственное автономное профессиональное образовательное  
учреждение Саратовской области «Балаковский медицинский  
колледж»

Презентация на тему:  
**«Обработка пупочной ранки»**



Выполнила студентка  
634 группы 1 бригады  
Специальность 34.02.01. Сестринское дело  
Путина Дарья Александровна

# Этапы процедуры

- ✓ Идентифицировать младенца и его мать, представиться матери/родственникам, объяснить цель и ход предстоящей процедуры, получить согласие.
- ✓ В случае отсутствия такового уточнить действия у врача.

✓ Подготовить необходимое оснащение:

✓ Стерильные ватные палочки.

✓ Лоток для отработанного материала.

✓ 3% раствор перекиси водорода.

✓ 70% этиловый спирт.

✓ 5% раствор перманганата калия.

✓ Стерильная пипетка.

✓ Набор для пеленания, приготовленный на пеленальном столике.

✓ Резиновые перчатки.

✓ Емкость с дезинфицирующим раствором

✓ пеленка однократного применения;

✓ мешок для грязного белья;

✓ контейнер для отходов класса «А»



- ✓ Обработать пеленальный столик дезинфицирующим средством



✓ Вымыть и осушить руки, надеть стерильные перчатки

### Последовательность процедуры МЫТЬЯ



1  
Увлажните руки под струей воды



2  
Нанести моющее средство на ладони




3  
Распределите моющее средство по поверхности рук



4  
Убедитесь, что не забыты зоны между пальцами



5  
Возьмите руки «в замок» и мойте таким образом




6  
Особое внимание на большие пальцы рук



7  
Уделите особое внимание кончикам пальцев рук



8  
Смойте водой и тщательно вытрите руки бумажным полотенцем




✓ Постелить пеленку на пеленальный столик




- ✓ Раздеть ребенка (при необходимости подмыть) и положить на пеленальный столик



✓ Сбросить одежду в мешок для грязного белья.



- ✓ Хорошо растянуть края пупочной ранки указательным и большим пальцами левой руки




- Капнуть из пипетки в ранку 1 - 2 капли 3% раствором перекиси водорода



- ✓ Удалить образовавшуюся в ранке «пену» стерильной ватной палочкой движением изнутри кнаружи (сбросить палочку в лоток).



- ✓ Сохраняя растянутыми края пупочной ранки, обработать ее стерильной ватной палочкой, смоченной 70% этиловым спиртом, движением изнутри кнаружи (сбросить палочку в лоток).



- ✓ Обработать кожу вокруг ранки этиловым спиртом с помощью ватной палочки движениями от центра к периферии (сбросить палочку в лоток).



- ✓ Обработать (по необходимости) пупочную ранку (не затрагивая кожу вокруг ранки) 5% раствором перманганата калия с помощью ватной палочки (сбросив палочку в лоток).



✓ Запеленать ребенка и положить в кроватку.




- ✓ Убрать пленку с пеленального столика и поместить ее в отходы класса «А»



- ✓ Протереть рабочую поверхность пеленального стола дезинфицирующим средством.



- ✓ Поместить отработанный материал в емкость с дезинфицирующим средством.



✓ Снять перчатки, вымыть и осушить руки.

