


ДИСБИОТИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ


Патологическая физиология

ДИСБИОТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ- СТОЙКИЕ НАРУШЕНИЯ В РЕГУЛЯЦИИ РОСТА И РАЗВИТИЯ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕОБРАТИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ГЕНЕТИЧЕСКОМ АППАРАТЕ.

- К ним относятся генетическая (наследственная) патология;
- врожденная патология, возникающая под воздействием неблагоприятных факторов в период внутриутробного развития эмбриона и плода; постнатальные пороки развития;
- опухоли и лейкозы.



ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ- мутации в ПРОГРАММНОМ АППАРАТЕ КЛЕТОК, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОТОМКАМИ ПО НАСЛЕДСТВУ ЧЕРЕЗ ГАМЕТЫ.



По характеру изменений генетического аппарата различают мутации, обусловленные

- 1) изменением числа хромосом (геномные);
- 2) изменением структуры хромосом
- 3) изменением молекулярной структуры гена

НАСЛЕДСТВЕННУЮ ПАТОЛОГИЮ ПО ТИПУ ЕЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ДЕЛЯТ НА ТРИ ГРУППЫ:

наследуемые по доминантному типу


наследуемые по рецессивному типу

передающие аномальный признак, сцепленный с половыми хромосомами

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА ХРОМОСОМ.

■ Различают четыре основных типа хромосомных аббераций:

1. нехватки (делеции);
2. удвоения (дубликации);
3. инверсии;
4. транслокации.



НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ.

Гемолитическая болезнь новорожденных обусловлена несовместимостью плода и матери по резус-фактору.

Гемофилия — наследственное заболевание, при котором мутантный ген сцеплен с половой хромосомой

Серповидно-клеточная анемия возникает в результате наследования патологического гемоглобина.

Аномалии у животных, вызванные методами разведения (тесным инбридингом)



ОПУХОЛИ

Клеточные разрастания атипического строения и функции

«НЕОПЛАЗМА»- НОВООБРАЗОВАНИЕ

да

- Своеобразие опухолевых разращений:

- 1.Морфологический атипизм

Не соответствует анатомическому строению, гистологической и клеточной структуре.

- 2.Функциональный атипизм

Паразитарность, беспредельный рост, особенности обмена веществ и химической структуры

нет

- Воспаление и отек

- Отложение солей и инородные тела

- Регенерационные выросты

- Инфекционные и паразитарные гранулемы



- Гипертрофические разращения

ЭТИОЛОГИЯ НЕ ВЫЯСНЕНА!!!!!! СУЩЕСТВУЮТ ЛИШЬ ТЕОРИИ


- 1 Зародышевая (эмбриональная) теория- *изменение в клетках эмбриона и мощный рост во взрослом организме.*
- 2 Теория раздражения Вирхова-*изменение клеток под прямым воздействием раздражающего фактора.*
- 3 Регенерационная теория- *разращение язв и эрозий*
- 4 Инфекционная теория- *воздействие специальных возбудителей опухолевого роста*
- 5 Эндогенная теория – *нарушение обмена веществ и гормональной регуляции*

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОПУХОЛИ

- **Единой причины нет.**
- Каждая опухоль возникает под действием специальных причин и условий
- Факторы воздействия: внешние и внутренние
- Существует предрасположенность:
- Возраст, вид, пол, состояние иммунной и нервно-гуморальной системы.....



ПАТОГЕНЕЗ. ИЗУЧЕН НЕ ДОСТАТОЧНО!!!





МАКРОСКОПИЧЕСКИ (ВИД ВЫРОСТОВ)

Форма

- Узловатая, грибовидная(фунгозная)
- Сосочковая (папиллярная) , древовидная(дендроидная)

Размер

- От нескольких миллиметров до огромных выростов превышающих массу тела

Цвет





- Зависит от ткани на которой растет
- (костная-белая, жировая-желтая, мышечная красная)

Консистенция

- От вида ткани на которой растет
- Степень разрастания соединительной ткани


Рисунок на разрезе

- Однородное строение (напоминает мясо рыбы)
- Волокнистый рисунок
- Железистое строение




МИКРОСКОПИЧЕСКИ ДЕЛЯТ:

1. Зрелые – построенные из клеток, близко соответствующих тканям взрослого организма



2. Незрелые- построенные из клеток напоминающих юные или эмбриональные клеточные формы



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ И СВОЙСТВАМ ОПУХОЛИ

Доброкачественные

- Построены из зрелых клеток
- Медленно растут
- Не способны давать метастазы
- Ограничены капсулой
- Не повреждают ткань на которой растут.

Злокачественные

- Построены из незрелых клеток
- Быстрый инфильтрирующий рост
- Способны давать метастазы
- Прорастают в органы не ограничены
- Паразиты

НАЗВАНИЕ ОПУХОЛЕЙ



ГРЕЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
ТКАНИ ИЗ КОТОРОЙ
СОСТОИТ
ПАРЕНХИМА
ОПУХОЛИ




«ОМА»


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Отличия доброкачественных и злокачественных опухолей




Клетки, составляющие опухоль










РЕНТГЕН





УЗИ



БИОПСИЯ



ТЕРАТОМА – ОПУХОЛЬ «ЧУДО»



ЛЕЧЕНИЕ

- 1 Хирургическое
- 2 Химиотерапия
- 3 Лучевая терапия

