ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 03.03.02 ФИЗИКА
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
«СОЛНЕЧНО-ЗЕМНАЯ ФИЗИКА»

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ МАКСИМУМА ШАЛ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА ЧЕРЕНКОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Выполнил: студент 4 курса, группы 01411-ДБ
Устинов Кирилл Александрович

Руководитель: д.ф.-м.н., Паперный В.Л.

Консультант: д.ф.-м.н., Просин В.В.

Иркутск 2019

Космические лучи

- - это непрерывно бомбардирующие нашу планету потоки ядер химических элементов
- Индивидуальные частицы имеют высокую энергию вплоть до 10^{20} эВ.
- Имеют скорость близкую к скорости света.
- Состав сходен с химическим составом вещества Вселенной: водород — преобладающий элемент (~ 90%); гелий (~ 8%); ядра более тяжелых элементов (~ 2%).

Широкие атмосферные ливни

Схема развития ливня





X_{max} - глубина на которой число заряженных частиц максимально

Связь X_{max} с черенковским импульсом



n(H) — усредненный показатель преломления воздуха вдоль пути света

Установка Tunka-HiSCORE



- Часть эксперимента TAIGA
- 29 детекторов размещенных на территории около 0,4 км^2
- 4 фотоумножителя на каждую оптическую станцию
- Регистрирует вспышки черенковского света

Моделирование импульсов

- 50 ливней в программе CORSIKA



Первичная частица протон с энергией 10^{16}эВ



Преобразование импульсов

- Аппаратная функция





„Прошедшие" через аппаратуру

$\tau_{fwhm} > 9ns$







Оценка глубины максимума





Что дальше?

- Экспериментальные данные Tunka-HiSCORE
- Оценка массового состава КЛ



Заключение

- В результате работы была подтверждена и получена зависимость X_{max} от длительности импульсов черенковского свет для расстояний 150 и 200 метров от оси широкого атмосферного ливня. Разработаны программы для анализа смоделированных данных. Получена основа для для будущее оценки массового состава космических лучей с использованием установки Tunka-HiSCORE.

Спасибо за внимание!