

Шизофрения - эндогенный психоз с андрогенным течением.

АНТИПСИХОТИКИ / ПО МАШКОВАСКОМУ

I. ПРОДВОДНЫЕ ФЕНОТИАЗИНЫ

- АМИНАЗИН * ?
- ПРОПАЗИН
- НЕВОДЕПРОМАЗИН
- ФЛУФЕНАЗИН
- МЕТЕРАЗИН И ДР.

II. ПРОДВОДНЫЕ ТИКАНТИНЫ

- ХИПРОДОТИКЕСИ
- ЗУКНОПЕНТИКОЛ
- ФЛУПЕНТИКОЛ

III. ПРОДВОДНЫЕ БУТИРОФЕНОНЫ

- ГАНОПЕРИДОЛ * ?
- ДРОПЕРИДОЛ
- БЕНПЕРИДОЛ

IV. ТРОИЗВОДНЫЕ ДИФУНКТЦИОНЕРЫ

- ФУНКЦИОНЕР
- ЛИМОЗЫ
- ПЕНФУНОДИ

V. ТРОИЗВОДНЫЕ ДИФЕРЕНЦИАЛЫ

- АЗАРЕНТИН * 3
- ДИАЗАПИ

VI. ТРОИЗВОДНЫЕ ИДИОМЫ


- КАРБУДИ
- ЗИПРАДИ
- СЕРТИДИ

VII. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ БЕЛЫ

- СУНДИ
- СУНТОДИ
- ТАПИДИ И ДР.

VIII. РАССКАЗЫ АНТИКРИТИКИ

- ДИГРЕДИ
- КРЕТИДИ * 3



ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ АНТИПСИХОТИКОВ

ДОПАМИНЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
СИНАПС

ДОПАМИН


α-ДОФА

α-ДОФА

5-HT

5-HT

СИНАПС




АФФИНИТЕТ ПРЕПАРАТОВ К РЕЦЕПТОРАМ ПО СРАВНЕНИЮ С АФФИНИТЕТОМ К D₂-РЕЦЕПТОРАМ

ПРЕПАРАТЫ	D ₂	M-XP	α ₁ -AP	H ₁	5-HT _{2A}	5-HT _{1A}
ТИПИЧНЫЕ						
· ХЛОРПРОМАЗИН	++	+	+++	++	+++	-
· ФТОРФЕНАЗИН	++	-	+	+	+	-
· ГАЛОПЕРИДОЛ	++	+	+	+	+	-
АТИПУЧНЫЕ						
· КЛОЗАПИН	++	+++	+++	+++	+++	-
· ОНАЗАНПИН	++	++	++	+++	+++	-
· РУСИПЕРИДОЛ	++	-	++	++	++	-
· СИПРАСОНДОЛ	++	+	+	+	+++	++

(АРОНАС)

ДЕПОЗИЦИЯ ПУХИ ДОФРАЙЛАННА В ТИМОСНИ МОРФЕ

ОСЛУЖИМ



1. НАПРОСЛАВНАВАНА

ОБЕЖИТЕ СЪ ПЛОДОВЕ, ЛИСИ,

КА, ВЕЖИЦИ ОУСЛО,

В ОНАИТИ

2. МЕДИАНОВА ВЕЖИЦИ

ОБЕЖИТЕ СЪ ГИДИ, ДЕН,

КА БЕРП. ОБИ,

ПОКРИВАКИ

В ПУЛЕН. СЛО

3. МЕЗОДОТИКА И ОБИЦИ

ОБЕЖИТЕ СЪ ГИДИ,

ДЕН ГИДИ,

ПУХИ КА БЕРП. ОБИ,

ПОКРИВАКИ КА

ПРОСТИ И ОБИЦИ СЛО

3 yep. + 'cammr. ?
• DER. PAUKHHE.

ATITTEH KOTAKH

3 yep. - 'cammr. ?
• HE BAKBAO. DER. ?

TAHYHBE

MEBAMAHBY.
H MEOBKPODTEK.
CATEEMA

1. ATITTEH KOTAKY.
(yep. + 'cammr.)

2. ANYKHOHOMHHEH
TUMEBE

60PKHA
HOPAHHEOBEK
Ag-PEY. B
4HC

TAITAHAYE

1. TAITTEPOHAYE

2. TAITEPOHAYE

ANOCATAHAYE.
CATEEMA

1. NEPKOEB.
PAKHHEOHAYE

TYEKOBAYE BOHA
HOOHHEO CATEMA

1. TPOTHA OPOBOTEHDE
DEHCBAYE

ATITTEHBE

HOPAY.
PEY.

1. 60PKHA Ag
PEY.

2. TAPYAHAYE.
ATAHAYE
x Ag-PEY.

CEPODTEKHA.
PEY.

1. 60PKHA
6HTA

2. 60PKHA
6HTA

THAY ĐỔI VÀ ĐÌNH DỨT

ẢNH HƯỞNG

1. **GIẢM THIỂU**
 2. **THAY ĐỔI**

1. **GIẢM THIỂU**
2. **THAY ĐỔI**

1. **THAY ĐỔI**
 2. **THAY ĐỔI**

1. **THAY ĐỔI**
 2. **THAY ĐỔI**

1. **THAY ĐỔI**
2. **THAY ĐỔI**

1. **THAY ĐỔI**
 2. **THAY ĐỔI**

1. **THAY ĐỔI**
2. **THAY ĐỔI**


1. **THAY ĐỔI**
 2. **THAY ĐỔI**



+- OMBBIH
 ++ YNEP
 +++ OMBBIH
 ТИТЧЧБЕ

COABHTENOBHЯ
 KAAATELEOTAKA
 HEXOTPOBIA
 АТДПЕКХОТ

	АТДПЕКХОТ.	ПЕК ААВВ.	CEIAAIA	АТДПЕК.	ТДПД.
АТДПЕКХОТ. АКТ-78 АТДПЕКХОТ. АКТ-78 АТДПЕКХОТ. АКТ-78	ПЕК ААВВ. ПЕК. ТАРУИИ. ПЕК. ТАРУИИ. ПЕК. ТАРУИИ. ПЕК. ТАРУИИ.	CEIAAIA +++ +++ +++ +++	АТДПЕК. АКТ-78 АТДПЕК. АКТ-78 АТДПЕК. АКТ-78	ТДПД. +++ +++ +++ +++	
БУТДООПЕНОИИ ТДПДПЕКХОТ И ПРЕНЕИИИИИ ТДПЕКХИТЕНИИ КДПДТРОТКРЕИИ	+++ +++ ++ ++	+++ +++ ++ ++	- - - -	+/- +/- +/- +/-	
АТДПЧЧБЕ КИДБАТТИИ ОИИИИИИИИ ПИДПЕНИИИИИ	бОКХИТРОВ СИОИ СИОИ И ДОРМИИИИ. ИИ-ПЕИИ.	ОИИИИ ИИИИИ ИИИИИ ИИИИИ	+++ +++ +++ +++	+++ +++ +++ +++	
АИИИИИИИИИИИ АИИИИИИИИИИИ	ТИПЧИИИИИИИИИИ АИИИИИИИИИИИ	+++ +++	- -	+ +	



ПОБЫЧИЕ ПЕРЕКТО,
ОБРАЗУНИЕ С МОКАЛОМ
ЛОПАУИДОБИ ПЕРИПОС

2. НЕК. ПАРУИДОУИЗУ
(ИМЯ ЧЕР. ЧИКОДИО, ДИМЕРОО)

2. ДЕРУА ДИСОУИЗУ
(ИМЯ ЧЕР. ЧИКОДИО, ДИМЕРОО)

3. ТИТЕРОПОИКИТИЕНУИЗУ
(ОУЕНА ПЕРЕН.)

4. ДИОУИЗУИЗУ
(ОУЕНА ПЕРЕНАУИТ)

5. АУАТИЗУИЗУ
(ОУЕНА ПЕРЕНАУИТ)
ПОПРАХОМОИ)


6. ЗИОУИЗУИЗУИЗУИЗУ
ИЛИРОИЕНТИЧ. ОИИРОИ
(ОУЕНА ПЕРЕН, ОУЕН.
ДЕИТАИЕНА)
БОУМОУИТИИ)

ПОБЫЧИЕ ПЕРЕКТО,
ОБРАЗУНИЕ С МОКАЛОМ
ИПУТХ ДЕУЕТТООС.

2. ИОУИИДОБИ И-ПЕУ.
(СЕНУИЗУ, ↑ И ТЕНА)

2. О- АИЕНОДЕУЕТТООИ
(ОТОСОИТИУЕУИЗУ ТИТОСИЗУИЗУ)
ОУЕН. ОИ. О-ИИ.


3. ИУЕУАИДОБИ ДЕУЕТТООИ
(АИОТИИДОСОНОСНОЕ Д-ИЕ)



АМИНАЗИН / Aminazin

• СИНДРОМЫ: ХОЛЕРЕОМАЗИН

• ТИПИЧНЫЙ АНТИПСИХОТИК



• ОБЛАДАЕТ ВЫСЫХИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ?

• ЭФФЕКТОМ ?


• ЭФФЕКТЫ ПРИ ПРИЁМЕ АМИНАЗИНА:

- УГНЕТИВНОЕ ЦЕНТРО-РЕФЛ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- ↓ СПОНТАННО-ДЫХАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
- РАССЛАБЛЕНИЕ ОЖЕЛТНОЙ МЫШЦАТЫ
- ГИПОТЕРМИЯ
- ПРОТИВОРОЖИТЕЛЬНОЕ Д-ИЕ, УСПОКАИВАЕТ ЦЕНТРУ
- СИЛЬНОЕ КАТАЛЕПТОГЕННОЕ Д-ИЕ
- ↓ АД; ТАХИКАРДИЯ

• ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: ШИЗОФРЕНИЯ; ДР. ПСИХОЗЫ С ПСИХО-МОТОРНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ; ГИПОМАНИАКАЛЬНЫЕ И МАНИАКАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ; ОСТРЫЕ ГАНГУЛИНАТОРНЫЕ И БРЕДОВЫЕ СИНДРОМЫ; ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЯЗВЫ; ПРИ ЗАТЯЖНОЙ ИСТОТЕ; ЧИСТО; ЧИСТОГДА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ АНГЕЛТИЧЕСКОГО СТАТУСА.

• ПРИМЕНЕНИЕ: ВНУТРЬ, В/М, В/В

Галоперидол (Haloperidolum)



Типичный антипсихотик, один из наиболее активных.

• обладает выраз. антипсихотическим, антидискинетическим, противорвотным действием?

• блокирует центр. d-AP; D-рец.;

• применение: купирование психомоторного возбуждения различного происхождения; бред и галлюцинации; при синдроме Туретта; при подготовке к операции; в кач.

противорвотного средства.

внутрь; в/в; в/м


АДАПЕНТИН (АДАЛЕРТИВИМ)



• СИНДРОМЫ: КНОЗАПИН

• АТЛПМЫШЫЙ НЕЙРОПЕНТИК ?

(АНТИПЕКУТИК)




• ВЫРАЖЕНОЕ УСИЛ. И ПЕРИФ. АНТИХОЛИНЕРГИЧ. Д-УЕ,
ПЕРИФ. α -АДРЕНОЛИТИЧЕСКОЕ Д-УЕ, БЛОКИРУЕТ ДОФАМИНОВЫЕ
РЕЦЕПТОРЫ ЦНС

• ДЕЙСТВИЕ: СИЛЬНОЕ АНТИПЕКУТИЧЕСКОЕ В СОЧЕТАНИИ С
ДЕДАТАВНЫМ И МЫШЕЧНО-РАСРЕЛАБЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖЕЛЕЗАНРАМНОСТНЫХ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ.

• ПРИМЕНЕНИЕ: ПРИ ГАГНОЦИНАТОРНО-БРЕДОВЫХ, КАТАМНО-
ГАГНОЦИНАТОРНЫХ СОСТОЯНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ ПСИХОМОТОРНОГО
ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ, МАНИАКАЛЬНОМ СИНДРОМЕ И Т.Д.
ВНУТРИ.

Кветиапин (Quetiapine)



• сидонимы: Сероквен

• атипичный антипсихотик ?

• валяет на 5-HT₂-рец.; D₂ и D₂-рец.; d-AR и H₁-рец.

• применение: при шизофрении с продуктивной и негативной симптоматикой

вместе.