

Глава 5

# ДЕДУКТИВНЫЕ ТЕОРИИ

## ДЕДУКЦИЯ, ИНДУКЦИЯ

**Дедукция** ( deductio – выведение ) - форма мышления, когда заключение выводится логическим путем из некоторых посылок.

**Индукция** ( inductio – наведение ) - форма мышления, когда от некоторых фактов или истинных высказываний переходят к гипотезе (общему утверждению).

Дедуктивные рассуждения.

1. Все люди смертны. Сократ – человек. Следовательно, Сократ смертен.
2.  $5 > 3$ ,  $3 > 1$ , следовательно,  $5 > 1$ .

Примеры индуктивных рассуждений.

1. График функции 
$$\left. \begin{array}{l} y = 2x + 1 \quad - \text{прямая} \\ y = x + 2 \quad - \text{прямая} \end{array} \right\}, \text{ следовательно, графиком}$$

для  $y = kx + b$  является прямая.

2. Пусть  $p = 2^{2^n} + 1$ . При  $n = 0, 1, 2, 3, 4$  получим, что  $p$  равно 3, 5, 17, 257, 65537 и все они простые числа, предполагаем, что все числа  $p$  простые (гипотеза Ферма). Эйлер показал, что для

$$n = 5$$

$$p = 4\,294\,967\,297$$

и делится на 641. Следовательно, предположение Ферма не верно.

## ЗАДАНИЕ ДЕДУКТИВНОЙ ТЕОРИИ

*Дедуктивная теория* заданна если:

- 1) задан алфавит;
- 2) заданы правила образования формул;  $\Phi$  - множество формул; из  $\Phi$  выделено дедуктивным способом подмножество  $T$ , элементы которого называются теоремами.

$T$  можно задать:


- 
- I. а) Из  $\Phi$  выделяется подмножество  $A$ , элементы которого называются аксиомами – заданы аксиомы;
  - б) задается конечное число правил выводов.
- Эта теория называется *формальной аксиоматической теорией (ФАТ)*.

*Аксиомы не доказываются не потому, что могут не доказываться, а потому, что не могут быть доказаны.*

- 
- II. а) Заданы аксиомы;
  - б) правила вывода считаются известными.
- Это *полуформальная аксиоматическая теория (ПАТ)*.

- 
- III. а) Аксиом нет;
  - б) задается конечное число правил выводов.
- Такую теорию называют *теорией естественного вывода (ТЕВ)*.

## СВОЙСТВА ДЕДУКТИВНЫХ ТЕОРИЙ



Дедуктивные теории, в которых множество теорем  $T = \Phi$ , называются *противоречивыми*, в противном случае – *непротиворечивыми*.

Свойство *полноты* дедуктивной теории характеризует достаточность теорем для каких-то целей. В зависимости от целей вводятся различные понятия полноты.

*Независимость аксиом.* Аксиома  $A_k$  называется *независимой*, если  $A_k$  нельзя доказать из остальных аксиом. Система аксиом называется *независимой*, если каждая из них независима от остальных.

*Разрешимость теории.* Дедуктивная теория называется *разрешимой*, если существует метод, позволяющий для произвольной формулы  $A$  за конечное число действий выяснить, является  $A$  теоремой или нет.

**ПОЛУФОРМАЛЬНАЯ**

**АКСИОМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ**

# ПОЛУФОРМАЛЬНАЯ АКСИОМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ - ГЕОМЕТРИЯ

Геометрия Евклида (330 – 275 гг. до н.э.) «Начала».

Аксиоматика Гильберта:

1. *Задано три различных множества:*

а) элементы 1-го множества называются *точками* и обозначаются через  $A, B, C, \dots$ ;

б) элементы 2-го называются *прямыми* и обозначаются через  $a, b, c, \dots$ ;

в) элементы 3-го множества называются *плоскостями* и обозначаются через  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$

На множестве точек, прямых и плоскостей *введены отношения*, обозначаемые словом «лежат», «между» и «конгруэнтно».



## АКСИОМЫ ГЕОМЕТРИИ

Первая группа - *аксиомы связи (8 аксиом)*.

- 1). Каковы бы ни были две точки  $A$ ,  $B$ , существует прямая  $a$ , проходящая через каждую из точек  $A$ ,  $B$ .

Вторая группа - *аксиомы порядка (4)*.

- 1). Если точка  $B$  лежит между точками  $A$  и  $C$ , то  $A$ ,  $B$ ,  $C$  - различные точки одной прямой  $b$  и точка  $B$  лежит также между  $C$  и  $A$ .

Третья группа - *аксиомы конгруэнтности (5 аксиом)*,



Четвёртая группа - *аксиомы непрерывности (2 аксиомы)*

Пятая группа - *аксиома параллельности*.

**Аксиома Евклида.**



**Аксиома Лобачевского**



**ФОРМАЛЬНАЯ  
АКСИОМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕОРИЯ**

***(ИСЧИСЛЕНИЕ  
ГИЛЬБЕРТОВСКОГО ТИПА)***



## ФОРМАЛЬНАЯ АКСИОМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (ФАТ)

ФАТ задана если заданы:

1. Алфавит теории.

2. Формулы.

3. Аксиомы.

4. Конечное число правил вывода  $R_1, R_2, \dots, R_n$ , согласно каждому из которых некоторая формула, именуемая *непосредственным следствием*, непосредственно выводима из некоторого конечного множества формул, называемых *посылками*.

*Вывод* в ФАТ - последовательность  $A_1, A_2, \dots, A_n$  формул, такая, что для каждого  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ):  $A_i = \begin{cases} A_i - \text{аксиома} \\ A_i - \text{непоср. следствие} \end{cases}$

Формула  $A$  теории  $B$  наз-ся *теоремой* теории  $B$ , если  $\exists$  вывод в  $B$ , в котором последней формулой является  $A$ .

Формула  $A$  - *следствие* множества формул  $G$  тогда и только тогда, когда существует такая последовательность формул  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , что

$A_n = A$  и  $A_i = \begin{cases} A_i - \text{аксиома} \\ A_i - \text{непоср. следствие} \\ A_i - \text{формула из } G \end{cases}$  Тогда пишем:  $G \vdash A$

Элементы  $G$  – *гипотезы*.  $\vdash A \leftrightarrow$  «формула  $A$  является теоремой».

## СВОЙСТВА ВЫВОДИМОСТИ

1. Если  $G \subseteq F$  и если  $G \vdash A$ , то  $F \vdash A$ .
2.  $G \vdash A \Leftrightarrow$  когда в  $G$   $\exists$  конечное подмножество  $H$  такое, что  $H \vdash A$ .
3. Пусть  $G \vdash A$  и  $\forall$  формула  $B$  из  $G$ , выводима из  $F$ , тогда  $F \vdash A$ .
- 3\* . Если  $A \vdash B$  и  $B \vdash C$ , то  $A \vdash C$ .
4. Если  $G, A \vdash B$  и  $G \vdash A$ , то  $G \vdash B$ .

## ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ( ТЕОРИЯ $L$ )

1. Символы  $L$  :  $\neg, \Rightarrow, \wedge, \vee, (, A_1, A_2, A_3, \dots$

2. Формулы  $L$  :

1) все буквы  $A_1, A_2, A_3, \dots$  суть формулы;

2) если  $A$  и  $B$  формулы, то  $(\neg A)$  и  $(A \Rightarrow B)$  тоже формулы;

3) выражение теории  $L$  является формулой только тогда, когда это следует из 1) и 2).

Будем считать, что:  $A \& B \leftrightarrow (\neg(A \Rightarrow (\neg B)))$ ,  $A \vee B \leftrightarrow ((\neg A) \Rightarrow B), \dots$

3. Аксиомы  $L$ . Для  $\forall$  формул  $A, B$  и  $C$  теории  $L$ , следующие формулы суть аксиомы  $L$ :

$A1: A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$ ;

$A2: (A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C))$ ;

$A3: (\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow ((\neg B \Rightarrow A) \Rightarrow B)$ .

4. Правило вывода теории  $L$  : *modus ponens* ( $MP$ ):

$B$  есть непосредственное следствие  $A$  и  $A \Rightarrow B$ .

$MP$  означает:  $A, A \Rightarrow B \vdash B$ .

## НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

**Лемма 1.** Для  $\forall$  формулы  $A$  теории  $L$  формула  $A \Rightarrow A$  является теоремой этой теории  $L$ .

**Теорема (теорема дедукции).** Если  $\Gamma$  - множество формул,  $A, B$  - формулы и  $\Gamma, A \vdash B$ , то  $\Gamma \vdash A \Rightarrow B$ . В частности, если  $A \vdash B$ , то  $\vdash A \Rightarrow B$ .

**Следствие 1.**  $A \Rightarrow B, B \Rightarrow C \vdash A \Rightarrow C$ .

**Следствие 2.**  $A \Rightarrow (B \Rightarrow C), B \vdash A \Rightarrow C$ .

**Лемма 2.** Для  $\forall$  формул  $A, B$  следующие формулы являются теоремами в  $L$ :

а)  $\neg\neg B \Rightarrow B$ ;

б)  $B \Rightarrow \neg\neg B$ ;

в)  $\neg A \Rightarrow (A \Rightarrow B)$ ;

г)  $(\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$ ;

д)  $(A \Rightarrow B) \Rightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$ ;

е)  $A \Rightarrow (\neg B \Rightarrow \neg(A \Rightarrow B))$ ;

ж)  $(A \Rightarrow B) \Rightarrow ((\neg A \Rightarrow B) \Rightarrow B)$ .

## ДВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ

Первое определение. Дедуктивная теория наз-ся противоречивой, если  $T = \Phi$  и непротиворечивой если  $T \neq \Phi$ .

Второе определение. Дедуктивная теория наз-ся противоречивой, если  $\exists$  формула  $A$  такая, что  $\vdash A$  и  $\vdash \neg A$ ; если такой формулы не  $\exists$ , то теория наз-ся непротиворечивой.

**Теорема 5.2.** Для теорий, содержащих исчисление высказываний, приведенные определения (не) противоречивости эквивалентны.

## ДОКАЗУЕМЫЕ ПРАВИЛА ВЫВОДА В $L$

Правило *modus ponens*:  $\frac{A, A \Rightarrow B}{B} \Rightarrow$

теорема дедукции:  $\frac{G, A \mid \underline{B}; G}{A \Rightarrow B} \Rightarrow;$

Правила:

перевертывания:  $\frac{G, A \mid \underline{B}; G, \neg B}{\neg A} \neg;$

удаления  $\&$ :  $\frac{A \& B}{A} \&$ ,  $\frac{A \& B}{B} \&$ ; введения  $\&$ :  $\frac{A, B}{A \& B} \&$ ,  $\frac{A, B}{B \& A} \&$ ;

введения  $\vee$ :  $\frac{A}{A \vee B} \vee$ ,  $\frac{A}{B \vee A} \vee$ ; сведения к нелепости:  $\frac{A \mid \underline{B}, A \mid \underline{\neg B}}{\neg A} \neg$


доказательства разбором случаев:  $\frac{A \mid \underline{C}, B \mid \underline{C}, A \vee B}{C} \vee;$

# СВОЙСТВА ИСЧИСЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ


## Непротиворечивость

Теорема. Исчисление высказываний непротиворечиво, т.е. не  $\exists$  формулы  $A$  такой, чтобы  $A$  и  $\neg A$  были ее теоремами.

Теория  $L$  полна в широком смысле, если в ней доказуема каждая формула, являющаяся тавтологией.



Теория  $L$  полна в узком смысле, если присоединение к ее аксиомам какой-нибудь, не выводимой в ней формулы, приводит к противоречивой теории.



Теорема (о полноте). Если формула  $A$  теории  $L$  является тавтологией, то она является теоремой теории  $L$ .

## НЕЗАВИСИМОСТЬ АКСИОМ

Теорема. Каждая из схем  $A_1$ ,  $A_2$  и  $A_3$  независима от остальных.

Для  $A_1$ .

$A$	$B$	$\neg A$	$A \Rightarrow B$
0	0	1	0
1	0	1	2
2	0	0	0
0	1		2
1	1		2
2	1		0
0	2		2
1	2		0
2	2		0

$(\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow ((\neg B \Rightarrow A) \Rightarrow B)$											
1	0	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0
1	0	2	1	1	0	1	0	2	1	0	0
1	0	2	0	2	0	1	0	0	2	0	0
1	1	2	1	0	0	1	1	2	0	0	1
1	1	2	1	1	0	1	1	2	1	0	1
1	1	2	0	2	0	1	1	0	2	2	1
0	2	2	1	0	0	0	2	0	0	2	2
0	2	2	1	1	0	0	2	2	1	0	2
0	2	0	0	2	0	0	2	2	2	0	2

Но  $A_1$  не является выделенной, так как принимает значение 2 :



$A_1$	$\Rightarrow$	$(A_2 \Rightarrow A_1)$
1	2	2
2	0	1



# РАЗРЕШИМОСТЬ.

Теорема. Исчисление высказываний (теория  $L$ ) является разрешимой теорией.

Доказательство. Формула  $A$  теории  $L$  является теоремой тогда и только тогда, когда она является тавтологией.



# ТЕОРИИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

1. Символы:  $\neg, \Rightarrow$  - пропозициональные связки;

$(, ), ', \dots$  - знаки пунктуации;

$x_1, x_2, \dots$  - счетное множество предметных переменных;

$a_1, a_2, \dots$  - конечное (возможно и пустое) или счетное множество предметных констант;

$A_i^k (i, k \geq 0)$  - непустое, конечное или счетное мн-во предикатных букв;

$f_i^k (i, k \geq 1)$  - конечное (возможно и пустое) или счетное мн-во функциональных букв;

$\forall x_i, \exists x_i (i \geq 1)$  - кванторы.

*Сигнатура* – набор из трех множеств  $\Omega = \langle Cnst, Fn, Pr \rangle$ , где

*Cnst* - множество постоянных (констант);

*Fn* - множество функциональных букв;

*Pr* - множество предикатных букв.

2. Формулы теории первого порядка - формулы логики предикатов.

## ТЕОРИИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА (ТЕОРИИ К)

### 3. Аксиомы теории $K$ :

**Логические аксиомы:** для  $\forall$  формул  $A, B, C$  имеем аксиомы:

$$A1: A \Rightarrow (B \Rightarrow A);$$

$$A2: (A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C));$$

$$A3: (\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow ((\neg B \Rightarrow A) \Rightarrow B);$$

$$A4: \forall x_i A(x_i) \Rightarrow A(t),$$

здесь  $t$  терм теории  $K$ , свободный для  $x_i$  в  $A(x_i)$ ;

$$A5: \forall x_i (A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow \forall x_i B), \text{ если } A \text{ не содержит свободных вхождений } x_i.$$

**Собственные аксиомы** у каждой теории свои.

### 4. Правила вывода:

$$1) \textit{modus ponens}: A, A \Rightarrow B \vdash B;$$

$$2) \textit{правило обобщения (Gen)}: A \vdash \forall x_i A.$$

## АРИФМЕТИКА

Система аксиом ( Дедекиннд, Пеано ):

$P_1$  :  $0$  - есть натуральное число;

$P_2$  : для  $\forall$  натурального числа  $x$   $\exists$  другое натуральное число, обозначаемое  $x'$  и называемое непосредственно следующим за  $x$ ;

$P_3$  :  $0 \neq x'$  для  $\forall$  натурального числа  $x$ ;

$P_4$  : если  $x' = y'$ , то  $x = y$ ;

$P_5$  : если  $U$  есть свойство, которым, быть может, обладают одни и не обладают другие натуральные числа, и если:

1) натуральное число  $0$  обладает свойством  $U$  и

2) для  $\forall$  натурального числа  $x$  из того, что  $x$  обладает свойством  $U$  следует, что и натуральное число  $x'$  обладает свойством  $U$ ,

то свойством  $U$  обладают все натуральные числа (принцип математической индукции).

## ФОРМАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА ( ТЕОРИЯ S )

S - теория 1 - го порядка, имеющая символы:  $A_1^2$ ,  $a_1$ ,  $f_1^1$ ,  $f_1^2$ ,  $f_2^2$ ,  $\neg$ ,  $\Rightarrow$ ,  $,$ ,  $($ ,  $'$ ,  $x_1$ ,  $x_2, \dots$ ,  $\forall x_1$ ,  $\forall x_2, \dots$ ,  $\exists x_1, \dots$ ,  $\exists x_2, \dots$

$A_1^2(t, s)$  через  $t = s$ ,

$a_1$  через 0,

$f_1^1(t)$  через  $t'$ ,

$f_1^2(t, s)$  через  $t + s$ ,

$f_2^2(t, s)$  через  $t \bullet s$  ( $\bullet$  - знак умножения).

Собственные аксиомы формальной арифметики:

S1:  $x_1 = x_2 \Rightarrow ((x_1 = x_3) \Rightarrow (x_2 = x_3))$ ;

S2:  $x_1 = x_2 \Rightarrow x_1' = x_2'$ ;

S3:  $0 \neq x_1'$ ;

S4:  $x_1' = x_2' \Rightarrow x_1 = x_2$ ;

S5:  $x_1 + 0 = x_1$ ;

S6:  $x_1 + x_2' = (x_1 + x_2)'$ ;

S7:  $x_1 \bullet 0 = 0$ ;

S8:  $x_1 \bullet x_2' = x_1 \bullet x_2 + x_1$ ;

S9:  $A(0) \Rightarrow (\forall x_i (A(x_i) \Rightarrow A(x_i'))) \Rightarrow \forall x_i A(x_i)$ ,  
где  $A(x_i)$  - произвольная формула теории S.


Правила вывода: *MP* и *Gen*.

# СВОЙСТВА ИСЧИСЛЕНИЯ ПРЕДИКАТОВ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

**Теорема. Каждая теория  $K_1$  непротиворечива.**

Исчисление предикатов 1-го порядка наз-ся *полной в широком смысле*, если  $\forall$  логическая общезначимая формула является теоремой.

**Теорема (теорема Гёделя о полноте).** Каждая логически общезначимая формула из  $K_1$  является теоремой в  $K_1$ .



Теория  $K$  считается *полной в узком смысле* ( или в *смысле Поста* ), если добавление к ее аксиомам любого недоказуемого в ней утверждения приводит к противоречивой теории.

Исчисление предикатов неполна в узком смысле.

**Теорема (теорема Чёрча).** Исчисление предикатов первого порядка является неразрешимой теорией.

## СВОЙСТВА ТЕОРИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Первая теорема Геделя утверждает, что каждая ФАТ  $K$ , содержащая формальную арифметику такова, что если  $K$  непротиворечива, то  $K$  существенно неполна.

Вторая теорема Геделя. Если теория  $K$ , содержащая арифметику, непротиворечива, то непротиворечивость ее нельзя доказать средствами самой теории  $K$ .

Аксиоматический метод позволяет:

- 1) систематизировать научный материал;
- 2) обеспечить определенную организацию научного знания;
- 3) исследовать структуру различных теорий и их взаимоотношение;
- 4) обеспечить необходимую строгость рассуждений.

*Д. Гильберт: "Под знаком аксиоматического метода математика проявляет свою руководящую роль в науке вообще".*

## ПОИСК КОНТРПРИМЕРА

Пусть дана формула  $W$  логики высказываний, которая возможно не является тавтологией, следовательно, может быть существуют означивание переменных, при которых она ложна. Как это выяснить? Естественно посмотреть на структуру формулы  $W$ .

Если  $W$  имеет вид:  $A \Rightarrow B$ ,

то надо найти значения переменных, при которых  $A = И$ , а  $B = Л$ .

Если  $W$  имеет вид:  $A \vee B$ ,

то надо найти значения переменных, при которых  $A = B = Л$ .

Если  $W$  имеет вид:  $A \& B$ , то ....

Тем самым задача поиска контрпримера для формулы  $W$  сводится к одной или нескольким аналогичным задачам.



## СЕКВЕНЦИЯ

Секвенцией называется выражение вида  $\Gamma \rightarrow \Delta$ , где  $\Gamma$  и  $\Delta$  — некоторые конечные множества формул, знак  $\rightarrow$  разделяет эти множества формул.

С каждой секвенцией  $\Gamma \rightarrow \Delta$  связывают задачу поиска таких значений переменных, при которых все формулы из  $\Gamma$  истинны, а все формулы из  $\Delta$  ложны. Такой набор значений называется *контрпримером* к секвенции  $\Gamma \rightarrow \Delta$ .

Пусть  $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ ,  $\Delta = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$ . Тогда контрпримеры к секвенции  $\Gamma \rightarrow \Delta$  — это контрпримеры к формуле

$$W = A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n \Rightarrow B_1 \vee B_2 \vee \dots \vee B_m.$$

то есть те наборы значений, при которых формула  $W$  ложна. При этом конъюнкцию *пустого множества* формул считаем тождественно истинной, а дизъюнкцию *пустого множества* формул считаем тождественно ложной.

## СВЕДЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОИСКА КОНТРПРИМЕРА К ФОРМУЛЕ К ЗАДАЧЕ ПОИСКА КОНТРПРИМЕРА К СЕКВЕНЦИИ

Задача поиска контрпримера к формуле  $B$  может быть сформулирована как задача поиска контрпримера к секвенции:

$\emptyset \rightarrow \{B\}$ . Вместо  $\emptyset \rightarrow \{B\}$  будем записывать:  $\rightarrow B$ ,

а вместо  $\{A\} \rightarrow \emptyset$  будем записывать  $A \rightarrow$

Пусть в левой и правой частях секвенции встречаются одинаковые формулы, например,  $D$  содержится и слева и справа секвенции. Тогда в формуле  $W$  будет содержаться  $\neg D \vee D$  поэтому  $W$  является тавтологией и не может быть ложной, и, следовательно,  $W$  не имеет контрпримера.

Пример. Секвенция  $A \rightarrow A, B$  не имеет контрпримера, так как формула  $W = A \Rightarrow A \vee B \sim \neg A \vee A \vee B$  тавтология, а секвенция  $A \rightarrow B, C$  имеет контрпример, так как формула  $W = A \Rightarrow B \vee C \sim \neg A \vee B \vee C$  будет ложна, когда  $A = И, B = C = Л$ .

## ЗАДАНИЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ВИДЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СЕКВЕНЦИЙ

Исчисление секвенций для высказываний обозначают как систему  $G'$ .

1. Символами  $G'$  являются:  $\neg, \&, \vee, \Rightarrow, ), ($  и буквы  $A_1, A_2, A_3, \dots$

2. Формулы  $G'$  задаются так же, как в логике высказываний.

3. Аксиомы. В  $G'$  аксиомами являются секвенции, в левой и правой частях которых формулами являются только атомарные формулы, причём некоторая формула встречается в обеих частях секвенции.

Пример аксиомы:  $A, B \rightarrow A$ .

Очевидно, что аксиома не имеет контрпримера.

## ЗАДАНИЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ВИДЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СЕКВЕНЦИЙ - ПРАВИЛА

4. Правила вывода задаются в форме:

$$\frac{\text{секвенция}}{\text{секвенция}}$$

или

$$\frac{\text{секвенция} \quad \text{секвенция}}{\text{секвенция}}$$

Верхние секвенции считаются посылками, а нижние - заключениями. Справа от правил могут записываться связки  $\neg$ ,  $\&$ ,  $\vee$ ,  $\Rightarrow$ , которые исключаются по этим правилам.

*В каждом правиле считается, что нижняя секвенция имеет контрпример тогда и только тогда, когда хотя бы одна из верхних секвенций имеет контрпример.*

## ИСЧИСЛЕНИЯ СЕКВЕНЦИЙ - ПРАВИЛА

Пусть  $\Gamma$  и  $\Delta$  — некоторые конечные множества формул из  $G'$ , а  $A$  и  $B$  произвольные формулы из  $G'$ . Правилами выводов в системе  $G'$  считаются следующие:

$$\text{а) } \frac{\Gamma \rightarrow A, \Delta \quad \Gamma \rightarrow B, \Delta}{\Gamma \rightarrow A \& B, \Delta}$$

$$\text{б) } \frac{A, B, \Gamma \rightarrow \Delta}{A \& B, \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$$\text{в) } \frac{\Gamma \rightarrow A, B, \Delta}{\Gamma \rightarrow A \vee B, \Delta}$$

$$\text{г) } \frac{A, \Gamma \rightarrow \Delta \quad B, \Gamma \rightarrow \Delta}{A \vee B, \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$$\text{д) } \frac{\Gamma, A \rightarrow B, \Delta}{\Gamma \rightarrow A \Rightarrow B, \Delta}$$

$$\text{е) } \frac{\Gamma \rightarrow A, \Delta \quad \Gamma, B \rightarrow \Delta}{A \Rightarrow B, \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$$\text{ж) } \frac{A, \Gamma \rightarrow \Delta}{\Gamma \rightarrow \neg A, \Delta}$$

$$\text{з) } \frac{\Gamma \rightarrow A, \Delta}{\neg A, \Gamma \rightarrow \Delta}$$

$\Gamma, A$  обозначает  $\Gamma \cup \{A\}$ . Каждое правило применяется для анализа одной из формул нижней секвенции.

## ИСЧИСЛЕНИЕ СЕКВЕНЦИЙ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИЛ

Как пользоваться правилами? Возьмём секвенцию, к которой мы ищем контрпример. Выбираем в ней последовательно (лексикографически) формулу сначала слева затем справа секвенции, посмотрим на главную связку и применим соответствующее правило, написав одну или две секвенции над исходной. Затем к каждой из них снова применим одно из правил и т. д. Постепенно будет расти «дерево поиска контрпримера», причём исходная секвенция будет иметь контрпример тогда и только тогда, когда одна из верхних секвенций (стоящих в «листьях») этого дерева имеет контрпример.

Этот процесс обрывается в том случае, если все формулы в оставшихся секвенциях представляют собой атомы (переменные), тогда ни одно из наших правил поиска контрпримера не применимо. **К этому моменту всё становится ясным: если в левой и правой части секвенции есть общий атом (формула, переменная), то к ней нет контрпримера. Если же левая и правая части секвенции не пересекаются, то контрпример есть.**

Пример. Для  $\forall$  формулы  $A$  формула  $A \Rightarrow A$  доказуема в теории  $L$ .

Будет ли  $A \Rightarrow A$  - доказуемой в  $G'$  ?

Иначе, имеет ли секвенция

$\rightarrow (A \Rightarrow A)$  контрпример ?

По правилу д) получим :  $A \rightarrow A$  ( $\Gamma = \emptyset, \Delta = \emptyset$ ),

а эта секвенция является аксиомой и контрпримера не

имеет, следовательно,  $A \Rightarrow A$  - доказуема в  $G'$ .

Лемма 1 (в теории L). Для  $\forall$  формулы  $A$  формула  $A \Rightarrow A$  – теорема в L

*Доказательство:*

- 1)  $(A \Rightarrow ((A \Rightarrow A) \Rightarrow A)) \Rightarrow ((A \Rightarrow (A \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \Rightarrow A))$  аксиома по A2,  
если  $B=A \Rightarrow A$  и  $C=A$ ;
- 2)  $A \Rightarrow ((A \Rightarrow A) \Rightarrow A)$  аксиома по схеме A1, если  $B=A \Rightarrow A$ ;
- 3)  $(A \Rightarrow (A \Rightarrow A)) \Rightarrow (A \Rightarrow A)$  непоср. следствие из 1) и 2) по MP;
- 4)  $A \Rightarrow (A \Rightarrow A)$  аксиома по схеме A1 при  $B=A$ ;
- 5)  $A \Rightarrow A$  непоср. следствие из 3) и 4) по MP.



## ИСЧИСЛЕНИЕ СЕКВЕНЦИЙ – ПРИМЕР 1

Пример 1. Пусть имеем секвенцию:

$$\rightarrow A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$$

Используя правило д) получим (здесь  $\Gamma = \{\emptyset\}$ ,  $\Delta = \{\emptyset\}$ ):

$$A \rightarrow (B \Rightarrow A)$$

Теперь, вновь используем это правил д), но с  $\Gamma = \{A\}$ .

В результате получим:

$$A, B \rightarrow A$$

Полученная секвенция является аксиомой и не имеет контрпримера, следовательно, исходная секвенция выводима. Отметим, что формула  $A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$  является тавтологией и выводима в формальной аксиоматической системе - теории  $L$ . Описанный вывод секвенции

представляют в виде следующего дерева вывода:

$$\frac{\frac{A, B \rightarrow A}{A \rightarrow (B \Rightarrow A)}}{\rightarrow A \Rightarrow (B \Rightarrow A)}$$

## ИСЧИСЛЕНИЕ СЕКВЕНЦИЙ – ПРИМЕР 2

Пример 2. Пусть имеем секвенцию:

$$\rightarrow (C \Rightarrow D) \Rightarrow D$$

Используя правило д) получим (здесь  $\Gamma = \{\emptyset\}$ ,  $\Delta = \{\emptyset\}$ ):  $C \Rightarrow D \rightarrow D$

Теперь используя правил е), но с  $\Delta = \{D\}$ , получим две секвенции:

$$\rightarrow C, D$$

и

$$D \rightarrow D$$

Вторая секвенция является аксиомой и не имеет контрпримера, но первая имеет контрпример:  $C = D = \perp$ . Тогда исходная секвенция не выводима. Эти выкладки представляются следующим деревом вывода:

$$\frac{\frac{\rightarrow C, D \quad D \rightarrow D}{C \Rightarrow D \rightarrow D}}{\rightarrow (C \Rightarrow D) \Rightarrow D)}$$

Легко видеть, что формула  $(C \Rightarrow D) \Rightarrow D$  не является тавтологией и не выводима и в формальной аксиоматической системе - теории  $L$ .

## ИСЧИСЛЕНИЕ СЕКВЕНЦИЙ – ПРИМЕР 3

Пример 3. Пусть имеем секвенцию

$$\rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow A) \Rightarrow A$$

Поиск контрпримера (вывода) можно развернуть и в последовательность секвенций, но запишем в обычном для исчисления секвенции виде, именно, в виде дерева, как в рассмотренных примерах 1 и 2:

$$\frac{\frac{\frac{A \rightarrow A, B}{\rightarrow A, A \Rightarrow B} \quad A \rightarrow A}{(A \Rightarrow B) \Rightarrow A \rightarrow A}}{\rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow A) \Rightarrow A}$$

Здесь обе секвенции  $A \rightarrow A, B$  и  $A \rightarrow A$ , находящиеся в листьях дерева, являются аксиомами и не имеют контрпримеров. Следовательно, формула  $((A \Rightarrow B) \Rightarrow A) \Rightarrow A$  является тавтологией и исходная не имеет контрпримера, а имеет вывод в  $G'$ .

## АЛГОРИТМ ПОИСКА КОНТРПРИМЕРА

Поиск контрпримера представим в виде алгоритма, использующего процедуры поиск (*search*) и раскрытия формулы (*expand*).

В процедуре поиск (*search*) алгоритм просматривает все листья строящегося дерева вывода слева направо. Для каждого листа, не являющегося атомарной формулой, вызывается процедура раскрытия формулы (*expand*).

Процедура *expand* строит поддереву, выбирая подходящее правило вывода, чтобы исключить из неатомарной формулы главную связку. Алгоритм продолжает работу до тех пор, пока каждый лист станет атомарной формулой. После того как все листья составлены из секвенций только с атомарными формулами делается заключение: **если все листья аксиомы, то контрпримера нет и исходная секвенция выводима, иначе контрпример существует и секвенция не выводима.**

## PROCEDURE SEARCH

```
procedure search( $\Gamma \rightarrow \Delta$ : sequent; var  $T$ : tree);  
begin  
  let  $T$  be the one-node tree labeled with  $\Gamma \rightarrow \Delta$ ;  
  while not all leaves of  $T$  are finished do  
     $T_0 := T$ ;  
    for each leaf node of  $T_0$   
      (in lexicographic order of tree addresses) do  
        if not finished(node.) then  
          expand(node,  $T$ )  
        endif  
      endfor  
    endwhile;  
    if all leaves are axioms  
    then  
      write (' $T$  is a proof of  $\Gamma \rightarrow \Delta$ ')  
    else  
      write (' $\Gamma \rightarrow \Delta$  is falsifiable')  
    endif  
end.
```

## PROCEDURE EXPAND

```
procedure expand(node : tree-address; var T : tree);  
begin  
    let  $A_1, \dots, A_n \rightarrow B_1, \dots, B_m$  be the label of node;  
    let S be the one-node tree labeled with  
         $A_1, \dots, A_n \rightarrow B_1, \dots, B_m$   
    for  $i := 1$  to  $m$  do  
        if nonatomic( $A_i$ ) then  
             $S :=$  the new tree obtained from S by  
                applying to the descendant of  $A_i$   
                in every nonaxiom leaf of S  
                the left rule applicable to  $A_i$   
        endif  
    endfor;  
    for  $i := 1$  to  $n$  do  
        if nonatomic( $B_i$ ) then  
             $S :=$  the new tree obtained from S  
                by applying to the descendant of  $B_i$   
                in every nonaxiom leaf of S  
                the right rule applicable to  $B_i$   
        endif  
    endfor;  
     $T :=$  dosubstitution( $T, node, S$ )  
end.
```



## ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА ИСЧИСЛЕНИЯ СЕКВЕНЦИЙ ДЛЯ ЛВ

**Теорема 4.11 (корректность и полнота исчисления секвенций).  
Секвенция выводима тогда и только тогда, когда она не имеет  
контрпримера.**

**Чем уж так интересно исчисление секвенций? Какая, собственно говоря, разница — иметь дело с секвенциями или с выводом в гильбертовском исчислении?**

## ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ИСЧИСЛЕНИЯ СЕКВЕНЦИЙ

Принципиальное различие Исч.-Гильберта и Исч.-Генцена в следующем.

Правила вывода в исчислении секвенций таковы, что в их верхнюю часть входят только подформулы формул, встречающихся в нижней части. Поэтому в выводе какой-то секвенции не может встретиться ничего нового, чего не было в самой секвенции.

В гильбертовском исчислении это не так: мы можем вывести формулу  $B$  из формул  $A \Rightarrow B$  и  $A$ , при этом  $A$  может быть совершенно произвольной. Поэтому поиск вывода снизу вверх для исчисления секвенций происходит сравнительно однозначно (мы можем по-разному выбирать расчленяемую формулу, но и только), в то время как в гильбертовском исчислении, начав с интересующей нас формулы  $B$  трудно указать, из чего бы мы могли получить ее вывод.



# ТЕОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВЫВОДА - ТЕВ

*(НАТУРАЛЬНАЯ ДЕДУКЦИЯ)*

## ТЕОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВЫВОДА

Заданы: 1) алфавит; 2) формулы; 3) аксиом нет; 4) правила выводов.

*Исчисление высказываний в виде теории естественного вывода.*

1. Символы:  $\neg, \&, \vee, \Rightarrow, (, ), A_1, A_2, \dots$ ,

2. Формулы: пропоз. формы, образ-ые из  $A_1, A_2, \dots$  с помощью  $\neg, \&, \vee, \Rightarrow$ .

3. Правила вывода:

Правила введения:

$$\frac{A, B}{A \& B} \&; \quad \frac{A, B}{B \& A} \&; \quad \frac{A}{A \vee B} \vee; \quad \frac{A}{B \vee A} \vee; \quad \frac{A \vdash B}{A \Rightarrow B} \Rightarrow; \quad \frac{A \vdash B, \neg B}{\neg A} \neg.$$

Правила исключения (удаления):

$$\frac{A \& B}{A} \&; \quad \frac{A \& B}{B} \&; \quad \frac{A \vdash C, B \vdash C, A \vee B}{C} \vee; \quad \frac{\neg \neg A}{A} \neg; \quad \frac{A, A \Rightarrow B}{B} \Rightarrow.$$

## ТЕОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВЫВОДА

Заданы: 1) алфавит; 2) формулы; 3) аксиом нет; 4) правила выводов.

*Исчисление высказываний в виде теории естественного вывода.*

1. Символы:  $\neg$ ,  $\&$ ,  $\vee$ ,  $\Rightarrow$ ,  $(, )$ ,  $A_1, A_2, \dots$ ,

2. Формулы: пропоз. формы, образ-ые из  $A_1, A_2, \dots$  с помощью  $\neg, \&, \vee, \Rightarrow$ .

3. Правила вывода:


Правила введения:

$$\frac{A, B}{A \& B} \&; \quad \frac{A, B}{B \& A} \&; \quad \frac{A}{A \vee B} \vee; \quad \frac{A}{B \vee A} \vee; \quad \frac{A \mid B}{A \Rightarrow B} \Rightarrow; \quad \frac{A \mid B, \neg B}{\neg A} \neg$$

Правила исключения (удаления):

$$\frac{A \& B}{A} \&; \quad \frac{A \& B}{B} \&; \quad \frac{A \mid C, B \mid C}{C} \vee; \quad \frac{\neg \neg A}{A} \neg; \quad \frac{A, A \Rightarrow B}{B} \Rightarrow$$

# ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В ТЕВ



## СРАВНЕНИЕ ТЕВ С ИСЧИСЛЕНИЕМ СЕКВЕНЦИЙ

Натуральная дедукция (теория естественного вывода) похожа на исчисление секвенций, но есть существенное различие.

В натуральной дедукции есть правила введения и исключения, а в исчислении секвенций только правила исключения.

Поэтому натуральная дедукция менее удобна для автоматизации доказательств, ибо здесь рассуждения, хотя и естественны для рассуждений, но менее унифицированы.