
МБОУ БЛЮДЧАНСКАЯ СШ

Открытый урок русского языка в инклюзивном классе (8 класс)

Учитель: Шпис Л.А.





Менандр

Древнегреческий комедиограф Менандр сказал:

«Язык, который умудрен знаниями, не будет запинаться»

Ответ:

Ша́рфы, ба́нты, звони́т, краси́вее, обеспе́чение, жалюзи́, кварта́л, кра́ны, свёкла, щаве́ль, украи́нский, до́суха, исче́рпав, столя́р, углуби́ть, ту́фля, ме́льком.

Виды односоставных предложений

Двусоставные

Односоставные

<u>С ГЛАВНЫМ</u> <u>ЧЛЕНОМ,</u>

выраженным

<u>СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ</u>

или сочетанием

числительного и

существительного

НАЗЫВНЫЕ

<u>C FABHЫМ</u> <u>YAEHOM</u>,

выраженным

глаголом

ОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫЕ

> НЕОПРЕДЕЛЕННО -ЛИЧНЫЕ

> > **БЕЗЛИЧНЫЕ**

Назывные	Определенно-личные	Неопределенно- личные

- І. Люблю грозу в начале мая.
- 2. Ночь.
- 3. Читаю книгу.
- 4. В дверь постучались.
- 5. Зимний вечер.
- 6. Ведут ко мне коня.

- Ключ:
- 1) Назывные: 2, 5;
- 2) Определенно-личные: 1, 3;
- 3) Неопределенно-личные: 4, 6.

Назывное

Это такое односоставное предложение, в котором главный член обычно выражается именем существительным в именительном падеже или сочетанием числительного с существительным.

Определенноличное

Это односоставное предложение со сказуемым-глаголом в форме I-го или 2-го лица изъявительного наклонения или 2-го лица повелительного наклонения.

Неопределенноличное

Это односоставные предложения со сказуемым – глаголом в форме 3-го лица множественного числа в настоящем и будущем времени и в форме множественного числа в прошедшем времени и условном наклонении.



Тема урока «Инструкция»

Цель урока: закрепить знания об изученных односоставных предложениях; познакомить с инструкцией как возможной сферой употребления односоставных предложений.

Задачи урока:


- 2) образовательные:
- повторить сведения о роли односоставных предложений в речи;
- выработать навык составления инструкции;
- 2) развивающие:
- развивать память, логическое мышление;
- совершенствовать коммуникативные навыки;
- 3) воспитательные:
- прививать чуткое отношение ко всему живому;
- формировать чувство прекрасного.

Инструкция

ИНСТРУКЦИЯ – УКАЗАНИЯ, СВОД ПРАВИЛ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПОРЯДОК И СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕГО-Н.

```
/ Получить инструкцию /
/ Инструкция по уходу за коньками /
```

толковый словарь С.И.Ожегова)



Официально-деловой стиль речи

- Функция- точная передача деловой информации
- Сфера применения- объявления, заявления, отчёты, справки, расписки, <u>инструкции</u>, договоры, законы, предписания.
- Задачи речи- сообщение сведений, имеющих деловое информационное значение.
- Характеристика высказывания-22строгость, точность, официальность.

Определите вид односоставных предложений.

 I. Не подвергайте телевизор воздействию очень высоких и очень низких температур.

• 2. Не проливайте на телевизор какие-либо жидкости.







































ПРАВИЛА поведения для учащихся

2. Правила поведения в столовой:

- 3.1. Находясь в школьной столовой (буфете), проявлять аккуратность, не оставлять продуктов питания и посуды на столах, не сорить на пол.
- 3.2. Соблюдать дисциплину и терпение, завтраки и обеды получать только в порядке очереди.
- 3.3. Во время еды вести себя спокойно, на размахивать столовыми приборами, не кричать, не толкаться.
 - 3.4. Перед приемом пищи вымыть руки с мылом.
- 3.5. Не следует находиться в столовой (буфете) в верхней одежде и головном уборе.
- Заходить в производственные помещения столовой и раздаточную не разрешается.







инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения РИНОСТОП®

Регистрационный номер: ЛП-002214

Торговое название препарата: Риностоп®

Международное непатентованное название: кфилометазолин

Лекарственная форма: спрей назальный

Состав на 1 мл:

Активное вещество: ксилометазолина гидрохлорид - 0,50 мг или 1,00 мг;

Вспомогательные вещества: динатрия эдетат (трилон Б) — 0,50 мг, натрия хлорид — 9,00 мг, бензалкония хлорид — 0,15 мг, калия дигидрофосфат — 3,63 мг, натрия гидрофосфат додекагидрат — 7,13 мг, вода очищенная — до 1 мл.

Описание: прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: противоконгестивное средство – альфа-адреномиметик

Kog ATX: R01AA07

Фармакологические свойства

Ксилометазолин относится к группе местных сосудосуживающих средств (деконгестантов) с альфа-адреномиметической активностью, вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки полости носа, устраняя, таким образом, отек и гиперемию слизистой оболочки полости носа, восстанавливает проходимость носовых ходов, облегчает носовое дыхание.

Действие препарата наступает через несколько иинут после его применения и продолжается до 10 часов.

Фармакокинетика

При местном применении препарат практически не всасывается, поэтому его концентрация в плазме крови очень мала (современными аналитическими методами не определяется).

Показания к применению

Применяют при острых респираторных заболеваниях с явлениями ринита (насморка), остром аллергическом рините, синуситах, при среднем отите (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой носоглотки).

Подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ксилометаволину и другим компонентам препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), состояния после транссфеноидальной ипофизэктомии, детский возраст (до 2 лет – для 0,05 % спрея, до 6 лет для 0,1 % спрея), беременность.

Не применять при терапии ингибиторами моноаминоксидазы и трициклическими антидепрессантами (включая период 14 дней после ихотмены).

Состорожностью

Сахарный диабет, гипертиреоз, феохромоцитома, заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. ишемическая болезнь сердца), гиперплазия предстательной железы, период лактации. Пациенты с повышенной чувствительностью к адреномиметикам, сопровождающейся симптомами бессонницы и головокружения.

Применение при беременности и лактации

Во время беременности применение препарата противопоказано.


В период лактации препарат должен применяться только по назначению врача, после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и ребенка. Не допускается превышать рекомендуемую дозировку.

Способ применения и дозы

Интраназально.

Распыление производят после снятия предохранительного колпачка с распылителя. Распылитель







Я сегодня научился

- «На уроке я узнал...»
- «Мне на уроке удалось…»
- «Самым интересным на уроке было...»



Д/з: пар. 34, упр. 198.



