


## Вопрос №3

Какие задачи в тексте учебников 7-го класса используются для подведения учащихся к понятию функции?

Курбанова Д.М.,  
Скамай О.Н.

А.Г. Мордкович



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие для учителя .....	3
<b>Глава 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ</b>	
§ 1. Числовые и алгебраические выражения .....	7
§ 2. Что такое математический язык .....	14
§ 3. Что такое математическая модель .....	16
§ 4. Линейное уравнение с одной переменной .....	22
§ 5. Координатная прямая .....	27
<b>Глава 2. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ</b>	
§ 6. Координатная плоскость .....	33
§ 7. Линейное уравнение с двумя переменными и его график .....	39
§ 8. Линейная функция и её график .....	47
§ 9. Линейная функция $y = kx$ .....	58
§ 10. Взаимное расположение графиков линейных функций .....	60
Основные результаты .....	62
<b>Глава 3. СИСТЕМЫ ДВУХ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ</b>	
§ 11. Основные понятия .....	65
§ 12. Метод подстановки .....	70
§ 13. Метод алгебраического сложения .....	74
§ 14. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций .....	77
Основные результаты .....	80
<b>Глава 4. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЁ СВОЙСТВА</b>	
§ 15. Что такое степень с натуральным показателем .....	81
§ 16. Таблица основных степеней .....	85
§ 17. Свойства степеней с натуральными показателями .....	87
§ 18. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями .....	93
§ 19. Степень с нулевым показателем .....	95
Основные результаты .....	97
<b>Глава 5. ОДНОЧЛЕНЫ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД ОДНОЧЛЕНАМИ</b>	
§ 20. Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена .....	98
§ 21. Сложение и вычитание одночленов .....	100

§ 22. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень .....	105
§ 23. Деление одночлена на одночлен .....	108
Основные результаты .....	111

### Глава 6. МНОГОЧЛЕНЫ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД МНОГОЧЛЕНАМИ

§ 24. Основные понятия .....	112
§ 25. Сложение и вычитание многочленов .....	115
§ 26. Умножение многочлена на одночлен .....	118
§ 27. Умножение многочлена на многочлен .....	122
§ 28. Формулы сокращённого умножения .....	123
§ 29. Деление многочлена на одночлен .....	130
Основные результаты .....	132

### Глава 7. РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ

§ 30. Что такое разложение многочленов на множители и зачем оно нужно .....	133
§ 31. Вынесение общего множителя за скобки .....	136
§ 32. Способ группировки .....	139
§ 33. Разложение многочленов на множители с помощью формул сокращённого умножения .....	142
§ 34. Разложение многочленов на множители с помощью комбинации различных приёмов .....	145
§ 35. Сокращение алгебраических дробей .....	149
§ 36. Тождества .....	153
Основные результаты .....	155

### Глава 8. ФУНКЦИЯ $y = x^2$

§ 37. Функция $y = x^2$ и её график .....	156
§ 38. Графическое решение уравнений .....	162
§ 39. Что означает в математике запись $y = f(x)$ .....	165
Основные результаты .....	172



## § 8. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЁ ГРАФИК

Алгоритм построения графика уравнения  $ax + by + c = 0$ , который мы сформулировали в § 7, при всей его чёткости и определённости математикам не очень нравится. Обычно они выдвигают претензии к первым двум шагам алгоритма. Зачем, говорят они, дважды решать уравнение относительно переменной  $y$ : сначала  $ax_1 + by + c = 0$ , затем  $ax_2 + by + c = 0$ ? Не лучше ли сразу выразить  $y$  из уравнения  $ax + by + c = 0$ , тогда легче будет проводить вычисления (и, главное, быстрее)? Давайте проверим.

Рассмотрим сначала уравнение  $3x - 2y + 6 = 0$  (см. пример 2 из § 7), т. е.  $2y = 3x + 6$ .

Умножив обе части уравнения на  $\frac{1}{2}$ , получим  $\frac{1}{2} \cdot 2y = \frac{1}{2}(3x + 6)$ , т. е.  $y = \frac{3}{2}x + 3$ . Впрочем, тот же результат мы получили бы, если бы обе части исходного уравнения почленно разделили на 2. Обычно предпочитают в подобных случаях говорить не об умножении, а о почленном делении обеих частей уравнения на одно и то же число.

Итак,  $y = \frac{3}{2}x + 3$ .

Придавая  $x$  конкретные значения, легко вычислить соответствующие значения  $y$ . Например, при  $x = 0$  получаем  $y = 3$ ; при  $x = -2$  имеем  $y = 0$ ; при  $x = 2$  имеем  $y = 6$ ; при  $x = 4$  получаем  $y = 9$ . Видите, как легко и быстро найдены точки  $(0; 3)$ ,  $(-2; 0)$ ,  $(2; 6)$  и  $(4; 9)$ , которые были выделены в примере 2 из § 7.

Точно так же уравнение  $5x - 2y = 0$  (см. пример 4 из § 7) можно было преобразовать к виду  $2y = 5x$  и, далее,  $y = 2,5x$ ; нетрудно найти точки  $(0; 0)$  и  $(2; 5)$ , удовлетворяющие этому уравнению. Наконец, уравнение  $3x + 2y - 16 = 0$  из того же примера можно было преобразовать к виду  $2y = 16 - 3x$  и, далее,  $y = 8 - \frac{3}{2}x$ . Из этого уравнения можно найти точки  $(0; 8)$  и  $(2; 5)$ , которые ему удовлетворяют.

Рассмотрим теперь указанные преобразования в общем виде.

Случай, когда в уравнении  $ax + by + c = 0$  коэффициенты  $a$  и  $b$  равны нулю, мы рассмотрели в § 7. Там же мы отметили, что в случае, когда  $a \neq 0$ ,  $b = 0$ , графиком уравнения является прямая, параллельная оси  $y$ .

Рассмотрим случай, когда  $b \neq 0$ .

Имеем

$$ax + by + c = 0; \quad (1)$$

$$by = -ax - c;$$

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}.$$

Введя обозначения  $-\frac{a}{b} = k$ ,  $-\frac{c}{b} = m$ , получаем

$$y = kx + m.$$



Таким образом, линейное уравнение (1) с двумя переменными  $x$  и  $y$  в случае, когда  $b \neq 0$ , можно преобразовать к виду

$$y = kx + m, \quad (2)$$

где  $k, m$  — числа (коэффициенты).

Это частный вид линейного уравнения. Зная, чему равен  $x$ , по правилу  $y = kx + m$  всегда можно найти, чему равен  $y$ . Будем называть уравнение (2) **линейной функцией**.

С помощью уравнения (2) легко, указав конкретное значение  $x$ , вычислить соответствующее значение  $y$ . Пусть, например,  $y = 2x + 3$ . Тогда

если  $x = 0$ , то  $y = 3$ ;  
 если  $x = 1$ , то  $y = 5$ ;  
 если  $x = -1$ , то  $y = 1$ ;  
 если  $x = 3$ , то  $y = 9$  и т. д.

Обычно эти результаты оформляют в виде таблицы:

$x$	0	1	-1	3
$y$	3	5	1	9

Значения  $y$  из второй строки таблицы называют значениями линейной функции  $y = 2x + 3$  соответственно в точках  $x = 0$ ,  $x = 1$ ,  $x = -1$ ,  $x = 3$ .

Л. Г. Петерсон

Л. Г. Петерсон, Д. Л. Абраров, Е. В. Чуткова



**Математика**  
Алгебра · Функции · Анализ данных  
**7**  
**класс**  
**Часть 3**

Учебник для средней школы





## Оглавление

Глава 5. Введение в теорию функций	3
<b>§ 1. Понятие функции и ее практическое применение</b>	<b>3</b>
5.1.1. Функциональная зависимость между величинами	3
5.1.2. Способы задания функции	11
5.1.3. Функциональная зависимость и кодирование информации	20
<b>§ 2. Линейные процессы и линейная функция</b>	<b>27</b>
5.2.1. Прямая пропорциональность	27
5.2.2. Линейная функция и ее график	36
5.2.3. Кусочно-линейные функции	46
Задачи для самоконтроля к Главе 5	59
<b>Глава 6. Введение в теорию линейных уравнений и неравенств</b>	<b>63</b>
<b>§ 1. Линейные уравнения</b>	<b>63</b>
6.1.1. Линейные уравнения и их решение	63
6.1.2. Решение уравнений с модулями	76
6.1.3. Решение линейных уравнений в целых числах	88
<b>§ 2. Линейные неравенства</b>	<b>98</b>
6.2.1. Линейные неравенства и их решение	98
6.2.2. Линейные неравенства с модулями	114
Задачи для самоконтроля к Главе 6	124
<b>Глава 7. Введение в комбинаторику, теорию вероятностей и статистику</b>	<b>129</b>
<b>§ 1. Элементы комбинаторики</b>	<b>129</b>
7.1.1. Задача подсчета числа вариантов	129
7.1.2. Комбинации с повторениями	137
<b>§ 2. Сбор и анализ информации</b>	<b>144</b>
7.2.1. Способы упорядочивания информации	144
7.2.2. Статистические характеристики	156
<b>§ 3. Элементы теории вероятностей</b>	<b>168</b>
7.3.1. Частота и вероятность случайных событий	168
7.3.2. Классическая схема определения вероятности	176
Задачи для самоконтроля к Главе 7	184
Задачи для самоконтроля по курсу 7 класса	190
Ответы	206
Предметный указатель	211
<b>Приложения:</b>	
Таблица простых чисел	212
Таблица квадратов натуральных чисел до 100	213
Таблица кубов натуральных чисел до 60	214
Справочная информация	215

Петерсон Людмила Георгиевна  
Абрамов Дмитрий Леопольдович  
Чугкова Елена Валерьевна

### МАТЕМАТИКА

Алгебра. Функции. Анализ данных

Учебник для 7 класса

Часть 3

Ответственный за выпуск *Ю. Н. Веселовский*  
Художники *С. Ю. Гагарина, П. А. Северцов*  
Художественный редактор *Т. С. Шалакина*  
Технический редактор *Е. В. Безурова*  
Компьютерная верстка *Р. Ю. Шаловилова*  
Корректор *О. Б. Андрюхина*

однано в печать 11.04.2011. Формат 84х108/16. Объем 13,5 печ. л. 22,68 усл. печ. л.  
Бумажный офсетный. Печать офсетная. Гарнитура Школьная.  
Тираж 25 000 экз. Заказ № 28504 п. 000.

Издательство «Ювента»

(структурное подразделение ООО «С-инфо»)

125284 Москва, ш/п 42 Тел.: (495) 796-92-93 Факс: (495) 796-92-99

E-mail: bookale@y1.ru Адрес в Интернете: www.bookale.ru

Приобрести книгу можно в магазине по адресу:

Москва, ул. 1905 года, д. 10 А. Телефон: (499) 253-93-23


Часы работы: с 10 до 19 часов. Выходные: воскресные, общедомовые

Отпечатано в ОАО «Смолнинский полиграфический комбинат».

214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1.

Прежде чем дать определение функции, вспомним предыдущий пример. Как мы определяли длину пути  $s$  м, пройденного за данное время  $t$  мин со скоростью 50 м/мин? Мы брали некоторое конкретное значение  $t$  мин (5 мин, 12 мин, 20 мин и т. д.), затем, пользуясь правилом  $s = 50t$ , умножили  $t$  мин на 50 м/мин и получали искомое значение  $s$  м (250 м, 600 м, 1000 м и т. д.).

Возможные значения переменной  $t$  в мин образуют некоторое множество  $T$ . При этом  $t$  не может принимать любые значения. Так, например, прогулка не может длиться 1 000 000 мин или (-24) мин. Если же она длилась, например, 30 мин, то множество  $T$  можно задать следующим образом:  $T = \{t \in \mathbb{Q}; 0 < t < 30\}$ . Переменная  $s$  в метрах при этом принимает значения из некоторого множества  $S$ :  $S = \{s \in \mathbb{Q}; 0 < s < 1500\}$ . Данную зависимость можно схематически представить следующим образом:



где, согласно правилу  $s = 50t$ , каждому элементу  $t$  из множества  $T$  ставится в соответствие *единственный* элемент  $s$  из множества  $S$ .

Таким образом, мы приходим к следующему определению понятия функции, где независимая переменная обозначается буквой  $x$ , зависимая – буквой  $y$ , а правило соответствия – буквой  $f$ .


**Определение.** Функцией называется правило  $f$ , по которому *каждому* элементу  $x$  из некоторого множества  $X$  ставится в соответствие *единственный* элемент  $y$  из множества  $Y$ . Множество  $X$  при этом называется областью определения, а множество  $Y$  – областью значений данной функции.



Итак, отличительной особенностью функциональной зависимости (функции) является то, что для каждого элемента из ее области определения 1) *существует* и 2) *единственный* соответствующий элемент из области ее значений. Если хотя бы одно из этих двух требований не выполняется, то зависимость не является функциональной.

Разберемся в этом на конкретных примерах.


Пусть  $X = \{1, 2, 3\}$ ,  $Y = \{4, 5, 6, 7\}$  и зависимость между ними задается следующими схемами, описывающими, какой элемент множества  $Y$  соответствует тому или иному элементу множества  $X$ .



Исходя из определения понятия функции, мы можем заключить, что зависимости, заданные схемами  $a$  и  $g$ , являются функциональными, а схемами  $b$  и  $c$  – нет. Действительно, в случаях  $a$  и  $g$  для каждого элемента из множества  $X$  *существует* и *единственный* соответствующий элемент из множества  $Y$ . В случае же  $b$  числу 3 из множества  $X$  не сопоставлено ни одного элемента из множества  $Y$  (то есть нарушено требование *существования* соответствующего элемента), а в случае  $c$  числу 3 соответствуют сразу два элемента, 6 и 7, из множества  $Y$  (то есть нарушено требование *единственности* соответствующего элемента).

Таким образом, для того, чтобы определить, является ли данная зависимость функцией, надо:


1. Указать множество  $X$ , являющееся областью определения.
2. Указать множество  $Y$ , являющееся областью значений.
3. Убедиться в том, что каждому элементу из области определения  $X$  поставлен в соответствие некоторый элемент из области значений  $Y$  (*существование*).
4. Убедиться в том, что в области определения  $X$  нет элементов, которым поставлено в соответствие более одного элемента из области значений  $Y$  (*единственность*).



**1** Используя данную формулу зависимости между  $p$  и  $q$ , вычислите значения  $p$  для данных  $q$ :

- |   |   |
|---|---|
| a) $p = 3q$ , где $q = 1; 3; 5; 3$ ;            | б) $p = \frac{1}{2}q$ , где $q = 1; 4; 0; -4$ ; |
| в) $p = \frac{4}{q}$ , где $q = 1; -1; 2; -2$ ; | г) $p = 5q^2$ , где $q = 1; -1; 0; 2$ ;         |
| д) $p = 3 + q$ , где $q = 0; -3; 1; 3$ ;        | е) $p = 7$ , где $q = 1; -5; 7; -8$ .           |

**2** 1) Зависимости между множествами  $X$  и  $Y$  заданы приведенными ниже схемами. Определите, какие из указанных зависимостей позволяют для *каждого* элемента из множества  $X$  находить *единственный* соответствующий элемент из множества  $Y$ . Обоснуйте свой ответ.



2) Как вы думаете, где используются такие зависимости? Почему важно выделять и специально изучать подобные зависимости? Сравните свой вывод с выводом на стр. 3 учебника.



Ю.Н. Макарычев, Н.

Г. Миндюк



# АЛГЕБРА

КЛАСС

7



  
ПРОСВЕЩЕНИЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО



## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ГЛАВА I. ВЫРАЖЕНИЯ, ТОЖДЕСТВА, УРАВНЕНИЯ

§ 1. ВЫРАЖЕНИЯ	5
1. Числовые выражения	—
2. Выражения с переменными	8
3. Сравнение значений выражений	12
§ 2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ	17
4. Свойства действий над числами	—
5. Тождества. Тождественные преобразования выражений	20
§ 3. УРАВНЕНИЯ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ	25
6. Уравнение и его корни	—
7. Линейное уравнение с одной переменной	28
8. Решение задач с помощью уравнений	32
§ 4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	36
9. Среднее арифметическое, размах и мода	—
10. Медиана как статистическая характеристика	42
<i>Для тех, кто хочет знать больше</i>	
11. Формулы	46
Дополнительные упражнения к главе I	49

### ГЛАВА II. ФУНКЦИИ

§ 5. ФУНКЦИИ И ИХ ГРАФИКИ	55
12. Что такое функция	—
13. Вычисление значений функции по формуле	59
14. График функции	62
§ 6. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ	69
15. Прямая пропорциональность и её график	—
16. Линейная функция и её график	75
<i>Для тех, кто хочет знать больше</i>	
17. Задание функции несколькими формулами	84
Дополнительные упражнения к главе II	88

### ГЛАВА III. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

§ 7. СТЕПЕНЬ И ЕЁ СВОЙСТВА	93
18. Определение степени с натуральным показателем	—
19. Умножение и деление степеней	99
20. Возведение в степень произведения и степени	103

§ 8. ОДНОЧЛЕНЫ	108
21. Одночлен и его стандартный вид	—
22. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень	110
23. Функции $y = x^2$ и $y = x^3$ и их графики	112
<i>Для тех, кто хочет знать больше</i>	
24. О простых и составных числах	119
Дополнительные упражнения к главе III	121

### ГЛАВА IV. МНОГОЧЛЕНЫ

§ 9. СУММА И РАЗНОСТЬ МНОГОЧЛЕНОВ	127
25. Многочлен и его стандартный вид	—
26. Сложение и вычитание многочленов	130
§ 10. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОЧЛЕНА И МНОГОЧЛЕНА	135
27. Умножение одночлена на многочлен	—
28. Вынесение общего множителя за скобки	140
§ 11. ПРОИЗВЕДЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ	145
29. Умножение многочлена на многочлен	—
30. Разложение многочлена на множители способом группировки	150
<i>Для тех, кто хочет знать больше</i>	
31. Деление с остатком	152
Дополнительные упражнения к главе IV	155

### ГЛАВА V. ФОРМУЛЫ СОКРАЩЁННОГО УМНОЖЕНИЯ

§ 12. КВАДРАТ СУММЫ И КВАДРАТ РАЗНОСТИ	163
32. Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений	—
33. Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности	169
§ 13. РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ. СУММА И РАЗНОСТЬ КУБОВ	172
34. Умножение разности двух выражений на их сумму	—
35. Разложение разности квадратов на множители	177
36. Разложение на множители суммы и разности кубов	180
§ 14. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕЛЫХ ВЫРАЖЕНИЙ	183
37. Преобразование целого выражения в многочлен	—
38. Применение различных способов для разложения на множители	186
<i>Для тех, кто хочет знать больше</i>	
39. Возведение двучлена в степень	190
Дополнительные упражнения к главе V	193



## ГЛАВА VI. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

§ 15. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ . . . . .	199
40. Линейное уравнение с двумя переменными . . . . .	—
41. График линейного уравнения с двумя переменными . . . . .	204
42. Системы линейных уравнений с двумя переменными . . . . .	207
§ 16. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ . . . . .	211
43. Способ подстановки . . . . .	—
44. Способ сложения . . . . .	215
45. Решение задач с помощью систем уравнений . . . . .	219
<i>Для тех, кто хочет знать больше</i>	
46. Линейные неравенства с двумя переменными и их системы . . . . .	223
Дополнительные упражнения к главе VI . . . . .	226
Задачи повышенной трудности . . . . .	232
Исторические сведения . . . . .	236
Сведения из курса математики 5—6 классов . . . . .	240
Список дополнительной литературы . . . . .	245
Предметный указатель . . . . .	246
Ответы . . . . .	247

Учебное издание

Макарычев Юрий Николаевич  
Миндюк Нора Григорьевна  
Нешков Константин Иванович  
Суворова Светлана Борисовна

### АЛГЕБРА

7 класс


#### УЧЕБНИК ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Зав. редакцией *Т. А. Бурмистрова*. Редактор *Т. Г. Войлокова*.  
Младший редактор *Е. В. Трошко*. Художники *В. А. Коршунов, В. В. Костин*.  
Художественный редактор *О. П. Богомолова*. Компьютерная графика *И. В. Губиной*.  
Технический редактор и верстальщик *А. Г. Хуторовская*.  
Корректор *Л. С. Александрова*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 — 953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 12.07.12. Формат 70×90<sup>1/16</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 14,39+0,47 форз. Тираж 80 000 экз. Заказ № 32710

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение».  
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных материалов  
в ОАО «Смоленский полиграфический комбинат».  
214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 1.



## Глава II ФУНКЦИИ

В этой главе вы узнаете, что называется функцией и графиком функции. С этими понятиями вы постоянно будете встречаться не только на уроках математики, но и на уроках физики, химии, информатики. Вы узнаете, что с помощью графиков можно получить наглядные представления о свойствах функций, познакомитесь со свойствами линейной функции и её частного вида, прямой пропорциональности. Вас, безусловно, заинтересует возможность использования компьютера при решении некоторых задач, связанных с понятиями функции и графика функции. Вы узнаете, что на практике для вычерчивания графиков различных функций часто используются специальные приборы. Например, с помощью кардиографа получают графическое описание работы сердца, а с помощью сейсмографа — графическое описание колебаний земной поверхности.

### § 5 ФУНКЦИИ И ИХ ГРАФИКИ

#### 12. Что такое функция

На практике мы часто встречаемся с зависимостями между различными величинами. Например, площадь круга зависит от его радиуса, масса металлического бруска зависит от его объёма и плотности металла, объём прямоугольного параллелепипеда зависит от его длины, ширины и высоты.

В дальнейшем мы будем изучать зависимость между двумя величинами.

Рассмотрим примеры.

**Пример 1.** Площадь квадрата зависит от длины его стороны. Пусть сторона квадрата равна  $a$  см, а его площадь равна  $S$  см<sup>2</sup>. Для каждого значения переменной  $a$  можно найти соответствующее ему значение переменной  $S$ . Так, например:  
если  $a = 3$ , то  $S = 3^2 = 9$ ;  
если  $a = 15$ , то  $S = 15^2 = 225$ ;  
если  $a = 0,08$ , то  $S = 0,08^2 = 0,0064$ .



Зависимость переменной  $S$  от переменной  $a$  выражается формулой

$$S = a^2$$

(по смыслу задачи  $a > 0$ ).

Переменную  $a$ , значения которой выбираются произвольно, называют *независимой переменной*, а переменную  $S$ , значения которой определяются выбранными значениями  $a$ , называют *зависимой переменной*.

**Пример 2.** Путь, пройденный автомобилем со скоростью 50 км/ч, зависит от времени движения.

Обозначим время движения автомобиля (в часах) буквой  $t$ , а пройденный путь (в километрах) буквой  $s$ . Для каждого значения переменной  $t$ , где  $t \geq 0$ , можно найти соответствующее значение переменной  $s$ . Например:

если  $t = 0,5$ , то  $s = 50 \cdot 0,5 = 25$ ;

если  $t = 2$ , то  $s = 50 \cdot 2 = 100$ ;

если  $t = 3,5$ , то  $s = 50 \cdot 3,5 = 175$ .

Зависимость переменной  $s$  от переменной  $t$  выражается формулой  $s = 50t$ .

В этом примере  $t$  является независимой переменной, а  $s$  — зависимой переменной.

**Пример 3.** На рисунке 8 изображён график температуры воздуха в течение суток.

С помощью этого графика для каждого момента времени  $t$  (в часах), где  $0 \leq t \leq 24$ , можно найти соответствующую температуру  $p$  (в градусах Цельсия). Например:

если  $t = 7$ , то  $p = -4$ ;

если  $t = 12$ , то  $p = 2$ ;

если  $t = 17$ , то  $p = 3$ ;

если  $t = 22$ , то  $p = 0$ .

Здесь  $t$  является независимой переменной, а  $p$  — зависимой переменной.




Рис. 8

**Пример 4.** Стоимость проезда в пригородном поезде зависит от номера зоны, к которой относится станция. Эта зависимость для некоторого региона показана в таблице (буквой  $n$  обозначен номер зоны, а буквой  $m$  — соответствующая стоимость проезда в рублях):

$n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$m$	10	10	18	24	30	36	42	48	54

По этой таблице для каждого значения  $n$ , где  $n = 1, 2, \dots, 9$ , можно найти соответствующее значение  $m$ . Так,

если  $n = 2$ , то  $m = 10$ ;

если  $n = 6$ , то  $m = 36$ ;

если  $n = 9$ , то  $m = 54$ .

В этом случае  $n$  является независимой переменной, а  $m$  — зависимой переменной.

В рассмотренных примерах каждому значению независимой переменной соответствует единственное значение зависимой переменной. Такую зависимость одной переменной от другой называют *функциональной зависимостью* или *функцией*.

Независимую переменную иначе называют *аргументом*, а о зависимой переменной говорят, что она является *функцией* от этого аргумента. Так, площадь квадрата является функцией от длины его стороны; путь, пройденный автомобилем с постоянной скоростью, является функцией от времени движения. Значения зависимой переменной называют *значениями функции*.

Все значения, которые принимает независимая переменная, образуют *область определения функции*.

Например, область определения функции в примере 1 состоит из всех положительных чисел, а в примере 3 — из всех чисел от 0 до 24.

### Упражнения

**258.** Площадь прямоугольника со сторонами 9 см и  $x$  см равна  $S$  см<sup>2</sup>. Выразите формулой зависимость  $S$  от  $x$ . Для значения аргумента  $x = 4; 6,5; 15$  найдите соответствующее значение функции  $S$ .

**259.** Поезд, двигаясь со скоростью 70 км/ч, проходит за  $t$  ч расстояние  $s$  км. Задайте формулой зависимость  $s$  от  $t$ . Найдите значение функции, соответствующее значению аргумента, равному 2,4; 3,8.

Г.К. Муравин, К.С.

Муравин, О. В. Муравина

# АЛГЕБРА

7  
класс

$$\frac{(2b^3 c^2)^5}{24a^3 b^9 c^{10}} = \frac{32b^{15} c^{10}}{24a^3 b^9 c^{10}}$$

$$\frac{32b^{15} c^{10}}{24a^3 b^9 c^{10}} = \frac{4b^6 c^0}{3a^3 b^0 c^0} = \frac{4b^6}{3a^3}$$

$$\frac{4b^6}{3a^3} = \frac{4}{3} \frac{b^6}{a^3}$$



ДРОФА



## Оглавление

### Глава 1. Математический язык

§ 1. Выражения . . . . .	7
1. Числовые выражения . . . . .	7
2. Сравнение чисел . . . . .	14
3. Выражения с переменными . . . . .	19
§ 2. Уравнения . . . . .	28
4. Математическая модель текстовой задачи . . . . .	28
5. Решение уравнений . . . . .	36
6. Уравнения с двумя переменными и их системы . . . . .	44

### Глава 2. Функция

§ 3. Функции и способы их задания . . . . .	52
7. Понятие функции . . . . .	52
8. Таблица значений и график функции . . . . .	56
§ 4. Функция $y = kx$ . . . . .	65
9. Пропорциональные переменные . . . . .	65
10. График функции $y = kx$ . . . . .	71
§ 5. Линейная функция . . . . .	76
11. Определение линейной функции . . . . .	76
12. График линейной функции . . . . .	79
13. График линейного уравнения с двумя переменными . . . . .	86

### Глава 3. Степень с натуральным показателем

§ 6. Степень и ее свойства . . . . .	93
14. Тождества и тождественные преобразования . . . . .	93
15. Определение степени с натуральным показателем . . . . .	98
16. Свойства степени . . . . .	103

§ 7. Действия со степенями . . . . .	108
17. Одночлены . . . . .	108
18. Сокращение дробей . . . . .	111

### Глава 4. Многочлены

§ 8. Произведение одночлена и многочлена . . . . .	116
19. Понятие многочлена . . . . .	116
20. Преобразование произведения одночлена и многочлена . . . . .	122
21. Вынесение общего множителя за скобки . . . . .	126
§ 9. Произведение многочленов . . . . .	131
22. Преобразование произведения двух многочленов . . . . .	131
23. Разложение на множители способом группировки . . . . .	135
§ 10. Формулы сокращенного умножения . . . . .	139
24. Квадраты суммы, разности и разность квадратов . . . . .	139
25. Разложение на множители с помощью формул сокращенного умножения . . . . .	150

### Глава 5. Вероятность

26. Равновероятные возможности . . . . .	155
27. Вероятность события . . . . .	158
28. Число вариантов . . . . .	163

### Глава 6. Повторение

29. Выражения . . . . .	175
30. Функции и графики . . . . .	182
31. Тождества . . . . .	194
32. Уравнения и системы уравнений . . . . .	199
Исследовательские работы . . . . .	210
Практикум по решению текстовых задач . . . . .	214
Проверь себя! Домашние контрольные работы . . . . .	228
Ответы . . . . .	234
Советы и решения . . . . .	248
Справочные материалы . . . . .	277
Список дополнительной литературы . . . . .	283
Предметный указатель . . . . .	285



# ФУНКЦИЯ

## § 3. Функции и способы их задания

### 7. Понятие функции

✓ **Задача 1.** В аквариум, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда (рис. 10), наливают воду. Сколько воды в аквариуме, если высота ее столба в нем равна  $h$  (см)?

**Решение.** Пространство, заполненное водой, — прямоугольный параллелепипед с измерениями 60 см, 40 см и  $h$  см. Объем его равен  $60 \cdot 40 \cdot h$  (см<sup>3</sup>). Обозначив объем воды в литрах буквой  $V$  и учитывая, что  $1000 \text{ см}^3 = 1 \text{ л}$ , получим:

$$V = 2400h \text{ см}^3 = 2,4h \text{ л.}$$

Эта формула выражает зависимость объема воды в аквариуме от высоты ее столба. Будем рассматривать теперь  $V$  и  $h$  в формуле  $V = 2,4h$  как переменные. Допустимые значения переменной  $h$  — все положительные числа, не превышающие 50 (высота аквариума равна 50 см). Обратим внимание на то, что каждому допустимому значению переменной  $h$  соответствует единственное значение переменной  $V$ .

Так, например:

$$V = 2,4 \cdot 20 = 48 \text{ при } h = 20, V = 2,4 \cdot 25 = 60 \text{ при } h = 25.$$

✓ **Задача 2.** Площадь прямоугольника равна  $60 \text{ см}^2$ , а одно из его измерений  $a$  см. Каково второе измерение прямоугольника?




Рис. 10

**Решение.** Обозначим искомое измерение буквой  $b$  (см), тогда  $b = \frac{60}{a}$ .

Рассматривая в этой формуле  $b$  и  $a$  как переменные, заметим, что и в данном случае каждому допустимому значению переменной  $a$  (допустимы любые положительные значения) соответствует единственное значение переменной  $b$ . Например, при  $a = 2$  имеем  $b = \frac{60}{2} = 30$ , при  $a = 12$  соответствующее значение  $b = \frac{60}{12} = 5$ .

В рассмотренных задачах с изменением значения одной переменной изменяется и значение другой, причем каждому допустимому значению первой переменной соответствует единственное значение второй. Такие пары переменных встречаются довольно часто, и у них есть специальные названия.

Переменную  $y$  называют **функцией** переменной  $x$ , если каждому допустимому значению  $x$  соответствует единственное значение  $y$ .  
Переменную  $x$  называют **аргументом** функции  $y$ .

Правило, по которому для каждого допустимого значения аргумента находят соответствующее ему значение функции, обычно обозначают какой-либо буквой. Чтобы указать, что значения функции  $y$  получают из значений аргумента  $x$  по правилу  $f$ , пишут:  $y = f(x)$ .

Читается: *игрек равен эф от икс*.

Значение функции, соответствующее значению аргумента, равному, например, 5, обозначается:  $f(5)$ .

Читается: *эф от пяти*.

✓ **Пример 1.** Дана функция  $y = f(x)$ , где  $f(x) = \frac{x}{x-3}$ . Найти  $f(5)$ .

**Решение.** Правило  $f$  задано с помощью формулы, но не сказано, какая задача к ней привела.

Условились считать *допустимыми* все значения аргумента функции, при которых записанное в правой части формулы выражение имеет смысл.



Ш.А. Алимов, Ю.М.

Колягин

Алгебра

7

  
ПРОСВЕЩЕНИЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО



## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава I. Алгебраические выражения</i>	
§ 1. Числовые выражения . . . . .	3
§ 2. Алгебраические выражения . . . . .	8
§ 3. Алгебраические равенства. Формулы . . . . .	10
§ 4. Свойства арифметических действий . . . . .	14
§ 5. Правила раскрытия скобок . . . . .	19
<i>Упражнения к главе I</i> . . . . .	23
<i>Глава II. Уравнения с одним неизвестным</i>	
§ 6. Уравнение и его корни . . . . .	27
§ 7. Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным . . . . .	30
§ 8. Решение задач с помощью уравнений . . . . .	35
<i>Упражнения к главе II</i> . . . . .	41
<i>Глава III. Одночлены и многочлены</i>	
§ 9. Степень с натуральным показателем . . . . .	44
§ 10. Свойства степени с натуральным показателем . . . . .	48
§ 11. Одночлен. Стандартный вид одночлена . . . . .	55
§ 12. Умножение одночленов . . . . .	58
§ 13. Многочлены . . . . .	61
§ 14. Приведение подобных членов . . . . .	63
§ 15. Сложение и вычитание многочленов . . . . .	67
§ 16. Умножение многочлена на одночлен . . . . .	69
§ 17. Умножение многочлена на многочлен . . . . .	71
§ 18. Деление одночлена и многочлена на одночлен . . . . .	75
<i>Упражнения к главе III</i> . . . . .	78
<i>Глава IV. Разложение многочленов на множители</i>	
§ 19. Вынесение общего множителя за скобки . . . . .	81
§ 20. Способ группировки . . . . .	85
§ 21. Формула разности квадратов . . . . .	88
§ 22. Квадрат суммы. Квадрат разности . . . . .	90
§ 23. Применение нескольких способов разложения многочлена на множители . . . . .	94
<i>Упражнения к главе IV</i> . . . . .	97

<i>Глава V. Алгебраические дроби</i>	
§ 24. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей . . . . .	99
§ 25. Приведение дробей к общему знаменателю . . . . .	104
§ 26. Сложение и вычитание алгебраических дробей . . . . .	108
§ 27. Умножение и деление алгебраических дробей . . . . .	112
§ 28. Совместные действия над алгебраическими дробями . . . . .	114
<i>Упражнения к главе V</i> . . . . .	118

<i>Глава VI. Линейная функция и ее график</i>	
§ 29. Прямоугольная система координат на плоскости . . . . .	121
§ 30. Функция . . . . .	124
§ 31. Функция $y = kx$ и ее график . . . . .	132
§ 32. Линейная функция и ее график . . . . .	138
<i>Упражнения к главе VI</i> . . . . .	143

<i>Глава VII. Системы двух уравнений с двумя неизвестными</i>	
§ 33. Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений . . . . .	147
§ 34. Способ подстановки . . . . .	152
§ 35. Способ сложения . . . . .	156
§ 36. Графический способ решения систем уравнений . . . . .	160
§ 37. Решение задач с помощью систем уравнений . . . . .	165
<i>Упражнения к главе VII</i> . . . . .	170

<i>Глава VIII. Элементы комбинаторики</i>	
§ 38. Различные комбинации из трех элементов . . . . .	173
§ 39. Таблица вариантов и правило произведения . . . . .	177
§ 40. Подсчет вариантов с помощью графов . . . . .	181
<i>Упражнения к главе VIII</i> . . . . .	187

<i>Упражнения для повторения курса алгебры VII класса</i> . . . . .	188
<i>Задачи для внеклассной работы</i> . . . . .	198
<i>Краткое содержание курса алгебры VII класса</i> . . . . .	202
<i>Ответы</i> . . . . .	209
<i>Предметный указатель</i> . . . . .	222



**Задача 1** Поезд движется из Москвы в Санкт-Петербург со скоростью 120 км/ч. Какой путь пройдет поезд за  $t$  часов?

- Если обозначить искомый путь буквой  $s$  (в км), то ответ можно записать формулой

$$s = 120t. \quad (1)$$

При движении поезда путь  $s$  и время  $t$  изменяются. Поэтому их называют *переменными*.

Например, если  $t = \frac{1}{2}$ , то  $s = 120 \cdot \frac{1}{2} = 60$ ; если  $t = 2$ , то  $s = 240$ ; если  $t = 2,5$ , то  $s = 300$  и т. д.

Так как значения  $s$  зависят от значений  $t$ , то  $t$  называют *независимой переменной*, а  $s$  — *зависимой переменной* или *функцией*. Зависимость переменной  $s$  от переменной  $t$  называют *функциональной зависимостью*.

Для того чтобы подчеркнуть, что  $s$  зависит от  $t$ , пишут  $s(t)$  (читается: « $s$  от  $t$ »). Например,

$$s\left(\frac{1}{2}\right) = 60, \quad s(2) = 240, \quad s(2,5) = 300.$$

Таким образом, формула (1) устанавливает правило вычисления пути  $s$  по заданному значению времени  $t$ . В этой задаче время  $t$  положительно и не может быть больше времени движения поезда от Москвы до Санкт-Петербурга.

**Задача 2** Поезд движется из Москвы в Санкт-Петербург со скоростью 120 км/ч. За какое время он пройдет путь, равный  $s$  километрам?

- Если обозначить искомое время буквой  $t$  (в часах), то ответ можно записать формулой

$$t = \frac{s}{120}. \quad (2)$$

Например, если  $s = 180$ , то  $t = 1,5$ ; если  $s = 300$ , то  $t = 2,5$ . Таким образом, в этой задаче  $s$  является

независимой переменной, а  $t$  — зависимой переменной, т. е. функцией  $t(s)$ . Например,  $t(180) = 1,5$ ;  $t(300) = 2,5$ .

Формула (2) устанавливает правило вычисления времени по заданному значению пути  $s$ . Здесь  $s$  может принимать положительные значения, не большие чем расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга.

Обычно в математике независимая переменная обозначается буквой  $x$ , а зависимая переменная — буквой  $y$ . В этом случае пишут  $y(x)$ . Но такое обозначение не является обязательным.

Например, в задаче 1 путь  $s$  является функцией времени  $t$ ; при этом пишут  $s(t) = 120t$ . В задаче 2 время  $t$  является функцией пути  $s$ , и поэтому пишут  $t(s) = \frac{s}{120}$ .

Функция может быть задана различными способами.

1. Функция может быть задана формулой. Например, формула  $y = 2x$  показывает, как по данному значению  $x$  вычислить соответствующее значение функции  $y$ .

**Задача 3**

Функция задана формулой  $y = x^2 + x + 1$ . Найти  $y(-2)$ ,  $y(0)$  и  $y(1)$ .

- 1) Подставляя в эту формулу  $x = -2$ , получаем  $y(-2) = (-2)^2 + (-2) + 1 = 4 - 2 + 1 = 3$ ,
- 2)  $y(0) = 0^2 + 0 + 1 = 1$ ;
- 3)  $y(1) = 1^2 + 1 + 1 = 3$ .

**Ответ**

$y(-2) = 3, y(0) = 1, y(1) = 3.$  ◁

**Задача 4**

Функция задана формулой  $y = -3x + 5$ . Найти значение  $x$ , при котором значение  $y$  равно  $-1$ .

- Подставляя в формулу вместо  $y$  число  $-1$ , получаем  $-1 = -3x + 5$ . Решая это уравнение, находим  $3x = 5 + 1, x = 2$ .

**Ответ**

$x = 2.$  ◁

Задачу 4 можно также решить, выразив из формулы  $y = -3x + 5$  переменную  $x$  через  $y$ , т. е. по формуле  $x = \frac{5-y}{3}$  найти  $x$  при  $y = -1$ .

2. Функция может быть задана таблицей, например:

$x$	1	2	3	4	5	6	7	8
$y$	1	4	9	16	25	36	49	64

Согласно этой таблице значению  $x=3$  соответствует  $y=9$ , а значению  $x=5$  соответствует  $y=25$ . Примеры табличного способа задания функции: таблица квадратов натуральных чисел, таблица кубов натуральных чисел, таблица прироста вклада в сберегательном банке в зависимости от суммы вклада.

3. Функция может быть задана графиком. Для того чтобы наглядно представить функциональную зависимость, используют специальные рисунки (чертежи), которые называют *графиками*. Графики функций широко применяются в практике. С помощью графика часто изображают, например, зависимость температуры от времени (рис. 11); железнодорожники пользуются графиками движения; экономисты графически изображают рост производительности труда. При построении графиков в научных исследованиях и в современном производстве используются самопишущие приборы и компьютеры.




Рис. 11




Рис. 12

Допустим, что на координатной плоскости изображен график некоторой функции  $y(x)$  (рис. 12). Для того чтобы по заданному графику найти значение функции  $y(x)$  при каком-то определенном значении  $x$ , проведем через точку оси абсцисс с координатой  $x$  перпендикуляр к этой оси и найдем точку  $M$  пересечения его с графиком данной функции. Ордината точки пересечения и даст соответствующее значение функции.

**Графиком функции** называют множество всех точек координатной плоскости, абсциссы которых равны значениям независимой переменной, а ординаты — соответствующим значениям функции.

**Задача 1** Дана функция  $y = x^2 + 2$ . Выяснить, принадлежит ли графику этой функции точка с координатами: 1) (1; 3); 2) (2; 2).

- 1) Найдем значение  $y$  при  $x=1$ :  $y(1) = 1^2 + 2 = 3$ . Так как  $y(1) = 3$ , то точка (1; 3) принадлежит графику данной функции.  
 2)  $y(2) = 2^2 + 2 = 6$ . Точка графика с абсциссой  $x=2$  имеет ординату  $y=6$ , поэтому точка (2; 2) не принадлежит графику данной функции. ◀

**Упражнения**

- 536 (Устно.) Прочитать следующие выражения, назвать независимую и зависимую переменную:  
 $s(t) = 120t$ ,  $p(x) = 17,8x$ ,  $C(R) = 2\pi R$ ,  $m(V) = 7,8V$ ,  
 $y(x) = \frac{1}{7}x + 3$ ,  $t(s) = \frac{s}{120}$ ,  $x(y) = 7y - 21$ ,  $f(x) = 2 - 5x^2$ .
- 537 Вычислить значение  $y$  при  $x$ , равном -2; -1; 0; 1; 2:  
 1)  $y = 3x$ ; 2)  $y = -2x$ ; 3)  $y = -x - 3$ ; 4)  $y = 20x + 4$ .
- 538 Функция задана формулой  $s = 60t$ , где  $s$  — путь (в км) и  $t$  — время (в ч).  
 1) Определить  $s(2)$ ,  $s(3,5)$ ,  $s(5)$ .  
 2) Определить  $t$ , если  $s = 240$ .
- 539 Функция задана формулой  $y = 2x - 1$ .  
 1) Вычислить значение  $y$  при  $x$ , равном 10; -4,5; 15; -21.  
 2) Найти значение  $x$ , при котором значение  $y$  равно -19; 205;  $-3\frac{1}{2}$ .



Проверь себя:

1. Какие-то вопросы, наверное
- 2.



**Конец**