

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19

ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики»



Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Приказ МЗ РФ от 09.12.2020 № 1307н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям...»

- Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2

С учетом эпидемической ситуации по решению исполнительных органов государственной власти субъектов РФ при вакцинации против коронавирусной инфекции уровни приоритета могут быть изменены



Вакцинация против COVID-19


К приоритету 1-го уровня относятся:

Взрослые,
работающи
е по
отдельным
профессия
м и
должностям

Работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров

Лица, проживающие в организациях социального обслуживания

Лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением



Вакцинация против COVID-19

К приоритету 2-го уровня относятся:

Взрослые,
работающи
е по
отдельным
профессия
м и
должностям


Работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через

государственную границу
Лица, работающие вахтовым методом

Волонтеры

Военнослужащие

Работники организаций сферы предоставления услуг



Вакцинация против COVID-19


5

К приоритету 3-го уровня относятся:

Государственные гражданские и муниципальные служащие

Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет

Лица, подлежащие призыву на военную службу



Вакцинация против COVID-19


6

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 № 47н «О внесении изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

К приоритету 1-го уровня относятся:

Лица в возрасте 60 лет и старше

Граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн. и более



Российские вакцины против COVID-19

7

- Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»)
 - НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи
 - Профилактическая*
 - На основе аденовируса и гена белка SARS-CoV-2
 - Двукратно, с интервалом в 3 недели
 - Иммуитет формируется через 21 день после 2й вакцинации
- «ЭпиВакКорона»
 - ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»
 - Профилактическая*
 - На основе пептидов – фрагментов белка S SARS-CoV-2
 - Двукратно, с интервалом в 2-3 недели
 - Иммуитет формируется через 30 дней после второй вакцинации
- Вакцина НИИ им. М.П. Чумакова
 - ФНЦ исследований и разработки ИБП им. М.П. Чумакова РАН
 - Профилактическая*
 - На основе инактивированного вируса
 - Двукратно, с интервалом в 2 недели
 - Иммуитет формируется на 14 день после второй вакцинации

* Не лечит, а защищает от заболевания



Горячая линия

Можно получить самую актуальную информацию от специалистов и задать интересующие вопросы о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19

Телефон горячей линии +7(495)790-71-72, график работы: понедельник-пятница 9:00-17:00 (мск), кроме выходных и праздничных дней

Телефон горячей линии Министерства здравоохранения Пермского края по вопросам COVID-19, ОРВИ и гриппа +7(342)258-07-87, график работы: с 8:00 до 22:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни

С целью оперативного информирования населения по вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на базе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России начала горячая линия для населения, создан федеральный дистанционный консультационный центр по вопросам вакцинации против COVID-19



Противопоказания

Противопоказаниями к применению являются:

- Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- Тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания,

Противопоказания для введения компонента II:

- Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об)
- Тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 С) на введение компонента I вакцины



Возможные поствакцинальные реакции

10

Общие: непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью

Местные: болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов, возможно развитие аллергических реакций

В первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие и местные реакции



Ответы на часто возникающие вопросы




Любой
титр IgG
после

заболева
ния

является
защитны



Ответы на часто возникающие вопросы



Как записаться

- Непосредственно при посещении поликлиники
- По телефону регистратуры поликлиники
- Через портал k-vrachu
- Через портал Госуслуги



Результаты ИФА-анализа

Результаты	Интерпретация результатов	Рекомендации
IgM < 0,8	Нет инфицирования, нет иммунитета	Рекомендуется соблюдение общих правил по предотвращению инфицирования
IgG < 10,0		
IgM > 1,0	Ранняя стадия инфицирования, нет иммунитета	Рекомендуется самоизоляция, выполнение ПЦР, при наличии клинических симптомов - КТ
IgG < 10,0		
IgM > 1,0	Поздняя стадия инфицирования, начало формирования иммунитета	Рекомендуется самоизоляция, выполнение ПЦР, при наличии клинических симптомов - КТ
IgG > 10,0		
IgM < 1,0	Здоров, наличие иммунитета	Рекомендуется соблюдение общих правил по предотвращению инфицирования
IgG > 10,0		



Спасибо за
внимание!

