

АПТЕЧКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АИ-2

Аптечка АИ-2

Предназначение

Аптечка индивидуальная - набор средств медицинской самопомощи военнослужащего. Аптечка предназначена для оказания само-, взаимопомощи, предупреждения или ослабления поражающего действия радиационных веществ (РВ), бактериальных средств (БС) и фосфорорганических отравляющих веществ (ФОБ), а также для оказания первой медицинской помощи при механических и термических поражениях личного состава.




Порядок размещения лекарств.

В аптечке находится набор медицинских средств, распределенных по гнездам в пластмассовой коробочке. Размер коробочки 90x100x20 мм, АИ-2 - 130 г. Размер и форма коробочки позволяют носить ее в кармане, кармашке противогазной сумки и всегда иметь при себе.

Каждое лекарственное средство в аптечке находится в строго определенном месте, порядок размещения указан на внутренней стороне крышки..

Состав аптечки

Аптечка индивидуальная АИ-2.



1. Противоболевое средство. Шприц-тюбик (промедол).
2. Средство для предупреждения отравлений ФОВ.
3. Противобактериальное средство №1.
4. Радиозащитное средство №1.
5. Противорвотное средство.
6. Противобактериальное средство №2.
7. Радиозащитное средство №2.

Состав аптечки: противоболевое средство

Противоболевое средство (промедол, тримепередин), гнездо №1, шприц-тюбик с неокрашенным колпачком.

Применяется при переломах, обширных ранах и ожогах.

Правила пользования шприц-тюбиком: извлечь из аптечки шприц-тюбик и, держа его в одной руке, другой взяться за ребристый ободок. Вращательным движением энергично продвинуть ободок до упора, после чего снять колпачок, защищающий иглу. Не касаясь иглы руками, вколоть ее в мягкие ткани бедра в верхней трети снаружи (можно через одежду). Сильно сжимая пальцами тюбик, выдавить содержимое и извлечь иглу, не разжимая пальцев. Отнесен к классу А препаратов (наркотики и прекурсоры).



Состав аптечки: противоядие ФОВ

- В гнезде 2, в красном круглом пенале с четырьмя полуовальными выступами на корпусе находится средство для предупреждения отравления фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ). Принимать по 1 таблетке по сигналу гражданской обороны. При нарастании признаков отравления принять еще одну таблетку. Детям до 8 лет на 1 прием дают 1/4 таблетки, а от 8 до 15 лет - 1/2 таблетки. Отнесен к классу А препаратов (наркотики и прекурсоры).



Состав аптечки: противобактериальное средство №2

Противобактериальное средство №2
(сульфадиметоксин 0,2 г = 15 таблеток),
гнездо №3, большой пенал без окраски.
Принимают после облучения при
возникновении кишечно-желудочных
расстройств по 7 таблеток в один прием в
первые сутки, по 4 таблетки в
последующие двое суток. Детям до 8 лет
в 1 сутки на 1 прием дают 2 таблетки, а
от 8 до 15 лет - 3,5 таблетки. В
последующие 2 суток детям до 8 лет
дают 1 таблетку на прием, а от 8 до 15
лет - 3 таблетки.



Состав аптечки: радиозащитное средство №1

Радиозащитное средство №1 (цистамин 0,2 г = 12 таблеток), гнездо №4, два пенала малинового цвета. Принимать при угрозе облучения 6 таблеток, запивая водой. При новой угрозе облучения через 4-5 часов принять еще 6 таблеток. Детям до 8 лет на 1 прием дают 1,5 таблетки, а от 8 до 15 лет - 3 таблетки.



Состав аптечки: противобактериальное средство №1

Противобактериальное средство №1 (хлортетрациклин 0,006 г = 10 таблеток), гнездо №5, два пенала без окраски с квадратными корпусами.

Принимать при угрозе или бактериальном заражении, а также при ранах и ожогах содержимое одного пенала (5 таблеток), запивая водой. Содержимое второго пенала (5 таблеток) принять через 6 часов. Детям до 8 лет на 1 прием дают 1 таблетку, а от 8 до 15 лет - 2,5 таблетки.



Состав аптечки: радиозащитное средство №2

Радиозащитное средство №2 (калия йодид 0,125 г = 10 таблеток), гнездо №6, пенал белого цвета. Принимать взрослым и детям по 1 таблетке ежедневно в течение 10 дней после выпадения радиоактивных осадков, при употреблении в пищу свежего молока.



Состав аптечки: противорвотное средство

Противорвотное средство

(перфеназин, этаперазин 0,006 г = 6 таблеток), гнездо №7, пенал голубого цвета. Принять 1 таблетку сразу после облучения, а также при появлении тошноты после ушиба головы. Детям до 8 лет на 1 прием дают 1/4 таблетки, а от 8 до 15 лет - 1/2 таблетки.



Спасибо за внимание!