




ЖЕЛЕЗНАЯ  
ПОДДЕРЖКА  
ОРГАНИЗМА

# Значение железа для организма



# Причины развития железодефицитной анемии

- неправильное (несбалансированное) питание<sup>1</sup>
- кровотечения различной локализации – у девушек и женщин репродуктивного возраста<sup>1</sup>:
  - на первом месте – аномальные маточные кровотечения (АМК),
  - на втором месте – заболевания ЖКТ занимают второе место
- присоединение любого провоцирующего фактора (инфекция, заболевания женской репродуктивной системы, погрешности в диете и пр.) задействует депо железа и становится рисковым фактором для ЖДА\*<sup>2</sup>
- повышенная потребность в железе: беременность, лактация; интенсивный рост в пубертатный период

Анемия — вторая по частоте в мире причина нетрудоспособности, а также одна из наиболее серьезных глобальных проблем общественного здравоохранения.<sup>3</sup>

Распространенность анемии среди беременных в мире примерно 38%.<sup>3</sup>

Анемия повышает риски перинатальных осложнений у матерей и новорожденных и является причиной смертности.<sup>3</sup>

\* ЖДА – железодефицитная анемия

1. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению железодефицитной анемии, Москва, 2015.

2. Радзинский В.Е. с соавт. ЖДА у беременных: риски и возможности коррекции, Status Praesentis №2, 2017

3. Рекомендации ВОЗ по оказанию дородовой помощи для формирования положительного опыта беременности, 2017: с.47-49

# Ферретаб – железная поддержка организма

## Ферретаб – комбинированный препарат<sup>1</sup>



**Фолиевая кислота**  
1 мини-таблетка  
**0,5 мг<sup>1</sup>**

**Высвобождение из  
мини-таблетки в течение  
1-2 ч<sup>2</sup>**

**Железа фумарат**  
3 мини-таблетки  
**152 мг (эквивалентно 50 мг  
элементарного железа)<sup>1</sup>**

**Высвобождение происходит в  
течение нескольких часов по мере  
прохождения мини-таблеток с  
кишечным транзитом<sup>2</sup>**

Единственный зарегистрированный в России лекарственный препарат, содержащий фумарат железа.<sup>3</sup>

Фумарат железа – безопасная органическая соль железа ( $\text{Fe}^{2+}$ ) с высокой биодоступностью.\*  
Фумарат железа (Ферретаб®) крайне редко вызывает нежелательные эффекты со стороны ЖКТ\* и тошноту в силу хорошей переносимости беременными.<sup>4</sup>

Совместное использование фумарата железа ( $\text{Fe}^{2+}$ ) с фолиевой кислотой у пациенток с ЖДА (особенно у беременных, нуждающихся в дополнительных дотациях фолатов) повышает эффективность терапии.<sup>2</sup>

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Ферретаб® комп. № П N 013723/01

2. И.Ю. Торшин, О.А. Громова и др. Метаанализ клинических исследований по применению фумарата железа с целью профилактики и терапии железодефицитной анемии у беременных. Гинекология №5, 2015. Стр.3-10.


3. <http://grds.rosminzdrav.ru> от11.01.2021

4. Громова О.А. Торшин И. Ю. Микронутриенты и репродуктивное здоровье Руководство - М: GEOTAP-Медиа, 2019-672с.


# Степень абсорбции препаратов железа

Степень абсорбции солей  $\text{Fe}^{2+}$  в несколько раз выше, чем солей  $\text{Fe}^{3+}$

Нормализация уровня гемоглобина



Восполнение дефицита железа в депо



# Ферретаб – железная поддержка организма

для лечения и профилактики железодефицитных состояний<sup>2</sup>

**3** миллиона  
беременных



у **42%** железодефицитная анемия



**23** миллиона  
женщин репродуктивного возраста



у **30%** железодефицитная анемия  
**60%** находятся в группе риска

# Клинические признаки ЖДА<sup>1</sup>

- Слабость и быстрая утомляемость
- Одышка, бледность кожи
- Приступы сердцебиения
- Извращение аппетита: пристрастие к мелу, крахмалу, глине, сырому мясу и т.п.
- Пристрастие к запахам химической краски, бензина, ацетона, обувного крема — повод обратить внимание на уровень железа в организме.
- Субфебрильная температура тела и высокая предрасположенность к инфекциям
- Хлороз — зеленовато-желтушный или алебастровый оттенок кожи, голубоватые склеры, шелушение, ломкость волос и ногтей, заусенцы и т.д.
- Проблемы с пищеварительным трактом: от трещин на губах до кариеса, от эзофагита до атрофического гастрита
- Императивные позывы на мочеиспускание/дефекацию,
- Недержание мочи вследствие ослабления сфинктерного аппарата,
- Затруднения при глотании из-за атрофических изменений слизистой оболочки пищевода
- Гипоальбуминурия, гипопротромбинемия, гипогликемия - результат функциональной печеночной недостаточности
- Случаи кардиалгии, незначительной артериальной гипотензии, расширения границ сердца в левом предсердии, изменения на кардиограмме — снижение амплитуды зубца Т, депрессия сегмента ST
- В запущенных ситуациях – кардиомиопатии, нарушения проводимости сердца, выраженное расстройство функции печени и почек, дечных тонов и
- В запущенных ситуациях – кардиомиопатии, нарушения проводимости сердца, метаболические нарушения, угнетение системы гемостаз

Предлатентный дефицит железа<sup>2</sup>

Снижение запасов микроэлемента, но без уменьшения расходов железа на эритропоэз

Латентный дефицит железа<sup>2</sup>

Полное истощение запасов м.б. в депо, однако признаков развития анемии еще нет

Манифестный дефицит<sup>2</sup> (ЖДА)

Снижение гемоглобинового фонда железа и проявляющийся симптомами анемии и гипосидероза

# Режим дозирования<sup>1</sup>



Срок годности – 3 года




- Перед началом терапии препаратом железа необходимо провести исследование уровня сывороточного железа, ферритина сыворотки (т.е. документировать дефицит железа). Терапия ФЕРРЕТАБ комп должна проводиться до нормализации картины крови (8–12 недель).<sup>1</sup>
- При одновременном приеме с **антацидами** всасывание железа **ухудшается**.<sup>1</sup>
- Твердая пища, хлеб, сырые злаки, **молочные продукты**, яйца, чай **снижают** абсорбцию железа.<sup>1</sup>
- Следует избегать совместного применения с **антибиотиками тетрациклиновой группы** в связи с **нарушением всасывания** железа.<sup>1</sup>
- При приеме препарата может быть **темное окрашивание** кала.<sup>1</sup>

## Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Заболевания, сопровождающиеся накоплением железа в организме (апластическая и гемолитическая анемия, талассемии, гемосидероз, гемохроматоз). Нарушение усвоения железа (сидероахрестическая анемия, свинцовая анемия, пернициозная анемия (недостаточность витамина В12). Анемия, которая не вызвана недостатком железа или фолиевой кислоты.<sup>1</sup>



#ЭТИ ДНИ  
НА ПОЗИТИВЕ



«ЭТИ ДНИ» НА  
ПОЗИТИВЕ!

# Репродуктивное здоровье

**Гармония менструального цикла (МЦ)** – основа репродуктивного здоровья женщины, ведь именно с гормональным равновесием связаны физическое и эмоциональное здоровье, внешняя привлекательность и, самое главное, возможность подарить миру новую жизнь.<sup>1</sup>

**Нарушения МЦ (НМЦ) и различные проявления предменструального синдрома (ПМС)** – одна из самых частых причин обращения женщин к акушеру-гинекологу.<sup>2</sup>

**НМЦ** – это симптом различных патологических состояний, связанных не только с нарушениями в половой сфере, но и с общими системными и эндокринными заболеваниями.<sup>2</sup>

**НМЦ** характеризуются изменением цикличности, продолжительности и объема менструальной кровопотери.<sup>2</sup>


НМЦ и ПМС отмечаются у 20–35% пациенток, кроме того, более чем у 60% здоровых женщин в течение жизни бывают те или иные проявления таких нарушений<sup>2</sup>

**В среднем менструальный цикл (МЦ) составляет 28 дней, в норме – от 21 до 35 дней.** Продолжительность менструации — 2–7 дней (в среднем 4–5 дней), кровопотеря — от 50 до 150 мл (в среднем 70–100 мл)<sup>2</sup>

1. И.Г.Шестакова Женское здоровье- стратегический потенциал нации. Женская консультация.20123; 04:8-11.

2. Свидинская Е.А., Есина Е.В. Возможности использования витаминно-минерального комплекса Тайм Фактор для коррекции нарушений менструального цикла и уменьшения проявлений предменструального синдрома. РМЖ. 2015; 14: 825.


# ПМС



# С чего начать?

Как правило, в современной медицине коррекцию НМЦ начинают с:

- общеукрепляющей терапии (витаминные комплексы, диеты),
- уменьшения физических нагрузок,
- создания комфортных условий труда,
- лечения анемии с помощью препаратов железа,
- при неэффективности – используют гормональные препараты (КОК, прогестагены)



Циклические витаминно-минеральные комплексы – оптимальное решение таких проблем, т. к. они имеют натуральный состав и подтвержденную эффективность, а также практически отсутствуют побочные эффекты от приема, в отличие от гормональной терапии

# Тайм-Фактор

**Тайм-Фактор** – 2-фазный негормональный комплекс витаминов, микроэлементов и фитоэкстрактов, которые способствуют нормализации МЦ и смягчению ПМС<sup>1</sup>






**3 месяца**

рекомендованный курс<sup>1</sup>

Комбинированный препарат, содержащий в себе одновременно сразу 3 группы активных компонентов, необходимых для комплексной поддержки женского организма на протяжении всего менструального цикла!<sup>1</sup>

# Тайм-Фактор vs конкуренты

			
<p><b>Соответствие действий компонентов потребностям организма в различные периоды менструального цикла</b></p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>в каждой капсуле 3 группы компонентов специально подобранных для каждой фазы</p>	<p style="text-align: center;">✗</p> <p>терапия нарушений МЦ только при гиперпролактинемии</p>	<p style="text-align: center;">✓ ✗</p> <p>одинаковый набор веществ разбит на две таблетки для разных фаз</p>
<p><b>Циклическое применение</b></p>	<p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">✗</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>
<p><b>Одинаковая схема приема для 2х видов капсул</b></p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p>капсула №1 и №2 по 2 шт.</p>	<p style="text-align: center;">✗</p>	<p style="text-align: center;">✗</p> <p>таблетки №1 по 1 шт., №2 – по 2 шт.</p>
<p><b>Отсутствие выраженных побочных действий</b></p>	<p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">✗</p> <p>тяжелые аллергические реакции, расстройства ЖКТ, головная боль, головокружение, акне, НМЦ.</p>	<p>Цикловита – средство циклической витаминотерапии, в отличие от ТАЙМ-ФАКТОР не содержит растительные компоненты, оказывающие корректирующее действия на гормональный баланс женщины</p>

# Создан специально для женщин



Фаза 1  
**БЕЖЕВЫЕ**  
капсулы

Фаза 2  
**РОЗОВЫЕ**  
капсулы



**ОВУЛЯЦИЯ**



Активные компоненты распределены по 2-м капсулам таким образом, чтобы максимально обеспечить потребности женского организма в витаминах, минералах, аминокислотах в каждую из 2-х фаз менструального цикла!<sup>1</sup>

# Создан специально для женщин

## Рутин

- Способствует нормализации проницаемости сосудов и укрепляет сосудистую стенку

## Витамин Е

- Предотвращает разрушение прогестерона

## Глутаминовая кислота

- Нормализует функциональное состояние центральной нервной системы

## Экстракт имбиря

- Обладает противовоспалительной, иммуномодулирующей и спазмолитической активностью

## Железо

- Компенсирует дефицит железа во время менструаций

## Фолиевая кислота

- Активирует гормонпродуцирующую функцию яичников



## Цинк

- Улучшает чувствительность тканей к эндогенному прогестерону
- Участвует в поддержании нормального гормонального фона

## Витамин С

- Принимает участие в синтезе стероидных гормонов
- Улучшает чувствительность тканей эндометрия к прогестерону

## Магний

- Оказывает спазмолитическое действие
- Оказывает нормализующее действие на состояние нервной системы

## Экстракт дудника

- Нормализует секрецию прогестерона
- Уменьшает мышечные спазмы и ощущение боли, что облегчает течение менструаций

## Экстракт брокколи

- Индол-3-карбинол способствует нормализации метаболизма эстрогенов
- Способствует снижению риска возникновения опухолей

## Экстракт витекса

- Снижает уровень пролактина
- Облегчает болевой синдром при ПМС





Женщина  
с симптомами  
климакса:



Приливы<sup>1</sup>



Раздражительность<sup>1</sup>



Головная боль<sup>1</sup>

# КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ

1. Клинические рекомендации МЗРФ «Менопауза и климактерическое состояние у женщины», 2016 (Российское общество акушеров-гинекологов, Российская ассоциация по менопаузе)

## Климактерический синдром

### Менопауза<sup>1</sup> —

последняя менструация (ПМ) отражает окончательное прекращение менструальных циклов вследствие потери фолликулярной активности яичников

### Климактерический синдром<sup>1</sup> -

симптомо-комплекс, характеризующийся приливами, гипергидрозом, сердцебиением, нарушением сна, а также различными психическими, поведенческими и эмоционально-аффективными расстройствами на фоне нарушения процессов адаптации к эстрогендефицитному состоянию

### Эпидемиология<sup>1</sup>

#### Средний «возраст» наступления менопаузы



во всем мире  
48,8 лет




в РФ он колеблется  
от 49 до 51 года

Около 75% женщин в возрасте от 45 до 55 лет предъявляют жалобы на приливы




28,5% случаев — средней или тяжелой степени выраженности



Рекомендовано применение альтернативных методов лечения климактерических расстройств у женщин, имеющих противопоказания к МГТ<sup>1</sup>

У пациенток с абсолютными и относительными противопоказаниями к МГТ **могут использоваться препараты растительного происхождения и биологически активные добавки, оказывающие положительный терапевтический эффект при отсутствии рисков, характерных для МГТ**



**Фитоэстрогены уменьшают частоту приливов у женщин в период менопаузы без серьезных побочных эффектов<sup>2</sup>**

**Фитоэстрогены уменьшают количество и интенсивность приливов, нормализуют сон, препятствуют возникновению головных болей, избавляют от ночной потливости и снижают уровень холестерина в крови<sup>3</sup>**

1. Клинические рекомендации МЗРФ «Менопауза и климактерическое состояние у женщины», 2016 (Российское общество акушеров-гинекологов, Российская ассоциация по менопаузе)  
2. M-N. Chen , C-C. Lin and C-F. Liu Efficacy of phytoestrogens for menopausal symptoms: a meta-analysis and systematic review. CLIMACTERIC 2015;18:260–269  
3. Зайдиева Я.З. Альтернативная терапия менопаузальных расстройств у женщин в климактерии. РМЖ. 2017; 12: 873–8

## комплекс фитоэстрогенов, витаминов и минералов

Очевидно, что только фитоэстрогены не способны полностью удовлетворить все направления лечения симптомов, ассоциированных с менопаузой и старением<sup>1</sup>

Поэтому при выборе метода негормональной коррекции возрастных проблем встает вопрос о назначении комплекса препаратов или *комплексного препарата, составные части которого дополняют друг друга*<sup>1</sup>



1. Кузнецова И.В. Растительные препараты в климактерии: многообразие и разумный выбор. Акушерство и гинекология), БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

# ЭСТРОВЭЛ®

ЭСТРОВЭЛ® содержит сразу 3 группы<sup>2</sup> необходимых веществ для комплексной поддержки женщины в период менопаузы<sup>1</sup>



Фитоэстрогены<sup>2</sup>



Антиоксиданты<sup>2</sup>



Витамины<sup>2</sup>



## СНИЖАЮТ СИМПТОМЫ КЛИМАКСА<sup>2</sup>



Изофлавоноиды сои

Способствуют снижению частоты приливов, потливости, головных болей<sup>2</sup>

**B9** Фолиевая кислота

Обладает эстрогеноподобным действием, замедляя наступление климакса и ослабляя его симптомы<sup>2</sup>



Экстракт диоскореи

Нормализует состояние, вызванное дисбалансом гормонов в климактерическом периоде<sup>2</sup>

## ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОСТЕОПОРОЗ<sup>2</sup>

**K1**

**Витамин K1**  
Способствует предупреждению остеопороза, обеспечивая синтез остеокальцина<sup>2</sup>



**Бор**  
Поддерживает здоровое состояние костей, улучшая абсорбцию кальция<sup>2</sup>

## СНИЖАЮТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ<sup>2</sup>



Индол-3-карбинол

Способствует снижению риска возникновения опухолей<sup>2</sup>



Экстракт плодов витекса священного

Вызывает противоопухолевый эффект путем стимуляции гибели раковых клеток<sup>2</sup>

## УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ<sup>2</sup>

**B6**

**Витамин B6 совместно с L-5-гидрокситриптофаном**

Увеличивает синтез эндорфинов – естественных стимуляторов настроения и эмоций<sup>2</sup>

1. Клинические рекомендации МЗРФ «Менопауза и климактерическое состояние у женщины», 2016 (Российское общество акушеров-гинекологов, Российская ассоциация по менопаузе)
2. Листок вкладыш Эстровэл® СГР №RU.77.99.88.003.R.004621.12.19 от 18.12.2019  
БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

## В 1 КАПСУЛЕ<sup>1</sup>



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ<sup>1</sup>:

Наименование компонента	Количество	% от норм потребления
Витамин	2	100
Витами	15	%*
н.Е Витамин	80	50%*
К. Фолиевая кислота	200 МКГ	** 100
гидрокситриптофа	50	20%*
Индол-3-карбинол	25	** 50%
Н.Е	1	** 50%
Изофлав	не менее 25 мг	50%
Диосген	не менее 8 мг	** -
ИН Лукуб	не менее 240	-
ИН	МКГ	



\*% от рекомендуемого уровня суточного потребления, \*\*% от адекватного уровня потребления.



# ЭСТРОВЭЛ® vs конкуренты




	ЭСТРОВЭЛ №30	КЛИМАЛАНИН №30	ФЕМИНАЛ №30	Ци-Клим Аланин №40	Климадинон №60 Климадинон Уно №30
Состав Показания к применению	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Комплексный состав:</b> фитострогены, витамины, минералы</li> <li><b>Растительные компоненты</b> действуют, как избирательные модуляторы рецепторов эстрогенов, купируя ранние проявления дефицита этих гормонов: приливы, эмоциональную лабильность, нестабильность артериального давления</li> <li><b>Витаминно-минеральные компоненты препарата и аминокислоты</b> усиливают эффект фитострогенов, смягчая приливы и перепады настроения, уменьшают головокружения, утомляемость, чувство страха, беспокойства, а также способствуют укреплению иммунной системы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Однокомпонентный препарат</b></li> <li><b>Активный компонент:</b> Бета-аланин 400 мг действует на «приливы» в период менопаузы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Однокомпонентный препарат</b></li> <li><b>Активный компонент:</b> сухой стандартизованный экстракт красного клевера для поддержания здоровья женщины в климактерическом периоде</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Однокомпонентный препарат</b></li> <li><b>Активный компонент:</b> Бета-аланин 400 мг Действует на «приливы», обусловленные климактерическим периодом.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Однокомпонентный препарат</b></li> <li><b>Активный компонент:</b> Сухой экстракт корневищ цимицифуги (2,8 мг и 6,5 мг в Уно)</li> <li>Противоклимактерическое средство растительного происхождения. Климадинон обладает эстрогеноподобным эффектом, проявляет седативные свойства, оказывает терапевтическое воздействие на вегетативную нервную систему</li> <li>Показания - вегето-сосудистые расстройства в менопаузе, пре- и постменопаузе ("приливы", усиление потоотделения, повышенная возбудимость, лабильность настроения, нарушение сна, апатия и другие).</li> </ul>
Способ применения, дозы, курс приема	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Взрослым по 1-2 капсулы в день во время еды</li> <li>• Продолжительность приема – <u>2 месяца</u></li> <li>• Просто и удобно!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-2 таблетки ежедневно. Доза может быть увеличена до 3-х таблеток в день.</li> <li>• <u>Длительность лечения - 5-10 дней</u> до исчезновения «приливов».</li> <li>• При возобновлении симптомов следует провести повторный курс лечения.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рекомендовано принимать по 1 капс./сут, во время еды.</li> <li>• Одна оригинальная упаковка рассчитана на 30-дневный курс приема. Феминал можно применять в течение длительного времени.</li> </ul>	<p>По 1-2 таблетки ежедневно. Доза может быть увеличена до 3-х таблеток в день. Длительность лечения от 5-10 дней до исчезновения «приливов»... лечение может быть продлено на весь период вазомоторных клинических расстройств без ограничения его продолжительности.</p>	<p>Препарат принимают внутрь, по 1 таблетке 2 раза/день в одно и то же время суток (утром и вечером). Таблетки следует проглатывать, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Длительность лечения определяется врачом. Препарат не следует применять более 3 месяцев без консультации врача.</p>

# УМНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ







# Факторы риска развития геморроя\*



## Кому можно рекомендовать





 **Без риска беременным и кормящим женщинам<sup>1, 2</sup>**

**+18** **Всем пациентам старше 18 лет<sup>1, 2, 3, 4</sup>**

**Возможные жалобы при геморрое:**

- Ощущение инородного тела в анальном отверстии<sup>5</sup>
- Зуд и жжение в заднем проходе<sup>5</sup>
- Боли в анальном отверстии, обостряющиеся во время ходьбы или сидения<sup>5</sup>
- Кровотечение<sup>5</sup>
- Выделения в анальной области<sup>1, 2</sup>

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® мазь (регистрационный номер П N012331/01).  
2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® суппозитории (регистрационный номер П N012331/02).  
3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® форте мазь (регистрационный номер П N014065/01).  
4. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® форте суппозитории (регистрационный номер П N014065/02).  
5. Источник <https://aif.ru/health/leksprav/1096391>

Постеризан® - единственная линия средств-иммуномодуляторов с инактивированными *Escherichia coli* в составе для лечения геморроя<sup>7,8</sup>



стимуляции иммунной системы кожи и слизистых<sup>1,2,3,4,9</sup>



нормализации проницаемости и тонуса кровеносных сосудов<sup>1,2,3,4</sup>



регенерации тканей и заживлению ран<sup>1,2,3,4,9</sup>

При выраженной симптоматике Постеризан® форте с гидрокортизоном оказывает противовоспалительное действие, уменьшает отек, гиперемию, зуд.<sup>3,4</sup>




1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® мазь (регистрационный номер П N012331/01).
2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® суппозитории (регистрационный номер П N012331/02).
3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® форте мазь (регистрационный номер П N014065/01).
4. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® форте суппозитории (регистрационный номер П N014065/02).
7. Согласно информации на сайте ГРЛС <https://grls.rosminzdrav.ru>
8. Адаптировано из источника Александрова М.В., Радченко В.В., Ликин В.М. Инактивированная бактериальная культуральная суспензия E.coli. Современные проблемы науки и образования. 2011, 9.
9. Адаптировано из брошюры Dr.Kade «Суспензия культуры бактерий. Уникальный механизм действия».

## Рекомендации по применению и курсу лечения

### Курс лечения

2-3 НЕДЕЛИ



Утром



Вечером



После каждой  
дефекации<sup>1-4</sup>

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® мазь (регистрационный номер П N012331/01).
2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® суппозитории (регистрационный номер П N012331/02).
3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® форте мазь (регистрационный номер П N014065/01).
4. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Постеризан® форте суппозитории (регистрационный номер П N014065/02).

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**