

В чем отличие?

CS

?

GL

U

Отличия Хондроитина сульфата и Глюкозамина сульфата

- Механизм действия
- Влияние на патологические процессы в различных структурах сустава
- Преимущественное воздействие в зависимости от локализации ОА



Различия в механизме действия ХС и ГС

ХС в большей степени подавляет выработку медиаторов воспаления

STIMULATES			INHIBITS		
<u>PGs</u>	CS ¹	GLU ⁷	<u>Collagenase</u>	CS (III) ¹⁰	GLU(III) ¹⁰
<u>HA</u>	CS ¹	-	<u>Elastase</u>	CS ¹	-
<u>Type II collagen</u>	CS ²	-	<u>Stromelysin (MMP-3)</u>	CS ³	GLU ⁸
			<u>N-acetylglucosaminidase (NAG)</u>	CS ¹	-
Механизм действия гликозаминогликанов : CS – хондроитина сульфат GLU – глюкозамина сульфат			<u>Apoptosys</u>	CS ⁴	-
			<u>Agrecanase 1 & 2 (ADAMTS-4 /ADAMTS-5)</u>	CS ¹⁰	GLU ^{10,17}
			<u>Nitric oxide</u>	CS ⁴	-
			<u>PLA2</u>	CS ¹	GLU ⁹
			<u>Free radicals</u>	CS ^{4,15}	GLU ¹¹
			<u>PGE₂</u>	CS ^{5,18}	GLU ¹⁸
			<u>IL-1</u>	CS ⁵	GLU ¹²
			<u>NF-κB</u>	CS ⁶	GLU ¹³
			<u>TNF-α</u>	CS ¹⁵	-
			<u>COX-2</u>	CS ¹⁶	GLU ¹⁶
			<u>Gelatinase A (MMP-2)</u>	-	GLU ²⁰
			<u>Gelatinase B (MMP-9)</u>	CS ¹⁴	GLU ²⁰
		<u>MMP-14</u>	CS ¹⁰	-	

Различие в механизме действия

NF-κB - важнейший механизм возникновения воспалительной реакции

ХС и ГС ↓ ядерную транслокацию **NF-κB**

Хондроитин сульфат *in vitro* показал эффект при очень маленькой дозировке, в то время как для аналогичного эффекта требовались большие дозы глюкозамина сульфата.

ХС: Jomphe et al. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2008

Campo et al. Osteoarthritis Cartilage 2008

ГС: Largo et al. Osteoarthritis Cartilage 2003

Различие ХС и ГС во влиянии на патологические процессы в различных структурах сустава

- **Хрящ**


Хондроитина сульфат
Глюкозамина сульфат

- **Субхондральная кость**

Хондроитина сульфат
Глюкозамина сульфат

- **Синовиальная оболочка**

Хондроитина сульфат



Доказанный симптоматический эффект ХС и ГС при различной локализации ОА

Хондроитин сульфат

- **Гонартроз**
 - Многочисленные исследования
- **Артроз кистей**
 - Verbruggen 1998 и 2002
 - Gabay 2011
- **Коксартроз**
 - Conrozier 1992



Глюкозамин сульфат

- **Только гонартроз**
 - Многочисленные исследования

Доказанный структурный эффект ХС и ГС при различной локализации ОА

Хондроитин сульфат



- Гонартроз
- Артروز кистей

Глюкозамин сульфат



- Только гонартроз

NB! Доказательная база ХС для купирования болевого синдрома усилилась

Рекомендации Международного общества по изучению проблем остеоартрита

РЕКОМЕНДАЦИИ OARSI, часть III (2010): Сравнение выраженности терапевтического эффекта (ES) на болевой синдром различных фармакологических методов лечения, характеризующихся наибольшим уровнем доказательности (IA и IB)

	По состоянию на 31 января 2006 ES (95% ДИ), LoE	По состоянию на 31 января 2009 ES (95% ДИ), LoE
КАТЕГОРИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ IA		
Опиоидные анальгетики	N/A	0.78 (0.59, 0.98)
Хондроитин сульфат	0.52 (0.37, 0.67)	0.75 (0.50, 1.01)
Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты	0.32 (0.17, 0.47)	0.60 (0.37, 0.83)
Внутрисуставное введение кортикостероидов	0.72 (0.42, 1.02)	0.58 (0.34, 0.75)
Глюкозамина сульфат	0.61 (0.28, 0.95)	0.58 (0.30, 0.87)
Местные НПВП	0.41 (0.22, 0.59)	0.44 (0.27, 0.62)
Соединения сои и авокадо	N/A	0.38 (0.01, 0.76)
НПВП	0.32 (0.24, 0.39)	0.29 (0.22, 0.35)
КАТЕГОРИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ IB		
Диацереин	0.22 (0.01, 0.42)	0.24 (0.08, 0.39)
Глюкозамина гидрохлорид	N/A	- 0.02 (-0.15, 0.11)

Согласно рекомендациям OARSI **хондроитин сульфат** обладает **выраженным терапевтическим эффектом (ES)** при **болевом синдроме**

Международные рекомендации

Рекомендации по терапии ОА коленных суставов ESCEO 2014

(Европейское общество по клиническим и
экономическим аспектам остеопороза и
остеоартроза)

NB! Глюкозамин Гидрохлорид и Хондроитин Гидрохлорид не входят в рекомендации как не имеющие доказательной базы

Основные принципы лечения ОА коленных суставов



Рекомендации ESCEO 2014