



Биосинтез глицерола,
жирных кислот и
триацилглицеролов.
Образование
фосфолипидов.

1. Биосинтез глицерола



2. Биосинтез жирных кислот.

а) Транспорт Ацетил





б) Синтез жирных кислот

Мультиферментный комплекс состоит из 7 ферментов и ацилпереносящего белка (АПБ, Acyl Carrier Protein - ACP).


АПБ имеет 2 свободные SH-группы:

цистеина - для присоединения ацетил-КоА
фосфопантотеина - для малонил-КоА


б) Синтез жирных кислот




б) Синтез жирных кислот




б) Синтез жирных кислот





б) Синтез жирных кислот




2. Биосинтез жирных кислот.

- Катализируется синтазой жирных кислот.
- Ферментная система локализована в цитоплазме и нуждается в качестве затравки в ацетил-КоА.
- В циклической реакции одна молекула удлиняется семикратно на С₂-звена.
- В качестве конечного продукта реакции образуется анион С₁₆-кислоты, пальмитат.


2. Биосинтез жирных кислот.

- Фактический субстрат реакции удлинения цепи малонил-КоА на каждой стадии конденсации отщепляет карбоксильную группу в виде CO_2 .
- Восстановителем в синтезе жирных кислот является НАДФН + H^+ .
- В результате на синтез одной молекулы пальмитата расходуется одна молекула ацетил-КоА, 7 молекул малонил-КоА и 14 молекул НАДФН + H^+ ; при этом образуются 7 молекул CO_2 , 6 молекул H_2O , 8 молекул КоА и 14 молекул НАДФ⁺.


3. Биосинтез триацилглицеролов




Глицерол-3-фосфат



1-Ацилглицерол-3-фосфат
(лизофосфатидат)




1-Ацилглицерол-3-фосфат
(лизофосфатидат)




1,2-Диацилглицерол-3-фосфат
(Фосфатидная кислота,
Фосфатидат)

фосфат идат
фосфогидролаза




Триацилглицерол





Диацилглицерол



4. Биосинтез фосфолипидов

Синтез Фосфатидилхолина (лецитина)





Фосфатидилхолин
(лецитин)



Диацилглицерол

Фосфолипиды **не являются** существенным энергетическим материалом и играют важную роль в:

- структуре и функции клеточных мембран,
- активации мембранных и лизосомальных ферментов,
- в проведении нервных импульсов,
- свертывании крови,
- иммунологических реакциях,
- процессах клеточной пролиферации и регенерации тканей,
- в переносе электронов в цепи «дыхательных» ферментов
- в формировании липо-протеидных комплексов.

Наиболее важные фосфолипиды синтезируются главным образом в эндоплазматической сети клетки.

Биосинтез фосфолипидов интенсивно происходит в печени, стенке кишечника, семенниках, яичниках, молочной железе и других тканях.

Показатели липидного обмена в крови здорового человека

• Общие липиды	4-10 г/л
• Триглицериды	1-1,5 г/л
• Фосфолипиды	2-2,5 г/л
• Холестерин	1,5-2 г/л
• ЛПОНП	1,2 г/л
• ЛПВП	3,5 г/л
• ЛПНП	4,5 г/л
• НЭЖК	0,1 г/л

В плазме крови новорожденных

- содержание ЛП ниже, чем у взрослых, причём полностью отсутствуют ХМ, а ЛПОНП резко снижены.
- Доля холестерина в ЛПВП новорожденных в 2 раза больше, чем у взрослых.
- С возрастом уровень ЛПВП снижается, а ЛПНП - повышается.
- У новорожденных основным классом ЛП в крови являются ЛПВП.

Спасибо за внимание
!