ГЛАВА I. МЕХАНИКА
§16. Механические волны

О. И. Лубенченко
НИУ МЭИ
Кафедра физики им. В. А. Фабриканта
2020

I. Уравнение бегущей волны

Волна — ФЯ — любое распространяющееся в пространстве возмущение, т. е. изменение какой-либо физической величины с течением времени.



$$\xi(x_2,t_2)=\xi(x_1,t_1) \Longrightarrow \xi\left(x_2,t_1+\frac{x_2-x_1}{v}\right)=\xi(x_1,t_1)$$

Положим $x_1 = 0$: $x_2 \to x$, $t_2 \to t$, $t_1 \to t-\frac{x}{v}$

$$\xi(0,t)=f(t) \qquad \xi(x,t)=\xi\left(0,t-\frac{x}{v}\right)=f\left(t-\frac{x}{v}\right)$$

$$\boxed{\xi(x,t)=f\left(t-\frac{x}{v}\right)}$$ — ***уравнение бегущей волны*** $t-\frac{x}{v}$ — ***фаза*** волны

II. Волновой фронт

Волновой фронт (волновая поверхность) — геометрическое место точек, в которых в один и тот же момент времени колебания происходят в одинаковой фазе.

Плоская волна ***Сферическая волна***





волновая поверхность — плоскость

волновая поверхность — сфера

Волны

продольные

колебания в направлении распространения волны

поперечные

колебания в направлении, перпендикулярном направлению распространения волны



III. Гармоническая волна

Гармоническая (монохроматическая, синусоидальная) волна — ФЯ — распространение гармонических колебаний в пространстве.

Уравнение гармонических колебаний $\xi(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$

Уравнение бегущей волны

$$\xi(x,t) = f\left(t - \frac{x}{v}\right) = A\cos\left(\omega t - \frac{\omega x}{v} + \varphi_0\right) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \varphi_0\right]$$

$$\boxed{\xi(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \varphi_0\right]}$$ — ***уравнение плоской бегущей гармонической волны***

Характеристики гармонической волны

- *Скорость* υ
- *Начальная фаза* φ_0
- *Циклическая частота* ω
- *Период* $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$
- *Частота* $\nu = \dfrac{\omega}{2\pi} = \dfrac{1}{T}$
- *Амплитуда* A — максимальное значение колеблющейся ФВ
- ***Длина волны*** — ФВ — расстояние, которое волна проходит за время одного полного колебания:

$$\lambda = vT = \frac{2\pi v}{\omega} = \frac{v}{\nu}$$

- ***Волновое число***

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi\nu}{v} \qquad [k] = \text{м}^{-1}$$

$$\xi(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

«Мгновенная фотография» гармонической волны



Уравнение бегущей гармонической волны в общем случае (при произвольной форме волнового фронта):

$$\xi\left(\vec{r},t\right)=A\cos\left(\omega t-\vec{k}\vec{r}+\varphi_0\right)$$

$\vec{k}$ — ***волновой вектор*** $\vec{k} \uparrow\uparrow \vec{v}$

IV. Волновое уравнение

$$\xi(x,t)=f\left(t-\frac{x}{v}\right) \longrightarrow \frac{\partial\xi}{\partial x}=-\frac{1}{v}f' \longrightarrow \frac{\partial^2\xi}{\partial x^2}=\frac{1}{v^2}f''$$

$$\xi(x,t)=f\left(t-\frac{x}{v}\right) \longrightarrow \frac{\partial\xi}{\partial t}=f' \longrightarrow \frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}=f''$$

$$\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2}=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}$$ — ***волновое уравнение***

Общее решение волнового уравнения

$$\xi(x,t)=f_1\left(t-\frac{x}{v}\right)+f_2\left(t+\frac{x}{v}\right)$$

прямая волна — обратная волна

Вид функций f_1 и f_2 определяется начальными условиями.