


НОСАЧ



НОСАЧ

- Вид приматов из подсемейства тонкотелых обезьян в составе семейства мартышковых.
- Распространён исключительно на острове Борнео, где населяет прибрежные регионы и долины.



ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ:

- Самым бросающимся в глаза признаком носача является его крупный нос, похожий на огурец, который однако имеется только у самцов.



ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ:

- Шерсть носачей на верхней стороне желтовато-коричневая, на нижней стороне она окрашена в белый цвет. Руки, ноги и хвост серого цвета, а безволосое лицо красное.



ПОВЕДЕНИЕ:


- Носачи активны в дневное время. Ночь и утро они проводят в отдыхе, а пик их активности приходится на вторую половину дня или вечер.
- Носачи живут в тропических лесах и никогда не отдаляются далеко от воды. Они отличные пловцы, прыгающие в воду прямо с деревьев и умеющие преодолевать до 20 метров, двигаясь под водой. Из всех приматов они, пожалуй, являются лучшими пловцами. В пределах открытого мелководья мангров они передвигаются на четырёх конечностях, однако расстояния между густо растущими деревьями мангров они преодолевают на двух ногах, идя почти вертикально.

НОСАЧИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПЛОВЦЫ.



ПОВЕДЕНИЕ:

- Носачи живут в группах от 10 до 30 зверей, которые могут быть либо группами-гаремами, либо чисто мужскими группами.



ПОВЕДЕНИЕ:

- Самцы покидают группу, в которой они родились, при достижении половой зрелости, а самки остаются в ней. Однако иногда случается, что взрослые самки покидают своего самца и примыкают к другому. В поисках пищи или для ночного покоя нередко несколько групп объединяются в одну большую группу.

ГРУППЫ НОСАЧЕЙ:



Особенности:

- Назначение крупных носов у самцов неизвестно. Возможно, он служит для привлекательности – чем больше нос, тем больше шансов впечатлить и завоевать самку.



ПИТАНИЕ:

- Пища носачей состоит в основном из листьев и фруктов. В небольших объёмах они питаются и цветками растений.




РАЗМНОЖЕНИЕ:

- Инициатива к спариванию исходит от самки, которая выпячивает губы, мотает головой из стороны в сторону и демонстрирует самцу свои гениталии.
- Около 170 дней после спаривания на свет рождается, как правило, один детёныш, у которого в отличие от взрослых лицо голубого цвета.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

- **Мать кормит его молоком на протяжении семи месяцев, но и после этого остаётся с ним ещё некоторое время в тесном контакте. Половая зрелость наступает в возрасте от пяти до семи лет, у самцов позднее, чем у самок.**



ДЕТЕНЫШ НОСАЧА:



<http://narkot.turbina.ru>



УГРОЗЫ:

- В настоящее время вырубка лесов представляет главную угрозу для носачей. Также этот вид страдает от охоты, хотя он охраняется законом. Согласно МСОП, носачи находятся под угрозой исчезновения.

