



**ПМП  
при крапивницы**

**Крапивница** – аллергическая реакция , во время которой появляется сыпь или волдыри, очень похожая на ту которая возникает после контакта с крапивой .

Различают несколько причин возникновения крапивницы:

### **ЭКЗОГЕННАЯ КРАПИВНИЦА**

Среди экзогенных причин выделяют:

- Температурные (холодовая крапивница);
- механические ( в результате воздействия крапивой );
- Химические ( аллергия на лек – е вещества , пищевые продукты , моющие ср – ва)

### **ЭНДОГЕННАЯ КРАПИВНИЦА**

К эндогенным факторам возникновения крапивницы относят различные патологические процессы во внутренних органах (в печени , ЖКТ ), которые могут способствовать возникновению заболевания

- укусы насекомых.

Приступы болезни могут длиться минуты , а могут и дни , в тяжелых случаях способны привести и к проблемам с дыханием.

### **Первая медицинская помощь.**

- 1 )прекратить прием лекарственных средств;
- 2) при пищевой аллергии , принять : белый уголь: 1 табл . на 10 кг веса, расжигать и запить водой ; промыть желудок ; принять слабительное :
- 3) При укусах насекомых удалить источник яда:
- 4) При возникновении контактной аллергии , удалить раздражитель с поверхности кожи.



Проявление  
крапивницы на  
различных

**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ !!!**