

A woman with long blonde hair is sitting on a bed, looking thoughtful and slightly sad. She is resting her head on her hand. In the background, a man is sleeping peacefully on the same bed. The scene is set in a bedroom with white bedding and a light-colored wall.

**Инфекции,
передаваемые
половым путем.
Меры их
профилактики**



- Инфекции, передаваемые половым путем (сокращенно ИППП), по традиции называют венерическими заболеваниями.
- Венерические болезни (от Венера – богиня любви и красоты в древнеримской мифологии) – это группа инфекционных заболеваний, возбудители которых передаются половым путем.
- В настоящее время таких насчитывается свыше 20.



- В последние 40 лет во всем мире значительно изменились стереотипы сексуального поведения.
- Отношения молодых людей к сексу становятся все более легким, а различные социальные запреты в этой области легко игнорируются.
- Разные формы сексуального поведения всё чаще встречаются в раннем юношеском и даже подростковом возрасте.



World Health Organization

- Упрощенное отношение к ранним сексуальным связям, неразборчивые, случайные связи с разными партнерами многократно повышают риск заражения ИППП.
- По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире каждый год регистрируется около 300 млн случаев ИППП.



- Самый высокий уровень заболеваемости ИППП отмечается в группе 20-21-летних, затем 15-19-летних.
- Число этих заболеваний увеличивается и у нас в России.
- По статистике, за последние десять лет число больных ИППП выросло более чем в 100 раз, а среди молодых людей до 19 лет заболеваемость выросла более чем в 35 раз.



- Заболеваемость сифилисом в ряде городов приняла эпидемические масштабы.
- Все ИППП, включая сифилис, помолодели, ими все чаще заражаются подростки 12-14 лет.
- Молодым людям следует знать, что риск заражения ИППП возрастает с увеличением числа половых партнеров и частоты половых контактов.

- Необходимо придерживаться правила, которое должно стать аксиомой: думать о безопасности до, а не после полового контакта.
- Признаки инфекций, передаваемых половым путем, могут долгое время после заражения не проявляться.
- Инфицированный человек чувствует себя здоровым, но при этом может заразить полового партнера.






- Необходимо отметить, что к беспорядочной половой жизни более склонны лица интеллектуально и нравственно незрелые или отвергающие нормы общей морали.
- Для них цель общения – это увеселительное времяпрепровождение, обязательным условием которого является половая связь.



Общими правилами профилактики можно считать:


- воздержание от случайных половых контактов и интимных соприкосновений гениталий;
- взаимную верность неинфицированных партнеров;
- правильное и постоянное использование презервативов.

Сифилис традиционно считается самой страшной венерической болезнью.



ADAM.

- Возбудитель сифилиса – бледная трепонема, имеющая вид тонкой спиралеобразной нити.
- Заражение сифилисом происходит при тесном контакте здорового человека с больным.
- Наиболее частый путь – заражение при половом контакте, но возможен и бытовой, когда заражение происходит при поцелуе, пользовании предметами домашнего обихода (зубная щетка, ложка), которыми до этого пользовался больной, курение с больным одной сигареты.



- Бледные трепонемы проникают в кожу или слизистую оболочку через мельчайшие повреждения – ссадины, трещины и др.
- Первые симптомы сифилиса проявляются через 3-4 недели после инфицирования.
- Они характеризуются появлением в месте внедрения бледных трепонем твердого шанкра (небольшая безболезненная эрозия или язва на плотном основании).
- Через 5-7 дней появления твердого шанкра увеличиваются ближайшие к нему лимфатические узлы.



- Перечисленные симптомы характерны для первичного сифилиса, который продолжается 6-7 недель.
- К концу первичного периода у больных могут наблюдаться общие явления: недомогания, повышение температуры тела, боли в костях, головная боль.
- Вторичный период течения болезни характеризуется появлением высыпаний на коже туловища, подошв, ладоней, слизистой оболочке половых органов.
- Высыпания не причиняют неудобств, а через некоторое время самопроизвольно исчезают.
- Вторичный период длится в среднем 3-4 года.




- Третичный период сифилиса развивается у больных, не получивших полноценного лечения.
- Этот период характеризуется поражением кожи и слизистых оболочек, внутренних органов, костей, а также нервной системы.
- Необходимо помнить, что чем раньше начнется лечение, тем выше гарантия полного выздоровления.



- **Правила личной профилактики сифилиса.**
- **После случайно половой связи рекомендуется немедленно после полового сношения тщательно обмыть половые органы и прилежащие области тела теплой водой с мылом.**
- **В случае подозрения на заражение сифилисом необходимо обратиться на пункт противовенерической помощи или в ближайшее лечебное учреждение.**

Гонорея – венерическое заболевание, вызываемое гонококком.



- Гонорея передается, как правило, половым путем от больного гонореей или от бактерионосителя.
- Во время полового контакта гонококк попадает на слизистую оболочку половых органов и мочеиспускательного канала и вызывает местное воспаление.
- Возможно и бытовое заражение через инфицирование предметов домашнего обихода – постель, белье, мочалку и т.д.



- Первые признаки заболевания возникают обычно через 2-5 дней после заражения.
- У мужчин оно проявляется в форме уретрита (воспаление мочеиспускательного канала), который характеризуется жгучими болями в мочеиспускательном канале в начале мочеиспускания.




- У женщин гонорея протекает вяло, малозаметно.
- Почти у всех заболевших развивается гонорейный уретрит, сопровождающийся частыми позывами и режущей болью при мочеиспускании.
- Если гонореею не лечить, то возбудитель может быстро распространиться с током крови по организму, поражая суставы, сердце, мозг.
- Лучшим профилактическим средством против гонореи является использование презерватива, который одинаково предохраняет от заражения как мужчину, так и женщину.

! Выводы

- Если у вас появились явные симптомы описанных выше болезней или возникают опасения, не больны ли вы, не раздумывайте и обращайтесь немедленно к врачу
- Если после обследования выявлено венерическое заболевание, необходимо привлечь к обследованию и лечению вашего полового партнёра.

Генитальный герпес – язвенное поражение половых органов, возбудителем которого является вирус простого герпеса.




- Заболевание характеризуется пузырьковыми высыпаниями на коже.
- Генитальный герпес передается половым путем и вызывает болячки и язвы на половых органах и вокруг них.
- Такие высыпания могут появляться каждые несколько недель и длиться несколько дней, потом могут на долгое время исчезнуть.



<http://2beyoung.ru/userfiles/pages/Webmaster/Read/gerpess.jpg>


- Однако и после полного заживания вирус генитального герпеса остается в организме и большей частью вызывает периодические или нерегулярные обострения.
- Эффективность лечения этого заболевания во многом зависит от сроков начала лечения: чем раньше оно начато, тем эффективнее.

Хламидиоз – болезнь, возбудителем которой является микроорганизм, называемый хламидией.



- Хламидия, как и гонококк, паразитирует преимущественно в половых и мочевыделительных органах.
- Симптомы появляются через 1-4 недели после заражения.
- У мужчин они те же, что и при гонорее.
- У женщин хламидиоз протекает часто незамеченным.

Трихомоноз – очень распространенная ИППП.



- Трихомоноз поражает влагалище и мочеиспускательный канал.
- Симптом заболевания – появление белых и желтых вагинальных выделений с неприятным запахом.
- Это наиболее распространенное заболевание, передаваемое половым путем.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ

Текст Кодекса приводится
по состоянию на 22 января 2007 г.



- **Запомните: заражение другого лица венерической болезнью, если вы знали о ее наличии у вас, является уголовно наказуемым (статья 121 УК РФ 1997 г.).**
- **Оно наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от пяти месяцев либо исправительными работами на срок от года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.**