



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ОТХОДАМИ АГРАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Студент второго курса
направления «Экология и природопользование»

Виноградова Кристина Игоревна

Научный руководитель:
старший преподаватель кафедры
геоэкологии, к.т.н.

Алексеев Алексей Владимирович

ПРОБЛЕМА РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

Площадь нарушенных земель в Краснодарском крае – 5,6 тыс. га

62% из общей площади сельскохозяйственных угодий повреждено различными деградационными процессами




Вопрос рекультивации почв актуален



ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

При ежегодной переработке 25-26 млн т сахарной свёклы образуется 24-24,5 млн т вторичных продуктов

Удельные показатели образования отходов свеклосахарного производства



Из них 22 млн т - **свекловичный жом (СЖ)** – отход V класса опасности: в процессе его гниения выделяется аммиак, микотоксины, скатол, индол и др. потенциально токсичные вещества

Сырой свекловичный жом



Меласса



Сахарная свёкла перед обработкой



ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Питательность жома – 0,85 кормовых единиц (занимает промежуточное положение между луговым сеном и овсом)

В связи с сокращением поголовья скота и быстрой порчей СЖ в последнее время невозможно отправлять весь сырой жом на корм КРС



Складирование СЖ на земле приводит к деградации плодородного слоя почвы и нарушению экосистемы (происходит загрязнение воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почв)



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

гранулированный жом



пищевые волокна



пектиновый клей



вермикомпостирование жома




сахар из мелассы



пищевой пектин




нанокристаллическая целлюлоза



полуфабрикаты




компостирование дефеката



газобетон и цемент



компостирование жома с каньгой



решение
двух
проблем

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования свекловичный жом, образующийся при переработке сахарной свёклы на АО «Успенский сахарник» (Краснодарский край)

Методы исследования: эксперимент, наблюдение и анализ



Этапы приготовления компоста:

Подготовка 5 ящиков объёмом 12 л

Обработка жома известковым молоком

Чередование слоёв жома (рис. 1) и целинного типичного чернозема (рис. 2, 3)

Полив микробиологическими препаратами

Произведение замеров (рис. 4)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Используемые препараты:

Байкал-ЭМ-1 и ТаМирЭм



Функции микробиологических препаратов:

- активация деятельности почвенной микрофлоры
- обеспечение накопления питательных веществ в почве
- утилизация отходов естественным биологическим методом

Состав препаратов:

- молочнокислые, фотосинтезирующие, азотфиксирующие бактерии
- сахаромицеты
- культуральная жидкость

