

Дистрофия (dis- бузилиш, trope-
озиқланиш) – болаларда сурункали
озиқланишнинг бузилишида кузатиладиган
ҳолат бўлиб ўсиш ва ривожланиш орқада
қолиш ва организм қаршилигини
пасайиши билан ифодаланади.

Классификация (Сперанский Г. Н.)

- Гипотрофия
- Паратрофия
- Гипостатура
- Квашиоркор
- Гипо ва авитаминозлар

Гипотрофия – ориқланиш билан намоён бўладиган ҳолат.

Туғма гипотрофия – чақалоқ ўз вақтида туғилади лекин тана вазни 2500 граммдан кам.

Сабаблари:

1) Хомиладорликнинг биринчи триместридаги гестоз.

2) Хомиладорликнинг охириги триместридаги йўлдошнинг патологияси.

3) Касб билан боғлиқ зарарли одатлар

4) Хомиладорлик даври инфекцияси

5) кўп хомилалик хомиладорлик

Ортирилган гипотрофия.

Сабаблари:

■ Алиментар:

- онанинг гипогалактияси
- кўкрак билан эмизишдаги қийинчиликлар
- прикормнинг кеч киритилиши

■ Инфекцион:

- тез-тез кузатиладиган респиратор инфекциялари
- ОИС инфекцион касалликлари

■ Социал:

- перинатал энцефалопатия
- ОИС ва ЮТС туғма нуқсонлари
- иммуно-дефицит ҳолатлар

Патогенез:

- Барча турдаги моддалар алмашувининг бузилиши
- ОИС ферментатив фаолиятининг пасайиши
- Организм тасирчанлигининг пасайиши

Гипотрофиянинг клиникаси:

- I даража: тана оғирлиги етишмовчилиги 11-20%, бўй ўсиши меъёрда, тер ости ёғ қавати қорин соҳасида пасайган.
- II даража: тана оғирлиги етишмовчилиги 21-30%, бўй ўсиши 2-4 см га орта қолади, тер ости ёғ қавати қорин ва сон соҳаларида камайган. Иммун статус пасайган.
- III даража: тана оғирлиги етишмовчилиги 30% ортиқ, бўй ўсиши 5-8см га орта қолади. Тер ости ёғ қавати қорин, сон ва юзда деярли кузатилмайди. Терининг тургор ва эластик ҳусусиятлари пасайган. Иммун статус пасайган.

Квашиоркор – асосан ўсимлик
маҳсулотлари билан озиқланиб,
ҳайвон оқсилларининг
етишмовчилигида кузатилади.

Квашиоркор – red end yellow
boys.

Клиника:

- Асаб тизимининг бузилиши
- Юз ва қўл-оёқларда шиш кузатилиши
- Мушакларнинг нисбий оғирлиги пасайиши
- Терининг ўзтариши, сочларнинг оқариши ва сийраклариши
- Сурункали диарея
- Гепатоспленомегалия
- анемия

Даволаш:

- Диетатерапия 2 босқичда ўтқазилади:
 - 1) Озиқ-овқатларга толерантликни ишлаб чиқариш.
 - 2) Озиқлантиришни кучайтириш
 - Ферментатив препаратлар (мезим форте, фестал, НСІ пепсин билан)
 - Витаминлар
 - Стимуляцион терапия (пентоксил, женьшень, алоэ, фибс)

Гипостатура – ўсиш ва тана вазнининг етишмовчилиги бир меъёردа, қониқарли озиқланиш ҳолати кузатилганда.

Сабаблари:

- Юрак пороклари
- Мия ривожланишдаги нуқсонлар
- Эндокрин патологияси
- Насл билан боғлиқ бўлган касалликлар

Паратрофия

Турлари:

1. Меъёр тана вазни билан
2. Меъёрдан ортиқча тана вазни билан

Этиологияси:

1. Лимфатико-гипопластик диатез
2. Эксудатив-катарал диатез
3. Тимомегалия

Клиникаси:

1. Тўқималар трофикасининг бузилиши
2. Моддалар алмашувининг бузилиши
3. Асаб тизимининг бузилишлари
4. Тез-тез кузатиладиган инфекцияон касалликлар.