




# Высшая Нервная Деятельность (вчера, сегодня, завтра..)

Калинина Татьяна Сергеевна  
д.б.н, доцент, ИЦиГ СО РАН


[kalin@bionet.nsc.ru](mailto:kalin@bionet.nsc.ru)



## Вопросы ЛЕКЦИИ:

- Понятие ВНД;
- Краткая анатомия центральной нервной системы;
- Нейрон как основная структурная единица;
- Типы нейронов. Синапсы;
- Глия: типы, функции;
- Характеристики основных мозговых структур, их локализация, нейрохимия, функции.

## ВВЕДЕНИЕ



Высшая нервная деятельность – это формы нервной деятельности организма, направленные на его взаимодействие с внешней средой, т.е. определяющие его поведение

*Иван Петрович Павлов  
(1849-1936)*


**Высшая нервная  
деятельность -**

- Поведение
- Обучение
- Память
- Эмоции
- Мышление
- Сознание




**Низшая нервная  
деятельность -**

- Гомеостаз
- Моторные акты
- Регуляция внутренних систем




# АНАТОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ



	CNS	PNS
Число оболочек	3	2
Цереброспинальная жидкость	+	-
Обратимость повреждений	-	+

# ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ



**Парасимпатический  
отдел**

**АЦЕТИЛХОЛИН**

**Симпатический  
отдел**

**НОРАДРЕНАЛИН**

Сужение зрачка

Расширение зрачка

Обильное слюноотделение

Выделение небольшого кол-ва слюны

Сужение  
bronхов

Расширение  
bronхов

**rest and digest**

**fight or flight**

Торможение  
сердца

Превращение гликогена в глюкозу

Стимуляция  
сердца

**НАДПОЧЕЧНИКИ:**  
Секреция  
адреналина и  
норадреналина  
в кровь


Стимуляция  
перистальтики  
и секреции  
пищеварительных  
соков

*Когда человек боится –  
выделяет адреналин.  
Это знают собаки  
и лая, бегут за ним...  
(А. Вознесенский)*

Сокращение

Сужение  
кровеносных  
сосудов

Подавление  
сокращений



# КЛЕТКИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

## 1. Нейроны





Рисунок Рамон-и-Кахаль (импрегнация серебром по Гольджи)

≈ 86-100 000 000 000 шт.

## 2.

## Глия



≈ 10-50 кл. глии на 1 нейрон

## 3. Клетки кровеносных сосудов



∑ 640 км/ за 2 сек






# МОЗГ В ЦИФРАХ (для высших

млекопитающих)

Доля мозга в общей массе тела	2 %
Доля кислорода и глюкозы, потребляемого мозгом	до 25 %
Толщина коры головного мозга (стопка из 4 банковских карт)	4 мм
Площадь коры головного мозга (площадь развернутой газеты)	2500 кв. см
Скорость нервного импульса	100 м/сек
Общая длина капилляров в мозге	640 км
Общая длина аксонов	160 000 км
Длина тел нейронов	1000 км
Число нейронов	до 100 млрд
Число синапсов	10 трл
Число операций, выполняемых мозгом в секунду	$10^{15}$




3 миллиарда пар нуклеотидов – биологическая индивидуальность;

100 миллиардов нейронов, миллион миллиардов синапсов – психическая индивидуальность.




# НЕЙРОН – структурно-функциональная единица нервной системы




- **Сома, или тело**, диаметр сомы достигает 100 мкм и более, у самых мелких - около 5 мкм.
- **Дендриты** - цитоплазматические выросты увеличивающие пространственную локализацию нейрона. На них расположены синапсы с другими нейронами. Некоторые нейроны имеют на дендритах специализированные выросты – *шипики*, являющиеся специализированной постсинаптической частью глутаматных синапсов.
- **Аксон** - удлинённый вырост цитоплазмы, структурно и функционально приспособленный для проведения потенциалов действия. У позвоночных животных он может иметь миелиновую оболочку.
- **Аксональный холмик** – начальный участок аксона, имеющий высокую вероятность генерация потенциала действия
- **Аксональные расширения** – пресинаптические терминали

# ФОРМЫ


Пирамидный нейрон  
коры




Мотонейрон спинного  
мозга




Пуркинье  
мозжечка



Нейрон обонят.  
луковиц






Нейрон  
ганглия



# КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ



## 1. По количеству отростков:

- униполярные
- псевдоуниполярные
- биполярные
- мультиполярные
- интернейроны



## 2. По форме тела и ветвлению отростков:

- веретеновидные
- звездчатые
- пирамидные
- Пуркинью



## 3. По функции:

- Сенсорные (чувствительные, афферентные)
- Вставочные (интернейроны)
- Исполнительные (эфферентные), мотонейроны и вегетативные


## 4. По нейрохимической специализации:

- ГАМК-ергические
- Серотонинергические и т.д.

НЕЙРОНЫ  
ПНС

НЕЙРОНЫ  
ЦНС

НЕЙРОНЫ  
ПНС



**(a)** Pseudounipolar neurons have a single process called the axon. During development, the dendrite fused with the axon.


**(b)** Bipolar neurons have two relatively equal fibers extending off the central cell body.

**(c)** Anaxonic CNS interneurons have no apparent axon.




**(d)** Multipolar CNS interneurons are highly branched but lack long extensions.

**(e)** A typical multipolar efferent neuron has five to seven dendrites, each branching four to six times. A single long axon may branch several times and end at enlarged axon terminals.


# Размеры нейронов



Длина: до 1 м (у человека) и больше в зависимости от размеров тела животных



# НЕЙРОГЛ ИЯ





## История изучения глии

---

- 1856 год Рудольф Вирхов предложил термин «Нейроглия» - некоторая субстанция которая заполняет пространство между нейронами.
- 1897 год Рамон Кахаль «Гистология нервной системы» - описывает астроциты – функция электрической изоляции нейронов.
- 1955 год Пол Глис – высказывает предположение, что глия вовлечена в синаптическую активность
- 1965 год Холгер Гайдн и Пол Ланге – нейрон и глия формируют функциональную единицу, в которой оба элемента оказывают воздействие друг на друга

# НЕЙРОГЛИЯ

## Разновидности и функции

### НЕЙРОГЛИЯ

are found in

#### Периферическая н.с.

contains



Сателлитные  
клетки



Шванновские  
клетки

form

Миелин

secrete

Support  
cell bodies

Neurotrophic  
factors

#### Центральная нервная система

contains



Олигодендроциты

form



Микроглия  
(иммун. сист.)

act as

Макрофаги

provide

Substrates for  
ATP production

help form


Blood-  
brain  
barrier

secrete


Neurotrophic  
factors

take up

K<sup>+</sup>, water,  
neurotransmitters



Астроциты



Эпендимоциты


Source of  
neural  
stem cells

create

Barriers  
between  
compartments

# МИЕЛИНИЗАЦИЯ

## • Центральная нервная система




- Функция олигодендроцитов и Шванновских клеток – образование миелина для ускорения нервной передачи в 5-10 раз, т.к. ионные токи – только в перехватах Ранвье.

- ЦНС - один олигодендроцит обеспечивает миелинизацию нескольких аксонов одновременно;

- ПНС - на одном аксоне в ПНС – много Шванновских клеток;

## • Периферическая нервная



# АСТРОЦИТЫ

Функции:

«+»

морфо-структурная:

- формирование ГЭБ;
- обеспечение локальности синаптической передачи, препятствуют свободной диффузии нейротрансмиттеров;

нейротрофическая:

- синтез глиального нейротрофина (GDNF);
- регуляция нейрогенеза во взрослом гиппокампе и субвентрикулярной зоне;



метаболическая :

- поглощение ионов  $K^+$ ;
- поглощение избытка воды;
- захват глутамата, перевод его в глутамин;
- разложение гликогена до лактата;
- обмен АТФ;
- глимфатическая система очистки мозга.

«—»

при ишемии, травме, нейротоксинах

- заполняют пространство между нейронами, препятствуя восстановлению связей;
- избыток глутамата губит соседние клетки.



# УЧАСТИЕ НЕЙРОГЛИИ В НЕЙРОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Рассеянный склероз  
полиневропатии  
лейкоэнцефалиты

Нарушение синтеза миелина  
(олигодендроциты, микроглия):



Экспрессия SLC1A3 –  
транспортера  
глутамата в мозжечке

Паркинсонизм – Нарушение синтеза ферментов, участвующих  
в обмене дофамина (астроциты, микроглия)




Хорея Хантингтона – Усиление синтеза хинолиновой кислоты (астроциты)

Деменции при нейродегенеративных заболеваниях –  
Паркинсон (PD), Альцгеймер (AD), энцефалопатия Вернике,  
амиотрофический латеральный склероз (ALS), лобно-височная дистрофия  
(FTD) и т.п.




Динамические изменения от атрофии астроглии к астроглиозу и активации  
микроглии

Онкология мозга – Глиомы ! «Нейром» не бывает !



# Атрофия астроцитов в DG гиппокампа при болезни Альцгеймера (начало болезни)



## Б Астроглиоз в DG гиппокампа при болезни Альцгеймера (динамика)



# РАДИАЛЬНАЯ ГЛИЯ




## Экспрессируют маркеры как глии, так и нейронов:

- GFAP (глиальный фибриллярный кислый белок);
- FABP7 (белок, связывающий жирные кислоты);
- виментин (поддержание органелл в цитоплазме);
- Pax6 (координатор развития сенсорных органов).

- Клетки радиальной глии участвуют в процессе радиальной миграции – передвижения предшественников нервных клеток из вентрикулярной зоны в верхние слои коры полушарий и мозжечка в нейроонтогенезе;
- Выполнив свою функцию клетки радиальной глии трансформируются в нейроны или астроциты

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
НЕЙРОНОВ  
Нейроны in vitro







# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЙРОНОВ



## Сигналы в нейронах :

- Электрические (Потенциал действия – до синапса + постсинаптический потенциал)
- Химические (Нейромедиаторы, Нейромодуляторы) или электрические (редко представлены)


ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ - стартовая точка возбуждения нейрона.




# ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ - стартовая точка возбуждения нейрона.




# ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ – стартовая точка возбуждения нейрона.




**(a) Weak stimulus releases little neurotransmitter**



**(b) Strong stimulus causes more action potentials and releases more neurotransmitter**





Первая регистрация «потенциала возбуждения»




**Ходжкин и Хаксли (1940г):**

**ПРИ возбуждении аксона происходит не разрядка, а ПЕРЕЗАРЯДКА МЕМБРАНЫ!!!!**




# Потенциалы действия -


универсальные электрические сигналы – передатчики команд от нейрона к нейрону и другим клеткам




Клетки сердца и кровеносных сосудов



ПД мышечных волокон скелетных мышц




Распространение потенциала действия по аксону



Электронно-микроскопическая фотография аксо-соматического синапса

# Электрический синапс



## Особенности:

- Узкая синаптическая щель
- Быстрая передача сигнала
- Позволяет синхронизовать активность нейронов
- В мозге млекопитающих имеют невысокое распространение




# Activity-dependent plasticity of electrical synapses: increasing evidence for its presence and functional roles in the mammalian brain



Julie S. Haas<sup>1\*</sup>, Corey M. Greenwald<sup>1</sup> and Alberto E. Pereda<sup>2</sup>

From International Gap Junction Conference 2015  
Valparaiso, Chile. 28 March - 2 April 2015

**A** Goldfish mixed synapse





**B** Heterosynaptic interaction in mammals




1. Ретикулярное ядро таламуса
2. Гипоталамус
3. Сетчатка
4. Нижняя олива продолговатого мозга



# Химический синапс





## Этапы экзоцитоза выделения медиатора



**TABLE 3.2** A Comparison of Electrical and Chemical Synapses



Type of Synapse	Width of Synaptic Gap	Speed of Transmission	Method of Transmission	Type of Message	Types of Cells Involved
Electrical	3.5 nm	Nearly instantaneous	Direct movement of ions from one cell to the other	Excitatory only	Requires large presynaptic neuron to influence small postsynaptic neurons
Chemical	20 nm	Up to several milliseconds	Release of chemical neurotransmitters	Excitatory or inhibitory	Small presynaptic neurons can influence large postsynaptic neurons

# Варианты расположения



## Шипики дендритов



### гиппокампа





3D реконструкция шипиков

Ethell IM, Pasquale EB, 2005.

# Дендритные шипики в коре мозга человека



Синапсы




Анализ Фурье

*The Journal of Neuroscience*, July 23, 2014 •  
34(30):10078 –10084




# Пример организации дендритного шипика



Рецепторы  
глутамата

# ТРАНСКРИПЦИЯ И ТРАНСЛЯЦИЯ В НЕЙРОНЕ

а) происходит исключительно в соме нейрона:




б) трансляция возможна в дендритах и аксонах:

???




# ТРАНСКРИПЦИЯ И ТРАНСЛЯЦИЯ В НЕЙРОНЕ

Детекция мРНК в культуре нейронов гиппокампа 17-дн. эмбрионов крысы



# ТРАНСКРИПЦИЯ И ТРАНСЛЯЦИЯ В НЕЙРОНЕ

Движение РНК-белковых гранул в дендрит нейрона в культуре.  
Скорость 0.04 м/с





# Трансляция белка в дендритах

происходит:

- в раннем онтогенезе при росте нейронов;
- в период активного синаптогенеза;
- при активации синаптической пластичности;
- работает в Гамк- и Глутаматергич. нейронах.

???? частичная компенсация при аксотомии




Nature Rev Neurosci, 2012, 13, 183-193  
 Curr Opin Genet Dev. 2011. 21(4): 414-421  
 J. Neurosci., 2005. 25(2):331-342

# РЕЦЕПТОРЫ НЕЙРОНОВ И


## ГЛИИ

### 1. GPCR (сопряженные с G-белками)




Моноамины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин; АКТГ, ЛГ, ТТГ, вазопрессин, эндорфины и др.

### 2. Управляемые лигандами ионные каналы




ГАМК, глицин, глутамат, АТФ, серотонин, ацетилхолин и др.

### 3. Рецепторы с киназной или фосфатазной активностью



Нейротрофические и ростовые факторы, цитокины, инсулин, пролактин, гормон роста и др.

### 4. Ядерные рецепторы (активируемые лигандом факторы транскрипции)





Стероидные и тиреоидные гормоны, витамин Д3, цис- и транс-ретиноевая кислота и др.

# ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

## ГОЛОВНОЙ МОЗГ


## СПИННОЙ МОЗГ





- СТВОЛ МОЗГА – врожденные формы поведения, инстинкты, эмоции;
- МОЗЖЕЧОК – автоматические движения; координация;
- ПЕРЕДНИЙ МОЗГ – мышление, память, осознанное, «высшее» поведение.

### РЕФЛЕКСЫ спинного мозга:

- ✓ сухожильно-мышечные (коленный, локтевой);
- ✓ кожные (защитный сгибательный «при ожоге»);
- ✓ опорные (выпрямление стопы при касании);
- ✓ локомоторные (перекрестно-двигательные «ходьба»);
- ✓ висцеральные (мочеиспускание, дефекация)



# СТВОЛ МОЗГА



**Продолговатый мозг и мост выполняют ряд жизненно важных функций; здесь находятся:**


- дыхательный центр (запуск вдохов и выдохов);
- сосудодвигательный центр (работа сердца, тонус сосудов);
- центры, обеспечивающие врожденное пищевое поведение (центр вкуса, сосания, глотания, слюноотделения, рвоты и др.);
- главный центр бодрствования;
- голубое пятно и др.

## **Мозжечок:** выполняет функцию двигательного обучения и двигательной памяти («автоматизация движений»):

древняя часть [червь] – движения, обеспечивающие поддержание равновесия + движения глаз;

старая часть [внутренняя область полушарий] – движения, обеспечивающие перемещение в пространстве (локомоцию);

новая часть [наружная область полушарий] – автоматизация произвольных движений в т.ч. тонких движений пальцев (письмо, игра на муз. инструментах и т.п.).



Кроме мозжечка, автоматизацию движений обеспечивают **базальные ганглии** (скопления серого вещества в глубине больших полушарий).

# ПОДКОРКОВЫЕ СТРУКТУРЫ МОЗГА

## Базальные ганглии

Человек


Таламус

Бледный шар

Хвост. ядро

Скорлупа

Миндалина



Крыса

Черная субстанция

Таламус


Скорлупа,  
Хвост. ядро

Бледный шар




Прилежащие ядра

## Гиппокамп




### Hippocampal Anatomy



CA1



Зубчатая извилина



CA2/CA3



# КОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА



- В коре больших полушарий выделяют:
- Фронтальную
  - Pariетальную (теменную)
  - Височную
  - Затылочную
- } ДОЛЮ




**Функции различных зон коры:**

- .Затылочная доля – зрительная кора.
- .Височная доля – слуховая кора.
- .Передняя часть теменной доли – болевая, кожная и мышечная чувствительность.
- .Внутри боковой борозды (островковая доля) – вестибулярная чувствительность, вкус.
- .Задняя часть лобной доли – двигательная кора.


6. Задняя часть теменной и височной долей – **ассоциативная теменная кора**: объединяет потоки сигналов от разных сенсорных систем, речевые центры, центры мышления (образного и абстрактно-логического).

7. Передняя часть лобной доли – **ассоциативная лобная кора**: с учетом сенсорных сигналов, сигналов от центров потребностей, памяти и мышления принимает решения о запуске поведенческих программ («центр воли и инициативы»).

# СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЛАСТЕЙ КОРЫ МОЗГА




# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОТДЕЛОВ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА И КРЫСЫ



# ФУНКЦИИ ОСНОВНЫХ ОТДЕЛОВ

ОБЛАСТЬ МОЗГА	ФУНКЦИИ
<b>(1) СТОЛ (Brainstem)</b>	
Продолговатый мозг (Medulla oblongata)	Контроль жизненно важных функций: дыхание, сердце, пищеварение.
Мост (Pons)	Ритм дыхания, связь с мозжечком
<b>(2) СРЕДНИЙ МОЗГ (Midbrain)</b>	
<b>(3) МОЗЖЕЧОК (Cerebellum)</b>	
<b>(4) ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ (Diencephalon)</b>	
Таламус	Интегративный центр сенсорной и моторной информации, эмоций
Гипоталамус	Гомеостаз, регуляция практически всех форм поведения, эмоций
Гипофиз, эпифиз	Секреция гормонов и мелатонина
<b>(5) КОРА МОЗГА (Cortex)</b>	
Кора (все 4 доли)	Восприятие, анализ, принятие решения, контроль функций
Базальные ганглии	Движение
Гиппокамп	Обучение и память
Миндалина	Эмоции и память



# ОБЛАСТИ ЦНС С НАИБОЛЬШИМ ЗНАЧЕНИЕМ



## ДЛЯ ВВД

### ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОЗГА:

участвует в регуляции внутренних органов (через ГПТ), эмоций, инстинктов, памяти, обоняния, сна, бодрствования, обучения и др.

### КОРА МОЗГА:

обеспечивает контроль нижележащих и древних отделов ЦНС; осуществляет регуляцию сенсорики, сложных форм поведения.



(круг


**Фронтальная** – командный контроль мышц, планирование, принятие решения, концентрация внимания;

**Париетальная** – сенсорика кожи и мышц, распознавание речи, осознание форм формирование мыслей, эмоций;

**Височная** – слуховые сигналы, слуховая и зрительная память;

**Затылочная** – зрительное восприятие, запоминание образов.

# Патологии нервной системы на карте мозга крысы




## Emerging roles for G protein-gated inwardly rectifying potassium (GIRK) channels in health and disease

Christian Lüscher\*<sup>†§</sup> and Paul A. Slesinger<sup>||</sup>


VOLUME 11 | MAY 2010 | 301

# МОДУЛИРУЮЩИЕ НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

1.




2.




3.

Дофаминергическа



4.

Ацетилхолинергическа






# УЧАСТИЕ МОДУЛИРУЮЩИХ НЕЙРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РЕГУЛЯЦИИ ВЗД


Нейромодуляторная система (медиатор)	Локализация перикарионов	Иннервируемые структуры мозга	Модулируют функции
<b>Норадренергическая (норадреналин)</b>	Синее пятно ствола мозга	Кора, таламус, гипоталамус, средний мозг, мост, обон. луков., мозжечок, спин. мозг	Возбуждение, внимание, сон – бодрствов., обучение, память, боль, тревожность, настроение
<b>Серотонинергическая (серотонин)</b>	Рафные ядра ствола мозга	1. нисходящ. пути в спин. мозг 2. восход. пути по всем отделам, гиппокамп	Боль, локомоция  Сон-бодрствов., настроение, тревожность, эмоциональность, агрессия, депрессия
<b>Дофаминергическая (Дофамин)</b>	1. Черная субстанция ср. мозга; 2. Вентральная покрышка ср. мозга	Кора  Кора, лимбич. система	Моторный контроль  Центры удовольствия, аддикция, зависимости
<b>Ацетилхолинергическая (ацетилхолин)</b>	Мост, средний мозг	Гиппокамп, таламус, кора	Возбуждение, сон – бодрствов., обучение, память, сенсорная информ. из таламуса

# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТОПОГРАФИЯ ДОФАМИНОВОЙ И СЕРОТОНИНОВОЙ МЕДИАТОРНЫХ СИСТЕМ ЧЕЛОВЕКА И КРЫСЫ

**A**  
Human



**B**



**Rat**

